Samuelis Dale

PHARMACOLOGIÆ,

SEU

MANUDUCTIONIS

AD

Materiam Medicam

SUPPLEMENTUM:

Medicamenta Officinalia Simplicia priore Libro omissa, complectens:

Ut & Notas Generum Characteristicas, Specierum Synonyma, Differentias, & Vires.

Cum DUPLICI INDICE, Generali altero Nominum & Synonymorum præcipuorum; altero Anglico-Latino, in gratiam Tyronum.

Editio Altera, priori Emendatior.

LONDINI,

Impensis *Guil.* & *Joh. Innys*, Societatis Regiæ Typographorum, ad Insignia Principis in Area Boreali D. *Pauli*. 1718.

MVSEVM
BRITAN
NICVM

1 T T /

PRÆFATIO.

CUM in Præfatione ad ſuperiorem meum Librum ſuccinctam reddidi rationem cur Scientiam Simplicium perquàm neceſſaria fuit omnibus Medicinam facientibus, unà cum opinionibus antiquorum ſuper eâ re Medicorum, & quoniam rationes attuli quæ me potiſſimùm impulerunt ad illum Tractatum publici juris faciendum, ſupervacaneum duxi ea repetere quæ ibidem dixeram, ſatis eſſe ratus certiorem facere Lectorem de cauſis hoc opus in lucem emittendi, & quæ adhibui auxilia in perficiendo eodem & conſummando.

Poſtquàm Typis mandaveram priorem meum Tractatum, Anno 1693. *animadverti plurimas res medicas, quæ jam tum*

cæperunt obtinere in uſu medicinali à me omiſſas, plurimi quoque libri eò ſpectantes tum temporis in manus inciderint qui nondum impreſſi fuerint, vel quorum ſaltem notitiam nondum habui. Verùm cùm mihi innotuit ab aliquam multis etiam ingenioſis Librum meum æqui bonique acceptum fuiſſe in Regionibus exteris, quin & inter peregre proficiſcendum ſe illum non tantùm in Gallia, & Hollandia, *verùm etiam in* Italia, & *in ulterioribus* Germaniæ *oris, ſubiit conſiderare* Supplementum *fore neceſſarium quo majori eſſet uſui aliis regionibus, & cùm iter jam feciſſet uſque ad viciniam Græciæ, antiqui iſtius Scientiarum Fontis, quod non è re foret adjicere ex* Dioſcoride *exteriſque Pharmacopœis, quodcunque non adhuc impreſſum penes me fuit. & non quod expectandum fuit uſquedum Liber aliam requireret impreſſionem, ſed ſeorſim continuò edendum.*

Poſtquàm non contemnendum jam progreſſum feci in conſtituto ſubjecto, certior ſum factus Gallorum *regem mandâſſe ingenioſum*

genioſum, nullique ſecundum Botanicum D. Tourneſortium *in* Græciam, *Inſulaſque adjacentes, ad inveſtigandas* Dioſcoridis *plantas; id quod effecit ut ad tempus deſiti ab opere, ſperabam enim fore quod cùm inſignis iſte Vir redux fuiſſet, aliquid ſaltem in lucem ederetur ad dirimendam vexatiſſimam iſtam inter Botanicos quæſtionem de veris antiquorum Græcorum plantis: verùm enimverò quamobrem viſum fuit præſtantiſſimo Botaniſtæ invidere Orbi literariæ, alium laborum ſuorum Orientalium fructum præter Corollarium, me ſanè latet.*

Operam dedi ut ubique de Materia Medica Dioſcoridis *liquido conſtaret, atque adeò conſului præcipuos Authores qui de hoc Subjecto tractârunt, & quam preſsè potui adhæſi textui, ad ſuppetias etiam meas adhibere lubuit* Matthioli *Tranſlationem, ut & Commentarium: in his libris concinnandis inivi viam nemini perviam; qualis nulla (quod ſciam) fit mentio in aliqua Lingua, ideóque tam vivos quàm mortuos conſului, plurimos ſcilicet doctos, eoſque ingenioſos Viros, ſimul*

& Libros ; quoniam verò neceſſe omninò fuit unicuique rei medicæ adjicere virtutes, verùm quandoquidem libri inſtitutum brevitatem exigit, atque adeò ut in Epitomen redigeretur, hoc in cauſa fuit quod eoſdem excerpſi ex Authoribus qui id mihi effectum dederunt : verùm ne Jovis Corvi ad inſtar furtivis me efferrem plumis, mihique plus tribuerem quàm par eſt, quàm meritus ſum, ad calcem uniuſcujuſque tranſcriptionis impoſui Authoris nomen unde mutuò accepi, notas ſcil. characteriſticas, eaſque præſertim ex operibus nuperi mei vicini, & amici longè colendiſſimi, Digniſſ. & Solertiſſ. D. Joan. Raii, *jam nunc, ut fas eſt credere, in gloria, necnon à Pharmacopœio* Schroderi ; *undè accidit quod nonnulli perperàm exiſtimavere primum Volumen nihil aliud eſſe quàm tranſcriptum ex iſtiuſmodi Authoribus. & non opus (ut reverà eſt) prorſus novum.*

Hoc mihi potiùs in gloriam cedit, quàm in vituperium, ideóque lubens agnoſco me ſæpè ſæpiùs amicos quoſdam, dum opus moliebar, conſuluiſſe, quorum nonnullos memini,

mini, nec immeritò in Præfatione ad primum Volumen, nec opus eſt illos hoc in loco repetere, ſed eò referam Lectorem meum ut illorum nomina illi innoteſcant; quibus addere licet D. Guil. Sherard, LL.D. *qui jam Conſul agit Smyrnæ, pro Societate Turcica,* D. David Kreig, M.D. D. Jacobum Petiver, & D. Finch, *Pharmacopœas* Londini.

Nominum

Nominum Abbreviatorum Dilucidatio.

A. Litera margine posita indicat Mineras, Plantas, & Animalia illa, quibus præfigitur Angliæ alumna esse.

Act. Philos. & *Transact. Philos.* Acta Philosophica Regiæ Societatis Londinensis.

Agricol. Agricola de Re Metallica.

Aldrov. Aldrovandus.

Alpin. Prosperus Alpinus.

Amman. Pauli Ammani Manuductio ad Materiam Medicam.

Ang. & *Anguil.* Aloysius Anguillara.

Bellon. Bellonius.

Bocc. Paulus Boccone in descriptione Plantarum rariorum Siciliæ, &c.

Bod. à Stapel. Joannis Bodæi à Stapel Comment. in Theophrasti Historiam.

Boet. Boetii de Boot Gemmarum & Lapidum Historia.

Bonan. Bonanni Recreatio mentis & oculi.

Bont. Jacobus Bontius in Historia Naturali Ind. Orient.

Breyn. Cent. Jacobi Breynii Centuria. *idem. Prod.* 1. & 2. Prodromus primus & secundus ejusd.

Breyn.

Breyn. Diſſert. Bot. Joannis Philippi Breynii Diſſertatio Botanica.

Cam. Camerarius.

Camel. Syllab. Georgii Joſephi Camelli Stirpium Inſul. Luzonis, &c. Syllabus.

C. B. Caſpari Bauhini Pinax. *C. B. prod.* Prodromus ejuſdem. *C. B. Theat.* Theatrum ejuſd.

Cat. Angl. & *Cat. Plant. Angl.* Joannis Raii Catalogus Plantarum Angliæ.

C. C. Catalogus Plantarum circa Cantabrigiam naſcentium ejuſd.

C. Jamaic. & *Cat. Jamaic.* Hans Sloanii Catalogus Plantarum Jamaicenſium.

Cæſ. & *Cæſalp.* Andræas Cæſalpinus.

Chab. Dominici Chabræi Stirpium Sciagraphia.

Charlt. ex. Gualteri Charltoni Exercitationes de Differentiis & Nominibus Animalium.

Cluſ. Carolus Cluſius.

Col. & *Colum.* Fabius Columna.

Commel. in not. Joannis Commelin in Notis ad Hortum Malabaricum.

Commel. Prælud. Bot. Caſpari Commelini Præludia Botanica.

Dioſc. Pedacius Dioſcorides Anazarb.

Dod. Remberti Dodonæi Pemptades.

El. Bot. Joſ. Pitton Tournefort Elementa Botanica.

Ephem.

Ephem. German. Ephemerides Germanicæ.

Flo. Lugd. Bat. Flo. Floræ Lugduno-Batavæ Flores.

Gal. & *Galen.* Galenus.

Garz. Garziæ ab Hocto Aromatum Hiſtoria.

Gaz. Pet. Jacobi Petiverii Gazophylacium Naturæ & Artis. Dec. 1. 2. 3. 4.

Ger. & *Ger. emac.* Joannis Gerardi Hiſtoria Plantarum emaculata.

Geſn. Conradus Geſnerus.

Herm. & *Herm. Cat.* Horti Lugduno-Batavi Catalogus, Paulo Hermanno.

Hern. Franciſci Hernandez Plantarum, Animalium, &c. Mexicanorum Hiſtoria.

Hoffman. Caſparius Hoffmannus de Medicamentis Officinalibus.

H. Beaum. Catalogus rariorum Horti Beaumontiani, à Kiggelario editus.

H. M. Hortus Malabaricus.

H. Ox. Roberti Moriſoni Hiſtoria Plantarum Oxonienſis. Pars 2. & 3.

Imperat. Ferrantes Imperatus in Hiſt. Nat. Ital.

J. B. Joannis Bauhini Hiſtoria Plantarum 3 Vol.

Jonſ. Joannis Jonſtoni Hiſtoria Animalium.

Jonſ. D. De Arboribus ejuſdem.

Laet. & *de Laet.* Joannis de Laet de Gemmis & Lapidibus.

Liſter.

Liſter. & *Liſt. Hiſt. A.A.* Martini Liſteri Hiſtor. Animalium Angliæ. *idem icon.* & *Hiſt. Conch.* Hiſtoria Conchyliorum ejuſdem.

Lob. & *Lobel.* Lobelius in Adverſaria & Obſervat.

Marg. & *Marck.* Georgii Marcgravii Hiſtoria Naturalis Braſiliæ.

Matth. Petri Andrææ Matthioli Commentarium in Dioſcoridem.

Mer. P. & *Mer. Pin.* Chriſtophori Merrett Pinax. Rerum Naturalium Britannicarum.

Mor. Prælud. Roberti Moriſoni Præludia Botanica.

Mor. umb. idem in umbelliferarum diſtributione.

Mouff. Tho. Mouffeti Theatrum Inſectorum.

Munt. Abrahamus Muntingius in Aloiderio, Herba Britannica.

Muſ. Reg. Soc. Muſæum Regiæ Societatis.

Muſ. Pet. Jacobi Petiverii Muſæum.

Offic. Nomina uſitata in Officinis denotat.

P. B. Phytologia Britannica.

P. B. P. Paradiſi Lugduno-Batavi Prodromus.

P. Al. Leonardi Plukenetii Almageſtum Botanic.

P. Mant. Mantiſſa ejuſdem.

P. P. Phytologia ejuſdem.

Park. Joannis Parkinſoni Theatrum Botanicum. *idem Parad.* Paradiſus ejuſdem.

Parad. Bat. Pauli Hermanni Paradiſus Batavus.

Plin.

Abbreviatorum Dilucidatio.

Plin. C. Plinius ſecundus in Hiſtoria Naturali.
Piſ. & *Piſon.* Guil. Piſonis Hiſtoria. *idem Mant.* Mantiſſa Aromatica ejuſd.
Rauwolf. Leonardi Rauwolfii Itinerar. in Orient.
R. Cat. Joannis Raii Catalogus Plantarum Angl.
R. D. Dendrologia ejuſdem.
R. H. Hiſtoria Plantarum ejuſdem, 3 Vol.
R. Meth. Methodus Plantarum nova ejuſdem.
R. Meth. A. Eadem emendata & aucta, ejuſd.
R. Ornith. Franciſci Willoughbæi Ornithologia, à Joanne Raio edita.
R. Ichth. Franc. Willoughbæi Ichthyologia ejuſd.
R. Synop. Animal. & *H. Animal.* Joannis Raii Synopſis Animalium.
R. Synop. Synopſis Plantarum ejuſdem.
Rivin. Auguſti Quirini Rivini Introductio ad Rem Herbariam.
Rondel. Rondeletius
Ruel. Johannis Ruellius.
Salv. Salvianus.
Scalig. Scaliger.
Schrod. Joannis Schroderi Pharmacopœia.
Schwenckfeld. Schwenckfeldius.
Sibbald. Roberti Sibbaldi Balenalogia nova.
Syen in not. Arnoldus Seyen in notis ad Hortum Malabaricum.
Theoph. Theophraſti Ereſii Hiſtoria Plantarum.
T. Coroll. Joſephi Pitton Tournefort Corollarium Inſtitutionum Rei Herbariæ. *idem Inſt.* Inſtitutiones Rei Herbariæ ejuſdem.
Trag. Hieronymus Tragus.
Turn. Turnerus.
Volck. Jo. Geo. Volckameri Flora Norimbergenſis.
Uſu. In uſu ſunt.
Worm. Wormii Muſæum.

PHAR.

PHARMACOLOGIÆ,

SEU

Manuductionis ad MATERIAM MEDICAM:

LIBER PRIMUS.

SECTIO PRIMA.

De Aquis Medicamentoſis.

I. *Aquæ Simpliciores. Pag.* 41. *poſt lin.* 8. *adde,*

N. 1. Ad quæ aqua ſine peculiari mentione alterius, e.g. pluviæ, &c. recipi jubetur.

N. 2. Præfertur inter fontanas quæ fluit ab Oriente ad Occidentem, quæ decurrit à montanis locis altioribus, quæ viſu, guſtu & olfactu, pura, clara, tenuis,

nuis, levis, ac sincera deprehenditur, ut & quæ citò incalescit, & citò refrigeratur; quæ Hyeme calidior; æstate frigidior. Aquam hanc injectò pane tosto corrigere, ægrotisque, loco potus salis grati concedere nostrates consueverunt. *Schrod.*

Lotiones in aqua fontana, seu Balnea frigida Veteribus in frequenti usu fuisse ad varios morbos sanandos legimus; nuperrimè etiam plurimùm commendantur à medicis nonnullis eruditis; inter quos eminet D. *J. Floyer, Equ. Aurat.* M. D. scripto non ita pridem libello de eorum usibus, titulo *Antiquæ Ψυχρολουσίας redivivæ*, &c. in quo p. 22, & 23. Catalogum exhibuit Morborum Aquis Balnearum *Sti. Chaddi* prope *Lichfieldiam* sanabilium.

Balnea autem frigida in quatuor genera dividit, *viz.* 1um est eorum quæ moderatum obtinent calorem, uno tantùm gradu corporis nostri humoribus minorem; cujusmodi sunt Balnea frigida *Buxtoni* in *Derbia*, & *Bristoliæ* in *Somersetia*. 2. Aquæ fluviatiles æstivo sole calefactæ. 3. Aquæ fontium frigidissimorum, quales sunt *S. Winifridæ* in Com. *Flint*, & *Serbach* in *Lancastria*, *S. Chad* supradictæ, &c. 4. Fontes frigidæ minerali quodam impregnati, ut 1. Sulphuris fœtidi fontes, cujusmodi sunt *Godshallæ* in *Staffordia*, & D. *Nath. Curzoni* Equ. Aurat. prope *Derbiam*. 2. Aquæ Vitriolicæ. 3. Aquæ vitriolo Cupri infectæ. 4. Fontes Salini & Aqua Marina. 5. Aquæ petrificantes, ut *Newnhamenses* in *Warwicensi* Comitatu, &c. 6. Aquæ bituminosæ, ad Wells-low-Bridge, in *Staffordia*, &c. 7. Aquæ Nitrosæ purgantes. 8. Aquæ plumbo impregnatæ, ad Holy-Well, &c. 9. Aquæ Stannoæ in *Devonia* & *Cornubia*. 10. Alabastrites, ut prope Tutbury in

n *Staffordia.* 11. Aquæ margâ tinctæ, ut quæ rope *Hinchley* in *Leiceſtria* habentur, 12. Aquæ alce imbutæ, ut quæ prope *Verulamium* in *Hart-ordia*, & *Walſhall* in *Staffordia* occurrunt. Qui lura velint, librum ipſum conſulant: Quem in atinum verſum in *Hollandia* impreſſum iri au-io.

Præter morbos prædictos *S. Chaddi* aquis ſana-iles, aliæ plurimæ medelæ inſignes Balneis frigi-is effectæ, per totum librum memorantur, qua-um multæ ab eruditis medicis hodie viventibus bſervatæ ſunt.

A. 2. Aqua Putealis *Offic.* Well-Water. Fon-ana vilior, & crudior ut plurimum habetur; eò uod ponderoſior plerumque ſit ac linguam magis eriens. Verùm ſi ex vivis ſcaturiat ſcaturigini-us, reliquiſque bonitatis ſignis abundat; illius vi-es ſubire haud inepta eſt.

A. 3. Aqua fluviatilis *Offic.* River-Water. Quod adiis ſolaribus expoſita fuit, magis habetur di-geſta quidem, quam putealis: Verumtamen in ſurpatione ejus, non erit inutile, ſpectare, un-e originem trahat, quoque perlabatur.

A. 4. Aqua Paluſtris *Offic.* Pond-Water. Peſſi-na omnium cenſetur, adeóque à Medicina elimi-anda.

Pag. eadem lin. 12. poſt Verbum *fit* adde,

Aquam marinam in receptacula Salt Marſhes icta infundunt, ubi Solis calore coagulatur. ro modis conficiendi Vide *Act. Philoſoph. Lond.* . 51.

Johannes Speed Salis cujuſdam meminit à late-ibus lapidum quorundam in fluvio *Were* juxta

Butterbeck prope *Dunelmum* jacentium exeuntem qui Solis calore, æſtivo tempore, ab aqua ſalſa rubente refluxûs marini tempore in Salem candidum induratus. A *Camdeno* quoque memoratur in *Britannia*, p. 744. his verbis: *Inde* Vedra *decurrit, crebrò eminentibus ſaxis interpolatus, quibus ſi aqua infundatur, parumque miſceatur, ſalſam imbuit qualitatem.*

Pag. eadem lin. pariter eadem, poſt verbum *tranſportatur* adde,

Alium Salis ex aqua marina conficiendi modum *Lemingtoniæ* in Comitatu *Hantoniæ* uſitatum, ab Inſula cui inædificatur oppidum iſtud, nomine Port Sea Salt. dicti meminit D. *Joan. Collins* in Tractatu ſuo *De Sale & Piſcatura*, p. 18. Aquam ſcilicet marinam in Vaſa Wine-Pans dicta infundunt, ubi primo Solis calore paulùm evaporatur, poſtea ignis vi excoquitur, Sal purgatur & coagulatur.

Quinetiam Salis genus ex aqua marina coquendo efficitur, cujus parandi modus apud *Shields* prope *Novum Caſtrum* uſitatus (quod genus *Sal Novo-caſtrenſis*. i. e. New-Caſtle Salt inde dicitur, ut & in Comitatibus *Dunelmenſi* & *Northumbrico* à D. *Collins* libro prædicto, p. 10. quo lectorem refero.

Sal inſuper in *Lancaſtria* ex arena marina elicitur; modum videſis apud clariſſimum *A. Joan. Raium* in *Vocum Anglicarum localium Sylloge* Ed. 3. p. 209. *Camdenum in Britannia*, p. 753. his verbis deſcriptum: *In ora hac maritima multis in locis ſabuli cumulos videas, quibus aquam ſubinde infundunt, donec ſalſuginem contraxerit, quam poſtea ſubditis*

ubditis glebis in candidum ſalem excoquunt. Nec *Lancaſtria* tantùm, ſed in *Hantonia*, ut à præ-icto D. *Collins*, p. 15. certiores facti ſumus.

A. 6. Aqua pluvialis *Offic.* Rain Water. Eſt qua levis linguamque minùs feriens, fontanæ vi-aria, utimur eâ ut plurimum deſtillatâ. Sunt qui præferunt imbres à Meridie advolantes, vel ab O-iente, utpote quas radiis ſolaribus magis impræg-natas & digeſtas arbitrantur.

A. 7. Aqua Nivea *Offic.* Snow-Water. Pluviali affinis eſt, magiſque penetrans, adeóque & ad udorem movendum non inefficax, quas vires na-uræ ſalinæ acceptas refert, quâ præ reliquis a-bundat, vi frigoris condenſata. *Vires.* Odontal-iam pertinaciſſimam aquâ niveâ fuiſſe domitam cribit *Zacut.*

Pag. 42. lin. 6. adde,

Vires. Vim habet laxandi, reſiſtit ictibus ani-malium venenatorum, collectus ab herbis ophthal-micis oculorum affectibus convenit. *Witeel in chrod.*

II. *Aquæ Minerales.*

Pag. 42. lin. 17. ſubjunge,

Hæ à vicino noſtro D. *Ben. Allen*, M. B. in *Hiſtoria* ſua *Chalybeatarum & purgantium aquarum Angliæ* in duo genera dividuntur. 1um eſt earum *quæ copioſum Salem nitroſum continent*, quales unt quæ ad *Leez*, *Witham*, & *Markshall* in *Eſſexiæ* Comitatu, *Knaresborough* in *Eboracenſi* Provincia,

Ilmingtoni in *Warwicenſi* agro & *Ayleſham* in *Norfolcia* occurrunt. 2. *Acidulæ* ſeu *Chalybeatæ leviores*, ut *Tunbridgenſes* in *Cantio*, *Wellingburgenſes* in *Northamptonia*, *Iſlingtonenſes* prope *Londinum*, *Felſtedenſes* in *Eſſexia*, & *Oultonenſes* in *Norfolcia*.

Prædictus Autor tertium adhuc Genus harum aquarum conſtituendum arbitratur, cui *Acidæ chalybeatarum* nomen convenire cenſet. Hujus generis characteriſticam facit: *Quod ponderoſiores ſint, coloris ſui tenaces, quod mineræ minus, plus ſpiritûs contineant, quodque cum gallis colorem Cæraſi inſtar rubentem reddant, ad modum Spirituum Vitriolinorum.* Hanc claſſem eſſe ad quam *Markhallenſes* & *Knaresburgenſes* propriè & peculiariter pertinent. Hanc diviſionem inſtituiſſe ſibi in animo fuiſſe affirmat, verùm ob nimiam feſtinationem memoria excidit membrum hoc tertium & omiſſum eſt.

Pag. eadem lin. 21.

Hæ etiam à prædicto Autore in 3 ſpecies dividuntur, 1. *Seleniticæ*, quæ *Epſhamiæ* in *Surreia*, *Actoni* & *Kenſingtoniæ* in *Middleſexia*, & *Colceſtri* in *Eſſexia* ſcaturiunt. 2. Quæ in terra lutoſa aquabili exiſtunt, ut ad *Richmond*, *Lambeth*, *Stretham* in *Surreia*, *Dulwich* in *Cantio*, *Northall* & *Barnet* in *Hartfordia*, *Upminſter* & *Brentwood Weal* in *Eſſexia*. 3. Quæ chalybeatum admixtam habens, ut *Scarburgi* in *Eboracenſi* Comitatu & ad *Woodham Ferrers* in *Eſſexia*.

Quod ad vires & uſus prædictarum mineralium aquarum attinet, eas in libro prædicto requirendas omitto.

SEC

SECTIO SECUNDA.

De Terris Medicamentoſis.

I. *De Bolo.*

Pag. 44. pro 3. & 4. Specie adde,

3. BOlus Toccavienſis *Offic. Charlt. ex.* Tranſilvanian Bole. Notas Boli Armenæ veræ habet, & inſtar butyri in ore liqueſcit. In *Tranſylvania* ad *Toccaum* ſeu *Tockai* effoditur. *Vires.* In Catarrhis & peſte valdè commendatur. A *Cratone* in uſum medicum fuit traductum, qui eam præferat Armenæ, quæ Imperatori ex *Turcia* allata erat. An à priore differat neſcio.

Pag. 44. lin. 19. adde,

4. Bolus candidus *Offic.* candidus Lignicenſis ſeu Terra ſigillata Goltbergenſis *Charlt. ex.* Axungia Lunæ *Chymicis* White Bole. Effoditur ad Goltbergam in Ligies, & Strigonium. *Vires.* Capitis dolores mulcet & mitigat, cerebrum roborat, Diarrhœæ & Dyſenteriæ medetur, albumque Uteri fluorem peculiari vi curat.

II. *De Argillis.*

Pag. 45. lin. 22. ſubjunge,

3. TErra Lemnia alba *Offic. Worm. Charlt. Ex.* White Earth of Lemnos: Aliquantulum tenax & lubrica eſt, ob pinguedinem, adeò ut linguæ adhæreat ſine mordacitate. Si in aqua reſolvitur, ſimilis erit molli ceræ. In Inſula Lemno eruitur. *Vires.* Sanguinis ex utero profluvia, & fluxus muliebres compeſcit, venenis morbiſque malignis reſiſtit; rabidi canis morſui medetur.

4. Terra Eretria *Offic. Charlt. Ex.* Eretrian Earth. Duæ ſunt Eretriades; una alba eſt, altera cinericea. Optima habetur ad cinericeum colorem vergens perquam mollis: quæ ſi per æramenta tracta tractim ducatur lineam violaceam refert. *Vires.* Vim habet adſtringentem, & refrigeratoriam, leviter mollientem: cava explet, & ſanguinolenta conglutinat. *Dioſc.*

5. Pnigites *Offic. Charlt. Ex. Worm.* Terra Pnigites *Dioſc.* Black Earth. Pinguis eſt, ſpiſſa, mollis, nigra, adſtringens, & acris valdè, ſapore Vitriolum refert. *Vires.* Eoſdem effectus habet quos Cimolia, paulò tamen infirmior eſt. *Dioſc.* Partibus diviſis conſtare affirmat *Wormius.*

Pag. ibid. lin. 30. poſt *Vulgò* adde,

Sive Terra Strigonſis. Sigillata Strigoniana *Charlt. Ex.* Sileſiaca ſigillata qui Chymicis Axungia Solis dicitur *ejuſd.* Terra ſigillata Sileſiaca, ſive Terra ſigillata Germanica, Sigillum

lum Strigonienſe, Axungia Solis Chymicorum *Worm.* Terra ſigillata Strigonienſis, *Schwenck. Foſſil.* 395.

Pag. ibid. lin. 31. poſt Earth ſubjunge,

Of Striga. Terra eſt lutei coloris, ad flavedinem vergens, pinguis, viſcoſa, inſtar butyri in aqua vel ore diffluens. Generatur in Auri fodinis montis acuti, ſeu D. *Georgii* ad Strigomium oppidum Ducatu, Suidnicenſis inter duriſſimas rupes. Inde eruitur, & ſumma diligentia ordinatione Magiſtratûs præparatur, & in formam orbiculorum, impreſſo ſigillo Urbis, redigitur. *Vires.* Hæmoptoicis Phthiſicis, ulceribuſque Pulmonum utilis: Contra omnem Hæmorrhoiam valet: Dyſenteriam aliáque ventris profluvia ſiſtit. *Schwenck.* Magnoperè laudatur à *Sennerto Lib. de Peſte.*

8. Terra Turcica *Offic.* ſigillata Turcica *Schrod.* Paſtilli Turcicis characteriſticis inſigniti *Worm.* Turkey Earth. Color internus totius maſſæ cinereus. *Vires.* Pro Terra Lemnia communiter venditur, cujus viribus reſpondet.

9. Terra ſigillata Livonica *Offic. Worm. Charl. ex.* Sealed Earth of Livonia. Rubicundior eſt quàm Terra Sileſiaca. *Vires.* Valde adſtrictoria eſt; ideoque in Dyſenteria, Diarrhœa, aliiſque profluviis commendatur.

Pag. 47. lin. 23. adde,

13. Terra Chia *Offic. Charlt. ex. Worm.* Earth of Chios. Ex Inſula Chio allata eſt terra cruſtoſa, candida, vergens ad cinereum, Samiæ ſimilis. *Vires.* Ad rugas abſtergendas, ad ambuſta aliaque ad quæ Samia commendatur. *Worm.* Ejus loco ſubſtitui poteſt vel Samia vel Cimolia alba.

14. Terra Portugallica. Earth of Portugal. Terra eſt colore ſubrubens ad roſam vergens. Stiptica & aſtringens, adeo ut linguæ adhæreat; in placentulas coacta, ſignatura roſæ impreſſa. *Vires.* Valdè adſtrictoria & ſtiptica eſt: in profluviis ventri valet.

Poſtquam hæc ſcripſeram fragmenta quædam ollarum accepi nomine Terræ Portugallicæ colore rubentis, inſtar Boli veræ, tactu ſtipticæ & aſtringentis. In omni fluxu ventris etiam laudatur.

III. *De Marga.*

Pag. ibid. lin. 28. adde,

A. 1. Marga *Offic. Schrod. Mer. P.* Marle. Variæ ſunt ſpecies & colores ut ruffa, griſea & lutea. Eſt porio quædam pinguis & quaſi medulla in ſaxis nonnullis dum franguntur reperta. *Vires.* Siccat, conſtringit, conſolidat, ſarcotica eſt, tartarum, ſanguinemque coagulatum reſolvit. *Schrod.*

2. Marga ſaxatilis cinerea *Offic. Worm.* Goſlarica *Agricol.* Aſh-coloured Marle. In ſaxorum cavitatibus & fiſſuris reperitur. Cinerei eſt coloris, ex cruſtis craſſis conſtans, ſapore aridiuſculo.

Vi-

Vires. Adſtringentem & Emplaſticam vim habet, ſanguinis profluvium ſiſtit. Externè cum Terrâ Samiâ viribus convenit.

3. Marga ſaxatilis incarnata *Offic. Worm. Charlt. ex.* Reddiſh Marle. Ex montibus Bohemicis & Lygiis allata. Terra eſt pinguis & lubrica, colore incarnato, ponderoſa, linguæ adhærens, digitos ſubluteo colore tingens. *Vires.* Prodeſt ruptionibus, fracturis, fluxionibus, Hæmorrhoicis Dyſentericis; venenis morbiſque peſtilentibus reſiſtit.

4. Marga candida *Offic.* Feroenſis *Charlt. ex.* ex inſulis Feroenſibus *Worm.* Stenomarga *Agricol.* Agaricus mineralis *Imper.* Lapis Morochthus *Boet. De Laet.* Lac Lunæ *quibuſdam* White Stone-Marle. In Germania reperitur. Subſtantia eſt fungoſa, alba, friabilis. *Vires.* Refrigerat, adſtringit, Sanguinis eruptiones ſiſtit.

A. 5. Lapis Morochthus *Offic. Boet.* Morochthus *De Laet.* Morochthus aliis Leucogæa, Leucophragis, Galaxius, Graphida, Galactites *Worm. Charlt. ex.* White-Marking-Stone. Eſt ſubſtantia mollis, lubrica, colore varians, viridis, aliquando alba, nigra, vel mellis. Reperitur in Anglia, Saxonia, Ægypto, &c. *Vires.* Convenit iis qui ſanguinem expuunt, cœliacis, & veſicæ doloribus, ad fluxus matricis commendatur. Ulcera oculorum ſanat. *Dioſc.*

6. Lapis Galactites *Offic. Boet. De Laet.* Milk-Stone. Subſtantia eſt molli, cinerei coloris, guſtu dulcis. Invenitur in Saxonia. *Vires.* Laudatur ad fluxiones oculorum, & ulcera *Dioſc.* Nutricum Lac auget *Boet.*

7. Lapis

7. Lapis melitites *Offic. de Laet. Boet.*, The Honey-Stone. A Galactite tantum colore & dulcedine differt. *Vires.* Ejuſdem cum Galactite effectûs *Dioſc.* Abſtergere paulo magis ac paulo calidior Galactite videtur *Galen.*

Inter Morochthum, Galactitem, & Melititem *hoc diſcriminis ponunt, quod* Morochthus *lacteum ſuccum edat, abſque mellis dulcedine, nec albus, nec cinereus exiſtens.* Galactites *verò albus vel cinereus eſt, lacteum ſuccum ſine mellino ſapore promens.* Melitites *verò vario colore, ſuccum lacteum mellis dulcedine exhibet.* Sic *Wormius.* Verùm has tres *Jo. de Laet.* lib. *de Gemmis & Lapidibus*, p. 142. inter ſe differre ſtatuit, & hoc modo diſtinguit. *Qui igitur cinereo colore conſtat aut nigro,* Galactites *fuerit: qui flaveſcit, mellis ſimilitudinem etiam in colore referens, merito dici poſſit* Melitites: *ſubviridis autem* Morochthus. *Nitet autem gemmæ inſtar* Morochthus *magis quam cæteri.*

8. Lapis Thyites *Offic. Boet. de Laet.* The Green Stone. Subviridi eſt colore, Iaſpidem imitatus, cùm diluitur tamen lacteum ſuccum reddit. Vehementer mordet. In Æthiopia gignitur. *Vires.* Tenebras, quæ pupillis obverſantur expurgat *Dioſc.*

Thyites *Dioſcoridis* quid fuerit nobis incognitum eſt. At neque ſuperioris ſeculi ſcriptoribus meliùs intellectum. *Fuchſius* lapidem Turcicum eſſe exiſtimat, cujus opinio à *Matthiolo* bene refutatur, ad quem lectorem remitto. *Agricola lib. 6. de Nat. Foſſil.* à Morochtho nihil differre judicat.

IV. *De Creta.*

Pag. 50. lin. 13. adde,

A. 3. Plumbum nigrum *Offic.* Nigrica fabrilis *Mer. Pin. Charlt. ex.* An Creta nigra mollis & dura argenteis maculis nitens *Kentman?* Black Lead. Invenitur in fodinis. Mollis eſt, ſed tamen conſiſtentiæ firmioris, lævis & ſplendens, non petroſa, in fruſta variæ magnitudinis diviſa. *Vires.* Refrigerat, ſiccat, repellit. Uſus præcip. adverſus ſtrumas tumoreſque frigidos & Phlegmaticos. Ad ducendas lineas, & monochromata à Pictoribus & fabris uſurpatur. N. B. *Optima cenſetur quæ invenitur in* Anglia, *quæ ex* Hiſpania *adfertur fragilis eſt, peſſima quæ ex* India Orientali *advehitur.*

4. Creta Selenuſia *Offic.* Selenuſia Terra *quibuſdam.* Earth of Selenuſia. Maximè laudatur, quæ vehementer reſplendet, candida, friabilis, & humore dilui celerrima. *Vires.* Siccat & aſtringit, ad ulcera commendatur.

SEC-

SECTIO TERTIA.

De Sulphuribus Medicamentoſis.

III. *De Bitumine.*

Pag. 54. lin. 8. poſt *enecat* adde,

Wormius Gagatem duriorem tantùm Ampelitidis lapidis ſpeciem facit, cumque expolitur à *Plinio* Gemmam Samothraciam, à *Nicandro* Lapidem Thracium, nonnullis lapidem Obſidianum vocari ait.

A. 2. Lithanthrax *Offic. Mer. Pin.* ſeu Carbo foſſilis *Charlt. ex. Boet.* Carbo foſſilis ſeu Lithanthrax *Worm.* Pit-Coal or Scotch-Coal. In agro *Derbienſi*, &c. reperitur. *Vires.* Exſiccandi & digerendi vi pollet *Worm.*

Pag. 54. lin. 11. adde,

4. Lapis Thracius *Offic.* Thracian Stone. Naſcitur in flumine quodam *Scythiæ*, cui *Ponto* nomen eſt. *Vires.* Vis ei Gagatis *Dioſc.*

Variæ inter Authores occurrunt opiniones de hoc lapide. *Matthiolus* hiſtoriam ejus ex *Galeno* his verbis tradit, *(Eſt & alius lapis, cujus meminit* Nicander *hunc in modum,*

Si

Si lapis uratur candenti Thracius igni, &
Poſt madefiat aqua, flagrabit totus: at idem
Mox oleo affuſo, penitus reſtinguitur: adfert
Thracius hunc ad nos paſtor de flumine, nomen
Cui Pontus.----

Verùm nullus ejus in medicina uſus: neque Nicander *præter graveolentiam, quæ ſuffitu feras fugat, quicquam ei adſcripſit)* Verùm fabuloſum potiùs quam verum eſſe concludit, cùm nec à ſeipſo nec ab amicorum quoquam in *Italia* inveniri potuerit. *Boetius de Boet.* nonnullos eum pro Gagate, alios pro Lithanthrace habere ait. *Wormius*, ut ſupra diximus, idem cum Terra Ampelitidi facit. In Officinis noſtris *Anglicanis* hodienum incognitus eſt. Verùm cum *Dioſcorides* Gagatis vires ei attribuit, Gagates pro eo ſubſtitui & uſurpari poteſt.

Pag. 55. lin. 31.

Ex hoc Bitumine, addito olei Aniſi tantillo, Pharmacopolæ noſtri Londinenſes *Balſamum Chilenſis* nomine celebratum conficiunt.

SECT.

SECTIO QUARTA.

De Salibus Medicamentoſis.

I. *De Sale Communi.*

Pag. 58. lin. 24. poſt *pollet* ſubjunge,

MOdus excoquendi Salem ex aquis fontium Salinorum in *Ceſtria*, *Wigornia*, & *Staffordia*, deſcribitur à doctiſſimo viro & amico noſtro D. *Joan. Raio* in *Sylloge Vocum Anglicarum*, p. 204. Item in *Actis Philoſoph. Lond.* N. 53, 54, 142, & 156. Necnon à D. *Collins* Tractatu *de Sale & Piſcatura*, p. 5. & D. *Plot. Hiſt. Nat. Stafford.* p. 93.

Hoc in loco addere poſſem modum purificandi Salem, qui fit vel diſſolvendo Salem rupeum vel Salem marinum Gallicum in aqua marina, deinde coquendo, clarificando, & in granula coagulando, prout in *Eſſexia* adminiſtratur: idem ferè eſt cum Salis *Ceſtrienſis* depuratione.

Marburiæ in *Ceſtria*, Anno Dom. 1670. detecta eſt Petra Salis Nativi, unde emanat liquor ſalſus valdè acutus. Petra hæc inter 33 & 34 ulnas noſtræ menſuræ à terræ ſuperficie aſſurgit, eſtque duritie & puritate Alumini par, inque pulverem comminuata in Salem candidum & acutum abit. Qui plura de hac rupe ſcire deſiderant, *Act. Philoſoph.*

Philoſoph. Lond. N. 66. conſulant. Ex hoc Salis genere ex *Ceſtriæ* comitatu per mare ad nos delata prope *Camalodonum* & *Colcheſtriam* aliiſque locis efficitur Sal ille, qui apud *Eſſexienſes* Salt upon Salt. i. e. Sal ſuper Salem, ſeu Sal ex Sale dictus, diſſolvendo Salem foſſilem in Aqua marina, coquendo, clarificando, &c. ut ſuperius dictum eſt.

Aqua è fontibus ſalinis mediterraneis ad ſiccitatem excoquatur, rurſus ejus Sal tantillo aquæ fontanæ diluatur, cryſtallos verè cubicas dat (ut ſcribit clariſſimus D. *Mart. Liſter*, M. D. in *Exercitatione ſua de Fontibus Medicatis* Angliæ, p. 4.) in medio verò ſuperiore latere, ſive plano, velut quædam perſpicuitas, putà à materiæ deficientia ſive inanitate habetur: reliqua autem quinque latera ſolida & albida ſunt.

Idem etiam laudatiſſimus Autor obſervat, quòd non obſtante proximâ affinitate, quæ inter Salem puteorum mediterraneorum & marinum intercedit, eos tamen ſpecie inter ſe differre: ſiquidem anguli cryſtallorum Salis puteorum mediterraneorum integri ſunt, ut dictum; cum anguli cryſtallorum genuini Salis marini, aut eorum ſaltem aliqui in plana triangularia abſciſſi ſunt, ab uno cuborum latere: unde colligit aquam marinam ab omnibus aliis aquis diſtinctam eſſe. Qui plura de his velit, eundem doctiſſimum Autorem conſulat, apud quem utriuſque generis figuras inveniat. Videſis etiam *Act. Philoſoph. Lond.* n. 156. p. 492.

II. *De Sale Gemmæ.*

Pag. 59. poſt lin. 13. adde,

SAL Gemmæ ſupra dicto modo ſolutus, in cryſtallos cubicos coagulatus, ideoque ab eodem D. *Liſter* pro eadem Salis ſpecie habetur.

2. Sal Foſſile Marburienſis, **Rock-Salt.** Ex Marburia in Comitatu *Cheſtrienſi* dilati eſt. Subſtantia eſt cryſtallina, & hexagona, pellucida, ſaporis acris & ſalſi. Cum Sale Gemmæ viribus convenit.

III. *De Sale Nitri.*

Lin. ult. ſubjunge,

INgenioſiſſimus vir D. *Martinus Liſter* in libro ſuo citato figuras cryſtallorum Nitri, exhibuit ut & eorundem deſcriptionem, quam huc tranſcripſi: *Nitrum, in cryſtallos ſexangulas tenues, longas, & æqualiter craſſas concreſcit. Hæ cryſtalli ſua latera parallelogramma habent. Eadem autem deſinunt, ex altera tantùm parte, vel quadam acie, vel mucrone, pyramidis in modum acuminato, ſcilicet, ob varium poſitum duorum planorum laterum. Ex altera verò parte haud poliuntur cryſtalli, ſed ſemper quaſi præfractæ deſinunt; idque moneo, ne Nitri figura à me primùm delineata & evulgata, & à quodam ut video nuper minùs rectè expoſita, aliquem decipiat.*

No-

Notandum autem eſt, mucronem illum acuminatum, quem ferè ex altera parte uniuſcujuſque cryſtalli nitri, ad modum coni figuratum eſſe diximus, ex ipſa priſmi extremitate eſſe conſtitutum, & nullatenus ipſum priſmi corpus extenuari: quod tamen multos de his nitri cryſtallis incautè ſomniare video. De ſimplici autem & primaria harum cryſtallorum concretione loquor: nam fortuita quadam plurimarum coitione id aliquando evenire videtur. At illa quidem differentia notanda eſt, quòd quæ ſic fortuito coeunt, eædem, ſi denuò aqua diluantur, in perfectam ſui generis ſpeciem tandem ex toto reduci poſſint.

Præter cryſtallos verò ſexangulares è ſalæ petræ diluto formatas, ibidem etiam non rarò (ſi ſal minùs purgatum ſit) alias quoque cryſtallos cubicas multangulares, neſcio quaſdam reperias: & hæ omnes ſeorſim collectæ, ex nova ſolutione, vel in cryſtallos Nitri ſupra deſcriptas abeunt, vel ſuam originem, ſi alienæ ſunt, fatentur. Sal autem Nitri dictus in ignem impoſitus, illicò flammam tenuem concipit, & ex toto non ſine ſtrepitu abſumitur, omnino nihil capitis mortui, aut Colcotharis, ut Chymici loqui amant, relicto.

Pag. 60. ad finem paginæ adde,

Sal Salis petræ dictum Salis marini ſpecies eſt adhærens lateribus & fundo doliorum Settling Tubs dictorum, in quæ liquor poſt primam Salis Petræ depurationem ex aheno cochlearibus infunditur ad refrigerandum uſque dum digitus abſque læſione in eum immitti poſſit, antequam in vaſa ad cryſtallizandum, Shooting-Trays dicta, expromitur. Vide D. *Collins* librum ſuperius memoratum,

moratum, p. 125. ubi affirmat coctione valida glebas affici Sacchari panum conicorum aut Aluminis magnitudine, quæ à *Pharmacopolis* nonnunquam Salis Petræ depurati nomine divenduntur.

IV. *De Alumine.*

Pag. 61. lin. 18. adde,

FIguræ Aluminis, ejuſque pariter deſcriptio à D. *Liſter* libro prædicto traditur his verbis: *Lixivium è cremato Aluminis metallo diuque ſervato percolavimus, ſiccavimuſque: id autem Cryſtallos albas ad hunc modum figuratas dabat; nimirum bis figura paululùm compreſſa eſt, ex altera parte, quaſi vertice dicas, planum ſexangulum habet, ex altera & oppoſita parte ſive baſi plano ſimiliter ſexangulo inſidet; ejus autem latera claudunt tria ſexangula plana, quibus alternatim bina plana quadrangula interponuntur, ita quælibet integra aluminis Cryſtallus ex undecim planis conficitur: Scilicet è quinque ſexangulis, & ſenis quadrangulis planis: illa autem ipſa Cryſtallus quam deſcripſi, quinquaginta circiter grana pendebat. N. B. Simplex autem & primaria univerſorum ſalium concretio bene, & diligenter notanda eſt. Nam ubi ea diutiùs proceſſit, Cryſtalli quidem magnitudine augeri videntur: At id ferè fit plurium ſalium integrorum & primariorum conjunctione quadam fortuita, unde veræ & naturalis Cryſtallorum figuræ confuſio oritur.*

Pag.

Pag. eadem lin. 26. ſubjunge,

Modus efficiendi Alumen rupeum *Solfæ* in *Italia* accuratè traditur à D. *Paulo Boccone* in *Muſeo ſuo della Fiſica*, &c. p. 241. quem conſulat Lector. In pleriſque convenit cum præparatione Aluminis vulgaris.

V. *De Borace.*

Pag. 62. ad finem capitis 5. adde,

Vires. Digerit, exſiccat, & ſine morſu carnem liquefacit. Ulceribus quæ conſolidationem reſpuunt cum fructu accommodatur, modice pota vomitus movet, *Worm.*

VI. *De Vitriolo.*

Pag. 63. lin. 17. ſubjunge,

Wormius etiam hujus generis Vitrioli in *Anglia* parandi modum deſcripſit, quem quia brevis eſt, ipſius verbis huc tranſcribere non pigebit: *Lapides ex quibus Vitriolum excoquitur ad littus Orientale Inſulæ* Sheppey *reperiuntur. Ubi ingentem horum copiam collegerunt, per ſpatioſam aream terræ miſtos ſpargunt, donec imbrium illuvie, accedente Solis æſtu & calore in terram ſeu pulverem redigantur ſubtiliſſimum, nitroſum ſulphureo odore prætereuntes offendentem. Interea aqua per hanc terram percolata in ſubjecta vaſa per tubulos*

&

& canales derivata in vaſa plumbea ampla ſex vel ſeptem dierum ſpatio coquitur ad juſtam conſiſtentiam, tum in aliud vas plumbeum effunditur immiſſis aſſeribus aliquot, quibus adhærens concreſcat vitriolum omnibus refrigeratis. Nullo alio vaſe coqui aut contineri hoc lixivium poteſt quàm plumbeo; cui ut facilius ebulliat ferri injiciunt particulas, quæ à lixivio plane conſumuntur. Modus etiam Vitrioli *Brickleiæ* in *Eſſexia* conficiendi à celeberrimo Viro D. *Jo. Raio* vicino & amico noſtro tradita in libello ſupracitato, cum proceſſu *Wormiano* convenit: Eandem methodum, in Vitrioli præparandi domibus *Waltoni* & *Ramſeiæ* in eadem *Eſſexia* ſectatam obſervavi. Verùm in *Italia* ejus præparandi modus diverſus eſt, ideòque *Matthioli* verbis deſcriptum damus.

Mineræ glebas in acervos mediocres conjectas igne ſuppoſito accendunt. Sponte autem urunt ſemel accenſæ, donec in calcem ſeu cineres maxima ex parte reducantur. Mineram combuſtam in piſcinas aquæ plenas obruunt, agitando, miſcendoque eam, ut aqua imbuatur ſubſtantia Vitrioli. Aquam hanc Vitriolatam à ſedimento claram hauriunt; & in caldaria plumbea transfundunt, quam igne ſuppoſito decoquunt. Verùm dum ebullit, in medio coctura vel parum ſupra vel infra addunt modicum ferri veteris vel glebæ æris, juxta intentionem operantis. Aquam Vitriolatam decoctam in vaſa lignea transfundant in quibus frigeſcens congelatur in Vitriolum.

Vitriolum viride à prædicto D. *Liſter* pariter depingitur & deſcribitur his verbis: *Vitriolum autem viride, à Pyrite ferreo naſcitur; cujus maturæ & perfectæ cryſtalli perpetuo ex utraque parte mu-*

mucronatæ ſive acuminatæ ſunt, & ex decem planis lateribus inæqualibus conſtant: ſcilicet, ex quatuor mediis planis pentagonis, & ad ſingula quæque extrema acuminata, terna plana triangula habent; perinde ut in figura repræſentatur.

Pag 64. lin. 6. adde,

Apud *Goſlarienſes* conficitur Vitriolum hoc modo: Calcinantur Lapides Pyrites dicti, calcinat. liberiori aeri exponuntur, ſic enim vel ſponte efflorescit Vitriolum, vel per elixationem cum aqua prodit.

SECTIO

SECTIO QUINTA.

De Foſſilibus Metallicis Medicamentoſis.

LApis Schiſtus *Offic. Worm. Boet. D Laet. Charlt. ex.* The Cleaving Stone. Ex Germania tranſportatur. Subſtantia eſt metallica crocei coloris, ſi optimus fuerit, alias nigricat, laminas habens tenues, invicem hærentes, ſplendentes, & perſpicuas. *Vires.* Vim exhibet Hæmatitæ, ſed a omnia infirmiorem, *Dioſc.*

VI. *De Cobalto.*

Pag. 69. poſt lin. 14. adde,

Præter colorem *Ultramarinum* dictum à *Lapi de Lazuli* & *Armenio* factum, p. 84. *Pharma* noſtræ memoratum, pro cujus præparatione ad diſcenda ad *Boetium* Lectorem remitto: Alius cœrulei genus eſt, non tantùm à Pictoribus, ſed etiam à Matronis & lotricibus noſtris uſitatus Smalt dictus, ſed frequentiùs à forma ejus Powder-Blue, i. e. *Cæruleus pulverizatus*, qui à *Cobalto*, cineribus clavellatis, & ſilicibus albis conficitur: cujus conficiendi modus apud *Saxones* G

Germania, prout ab amicissimo viro D. *Davide Krieg*, M. D. mihi communicatus est, sic se habet. Primo Cobaltum in mola in tenuissimum pulverem comminuitur, cumque cineribus clavellatis mixtum in fornice funditur in vitrum obscurè cœruleum; deinde iterum commolitum, & cum idonea quantitate silicum alborum mixtum denuò funditur in vitrum, quo tandem pulverisato partes tenuiores lotione separantur & posteà exsiccantur. N. 1. Quò plures silices post primam fusionem materiæ admiscentur, eo major erit Smalti quantitas, verùm pallidior. 2. Inter lavandum, quod primò à massa abscedit purius & pallidius est posteriore.

VII. *De Phrygio Lapide.*

LApis Phrygius *Offic. Boet. De Laet.* The Phrygian Stone. Nascitur in Cappadocia. Est gleba pumicosa, præfertur qui pallescit, pondere mediocris absque solida compage, ac lineis albis Cadmiæ instar distinctus est. *Vires.* Astringendi, expurgandi & crustas inducendi vim habet. Lavatur ut Cadmia. *Dioscor.* Morbis oculi, atque ad ulcera, &c. utilis est, *Galen.* In officinis nostris Anglicanis hodie ignota est.

IX. *De Story.*

Pag. 70. lin. ult. ſubjunge,

4. MElanteria, *Offic.* Duplicis eſt originis, quædam in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur ſalis modo concreſcit. Alia verò in ſumma facie ſupradictorum locorum coit, quæ terrena eſt. Præſtat quæ ſulphuris colorem trahit, lævis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confeſtim nigreſcit. *Vires.* Vim caufticam eam obtinet, quam & Miſy. *Dioſc.* In officinis noſtris nunquam reperitur.

X. *De Aſio Lapide.*

LApis Aſius, *Offic.* Aſius vel Aſſius lapis quem etiam Sarcophagum vocant *Worm. Charlt. ex.* Sarcophagus ſive Aſſius lapis *De Laet.* & Aſius ſeu Aſſius lapis *Boet.* Aſſian Stone. Eſt minerale leve, fungoſum, friabile, ſciſſile, pumico colore, ſapore ſalſo. In *Uſu.* Minera, ſalſugo ſubflava ſummo lapidi inſidens, compage tenui, guſtu mordente. *Vires.* Utraque vim habet adſtrictoriam, & modicè erodentem. Ulcera vetera ſiccant & cicatrici repugnantia ſanant, excreſcentia cohibent: cava explent; tetra ulcera & fungis ſimilia expurgant. *Dioſc.* Longè validior flos ſeu ſalſugo exiſtimatur.

III.

III. *De Metallis perfectis, quorum mineræ in uſu Officinis non ſunt.*

VI. *De Cupro.*

Pag. 77. lin. 10. poſt *infringendi* adde,

3. FLos æris, *Offic.* Flowers of Braſs. Sunt parva, ſubrubra, ſplendentia granula, ſeminis Milii magnitudine aut minora, quæ laminæ ferreæ, ſupra vaporem ab aquâ æri liquefacto cùm è fornace effluit inſpersâ elevatum, ſuſpenſæ accreſcunt. In fornacibus, ubi æs ipſum funditur in Tridentino agro, ſæpiùs collegit Matthiolus in hunc modum. Cùm æs in fornaci liquatum, in paratum receptaculum extra fornacem diffunderetur, antequam omninò coiret in maſſam, frigidam ſuper ipſum adhuc ignitum infundebat, ſtatimque vapor magnus excitabatur, ſub quo mox ferream laminam & eam quidem amplam, ſubjiciebat, tamdiuque tenebat donec ceſſabat vapor. *Vires.* Adſtringit, & excreſcentia coercet: offuſam oculis caliginem emendat, ſed magnoperè mordet. *Dioſc.* Tenuiorum partium facultatis eſt, quam aut æs uſtum aut ſquama. *Galen.* Nuſquam in officinis noſtris reperitur, quapropter ejus vice ærugine perpetuò utuntur.

SECTIO SEXTA.

I. *De Lapidibus minùs pretioſis.*

Pag. 81. lin. ult. adde,

II. *De Lapide arenoſo.*

A Lapis arenoſus, *Offic.* Saxum arenarium *Worm. Boet. Charlt. ex.* Ammites vel Hammites, *Mer. Pin.* Sand-ſtone or Free-ſtone. Lapis eſt aſper & veluti ex arenis compoſitus. Variis in locis invenitur.

Pag. 82. poſt cap. 3. addatur,

V. *De Adarce.*

ADarces, *Offic. Boet.* Adarce, *J. B. Chab.* Eſt tanquam concreta ſalſilago, humidis & paluſtribus locis ſiccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Aſii ſimilis & omni forma Alcyonia, & aliquantum cavo proxima, ut videri poſſet lacuſtre Alcyonium. *Vires.* Ad evellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie ſimilia, accommodatur. Et in ſumma vis ei acris. Humorem evocat,

cat, qui in alto concrevit, & Iſchiadicis prodeſt. *Dioſc.*

Utrum Adarces *Dioſcoridis* idem ſit cum eo D. *Plot* in *Hiſt. Nat. Oxonienſi*, p. 126. non auſim determinare, neque an vires eædem ſint, à quoquam hactenus, quod ſciam, exploratum fuit. *Plotii* Adarces nihil aliud eſt quàm concretio particularum lapidearum, colore exalbido, quas aqua ad occurſum aquæ alterius, chalybeatæ ſcilicet, præcipitat, adeoque gramina, virgultas aliaque corpora quæ præterfluit incruſtat.

Hujuſmodi incruſtationem obſervarunt multi eruditi Autores, ut v. g. *Pancirollus* quatuor circiter ab urbe *Roma* milliaribus extra Portam Hoſtienſem vulgò Sancti *Pauli*, & D. *Martinus Liſter*, M. D. in aquæductu *Arcuoil* ad *Pariſios*, qui exinde malam de ea opinionem concipiunt, poſterior utique doctiſſimus & laudatiſſimus vir inde colligit quicquid in Aquæductibus, tuborum aquas deferentium latera cruſtâ petrosâ obducit: idem in renibus & veſica, præſertim infirmiorum & teneriorum effecturum veriſimile eſſe. Vide *Iter ad Pariſios*, & *Exercitat. de calculo humano.*

Qui plura de Adarce velit *Boetium* conſulat, p. 403.

Pag. 83. lin. 25. ad *viribus* adde,

Ejus uſus ſummus eſt in omni Hæmorrhogia, in fluxu uteri, & Hæmoptoicis.

Pag. 83. pro 7. car.

VII. *De*

VII. *De Unicornu Foſſili.*

'A. Unicornu foſſile, *Offic.* Cornu foſſile. *Worm. Charlt. ex.* Foſſile vulgò Monocerotis cornu, *Boet.* Ceratitis. *Feſn.* Ebur foſſile. *Cluſ.* Lapis Arabicus. *Cæſalp.* Dens Elephanti petrefactus *aliis* Lithomarga alba. The Unicorn Stone. Eſt Subſtantia lapidea, colore, lævore, & forma, quandoque cornu referens; quandoque durius, quandoque mollius; cortice exteriore duro, flaveſcente, nigro aut ſubcinereo; medulla molli, friabili, compacta, linguæ firmiter adhærente, ſapore adſtringente, & exſiccante. In fodinis reperitur. *Vires.* Cum Terra Lemnia viribus convenit, & contra morbos malignos commendatur.

Pag. eadem lin. pro X. cap. adde,

X. *De Thermolitho.*

'A. Thermolithus, *Offic.* Lapis Schiſtos, *Charlt. ex.* Schiſtos Cornubienſis diu calorem retinens, *Mer. Pin.* The Warming Stone. In Agro Cornubienſi reperitur. Hunc in Catalago Simplicium medicinal. officinalium ad calcem Pharmacopœiæ D. *Shipton* inſertum invenio; ſed de uſu ejus medico nihil occurrit inter Autores.

Pag.

Pag. 88. lin. 6. adde,

Eruditiſſimus Vir D. *Martinus-Liſter*, M. D. in *Itinere* ſuo *ad Lutetiam Pariſiorum* hujus Gypſi ſeu Alabaſtritidis ad *Montmartre* fodinas eſſe refert; quodque ibidem igni aperto expoſita uratur: Duriſſimum autem genus duarum triumve horarum ſpatio ſatis coquitur. Se etiam fodinas ejus vidiſſe ait prope *Clifford-Moor* in *Eboracenſi* provincia, ubi *Hall-plaſter* dicitur.

XVIII. *De Ludo Paracelſi.*

A. Ludus Paracelſi, *Offic. Helmont. Charlt. ex.* Silex ille quem Helmont Ludum Paracelſi vocat, *Worm.* Wlaxen Klein. Lapis eſt Succini citrini colore, magis tamen opacus, variæ magnitudinis, venarum inſtar lapidem obſcurè cinereum tranſcurrens. In maritimis ſaxoſis ſæpius invenitur. *Vires.* A *Paracelſo* pro Lithontriptico commendatur. D. *Grew* diureticum probum eſſe exiſtimat, & ad arenulas expellendas uſui eſſe poſſe.

XIX. *De Silice.*

A. Silex, *Offic. Boet. Mer. Pin. Worm. Charlt. ex.* The Flint. Ubique reperitur. *Vires.* Silicum communium uſus eſſe poteſt, ad tartaream mucilaginem incidendam, calculum reſolvendum, ac proinde ad obſtructiones reſerandas. Extrinſecus frequenti uſu in dentifriciis adhibentur. *Schrod.*

XX. *De Lithocolla.*

LIthocolla, *Offic.* Eſt glutinum, inquit *Dioſcorides*, quo lapides conjunguntur: conflatur autem ex Marmore, Lapide Pario, & taurino glutine. *Vires.* Poteſt candente Specillo admotum, incommodos oculis pilos replicare, *Dioſc.*

XXI. *De Molari.*

A Lapis molaris, *Offic.* The Mill-ſtone. In Agro Derbienſi effodiuntur. Hanc in Catalogo ſimplicium officinalium ad calcem Pharmacopœiæ D. *Shipton* inſertum invenio, ob quam rationem neſcio, cùm uſus ejus in *Anglia*, quantum novi, ſolus eſt ad frumentum comminuendum.

XXII. *De Cote.*

ACos, *Offic. Worm. Charlt. ex.* Cotes, *Boet.* Novaculæ, *Mer. Pin.* The Whet-ſtone. Lapis durior eſt, ferramentis acuendis aptus: Eſtque vel Olearius, colore flavicante, the Hone, vel aquaticus, iſque vel albicante colore The Grind-ſtone, vel nigricante the Whet-ſtone dictus. *Vires.* Ramatum attritum Alopecias pilis explere, mammas prohibere ne intumeſcant, lienem extenuare cum aceto potum, & comitialibus prodeſſe, *Dioſc.*

XXII.

XXII. *De Marmore.*

A. Marmor album, *Offic. Worm.* Parium, *Boet. Charlt. ex.* White Marble. Ab Alablaſtro vulgari tantùm duritie diſtat, & ſplendore cùm politus eſt. *Vires.* Internè ſumpta calculum reſolvit, *Galen.*

Pag. eadem lin. poſt lin. 13. pro 25. cap. adde,

XXV. *De Porphyrite.*

PORphyrites, *Offic. Worm. Charlt. ex. Boet.* Porphyrie or Red Marble. Marmor eſt duriſſimum rubrum. *Vires.* Lithontripticen eſſe creditur, & cum Ophite viribus convenire. Ex Ægypto, confiniis maris rubri, & Æthiopiæ. Integras columnas è Porphyrite vidimus Romæ, & variis Italiæ locis, *T. Robinſon*, M. D.

II. *De Lapidibus Medicamentoſis formatis.*

I. *De Ætite.*

Pag. 90. poſt lin. 21. pro 2 ſpe. adde,

2. AGeodes, *Offic. Boet. De Laet. Worm.* Ætitis tertius. The Baſtard Eagle-Stone: Variis in locis ſabuloſis & glareoſis reperitur in *Anglia.* Lapis eſt rotundus aut oblongus, colore rubiginis & pugni ſæpe magnitudine, terram, aut lutum, aut arenam continens. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

De Lapide Lyncis.

Pag. 91. lin. ult. adde,

2. Ceraunia ſive Fulminaris lapis, *Offic.* Ceraunias, *Boet. De Laet.* Thunder-Stones. Cunei pyramidalis plerumque figura, colore aut nigro, aut fuſco. In Germania reperitur. *Vires.* Mulierculæ in defluxionibus in genas, mamillas, &c. affricant: In Hydrope & Ictero etiam proficuus dicitur, *Witz. in Schrod.*

IV. *De Aſtroitide.*

Aſtroites ſeu Stellaris lapis, *Offic. primum Boet.* quartus *Plot. Hiſt. Nat. Ox.* p. 88. *Tab.* 2. *Fig.* 7. *Lithog. Brit. N.* 163. *Charlt. ex.* Stellaris lapis *De Laet.* Star-Stone. Lapis eſt poroſus moderatè durus, colore albido, ad capitis humani magnitudinem quandoque excreſcens. In fodinis tam Angliæ quàm Germaniæ reperitur. *Vires.* Antiloimicus putatur, & vermes necare exhibitus infantibus ad gr. 4. *Witz. in Schrod.*

III. *De Lapidibus pretioſis opacis.*

Pag. 92. lin. 1. adde,

I. *De Achate.*

ACHates, *Offic. Worm. Mer. Pin. Boet. Charlt. ex. De Laet.* The Agate. Lapis eſt variorum colorum: ab Onyche differt, quod hæc zonis & cruſtis variorum colorum; Achates verò lineis & maculis ludat. A Jaſpide duritie & lævore. *Vires.* Venenis peſtiferis, ut & Viperarum & Scorpionum ictibus reſiſtere creditur; cor recreat, ſitim febricitantium ore contenta ſedat.

Pag. eadem pro 3. & 4. Species adde,

III. *De Sardonyche.*

SArdonyx, *Offic. Boet. Charlt. ex. De Laet.* The Sardonyx. Ex Sardio & Onyche à natura ſimul compoſita eſt. Qui plura de Sardonyche velit, conſulat *Jo. de Laet.*

IV. *De Chalcedonio.*

CHalcedonius, *Offic. De Laet. Boet.* aliàs Carchedonias, *Charlt. ex.* ſeu Carcedonius, *Worm.* The Chalcedony. Gemma eſt quaſi per nubem, vel nullo, vel levi aliquo colore tincta, ſemiperſpicua,

cua, Sculpturæ propter duritiam contumax. *Vires.* Contra omnia atræ-bilis ſymptomata commendatur.

Boetius hanc differentiam inter *Onychen*, *Sardonychen* & *Chalcedoniam* ponit. Quod *Sardonyx* ſit, dum *Onychi Sardius* rubicundus color diſtinctè adjunctus eſt. *Chalcedonius* dum abeſt rubicundus, & niger color diſtinctus. *Onyx* verò propriè, dum adeſt niger, & abeſt rubicundus.

Pag. eadem lin. ult. pro 6. adde,

VI. *De Memphite.*

LApis Memphites, *Offic.* Memphis-Stone. Invenitur calculorum magnitudine, pinguis, verſicolor. In Ægypto juxta Memphim reperitur. *Vires.* Trito & illito, quæ urenda aut ſecanda ſunt, ſine periculo obſtupeſcere, ita ut non ſentiant ciu iatum, *Dioſc.*

Hic Lapis quis fuerit à *Dioſcoridis* temporibus in tenebris delituit, *Boetius* in capite de Onyche hæc habet; *Dum zona alba imagine ſcalpitur, ac nigra zona loco ſtrati ſubſternitur, à nonnullis* Memphitis, *hodie* Camehnia *vocatur à Gemmariis, quaſi alia gemma eſſet*, & pag. 565. à Ludovico Dulci hæc citat: Memphites à Memphi *civitate dicta eſt. Bibita aut cum aceto macerata, ſtuporem inducit membris, ut abſque dolore amputari poſſint.*

Pag.

Pag. 95. lin. 5. pro 8. & 9. & 10. cap. adde,

VIII. *De Malachite.*

MAlachites, *Offic. Charlt. ex.* ſeu Molochites *Boet.* Molochites, *De Laet.* The Malachite. Ad Jaſpidis, vel Praſii ſpecies referri poteſt. Opaca eſt, Malvæ inſtar viridis. Invenitur in Cypro, Miſnia & comitatu Tirolenſi. *Vires.* Pro extinguendo æſtu febrili exhibetur, *Witz. in Schrod.*

IX. *De Turchoide.*

TUrchois, *Offic. Worm. Charlt. ex. Boet. De Laet.* The Turquois. Gemma eſt opaca, ex viridi, albo & cœruleo quaſi compoſita, viride æris exactè referens: quidem Jaſpidis ſpeciem eſſe putant. *Vires.* Ad caſum mirabiles ejus vires experti ſunt. Imprimis memorandum exemplum quod *Boetius* de ſeipſo refert, p. 266.

X. *De Praſio.*

PRaſius, *Offic. Charlt. ex. Boet.* Praſus ſive Praſius, *De Laet.* The Green Stone. Maxima ex parte viridis eſt, ſed rarò ſine punctis atris & aliquando albis diſtinctus. *Vires.* Smaragdi vires habet, verùm minores, *Boet.*

IV. *De*

IV. *De Lapidibus pretioſis diaphanis ſeu, De Gemmis.*

Pag. 99. lin. ult. ſubjunge,

X. *De Adamante.*

ADamas, *Offic. Worm. Charlt. ex. De Laet. Boet.* The Diamond. Gemma eſt duriſſima & precioſiſſima, ſine colore, aquæ inſtar diaphana. Ex India Orientali tranſportatur. *Vires*, Pro viribus conſule præfationem noſtram de Gemmis.

PHARMACOLOGIÆ,

SEU

Manuductionis ad Materiam medicam

LIBER SECUNDUS.

De Phytologia

CLASSIS PRIMA:

SEU

LITHOPHYTOLOGIA

De Plantis ſubſtantiæ Lapideæ.

De Corallio.

PAG. 112. lin. 3. adde, *Vires.* Cum reliquis viribus convenit, *Dioſc.*

Lin. 9. ſubjunge,

Corallium, quod aliqui *Lithodendron* appellarunt, inquit *Dioſcorides*, marinum ſe fruticem conſtat, qui alto extractus, duratus

tur ſtatim atque emergit, tanquam effuſo aer protinus concreſcat ; cujus aut potiùs *Sextii Nigri* opinionem etiam *Plinius* ſectatus eſt ; & an eum *Ovidius* in Libro Metamorphoſeon,

Quo primùm contigit auras
Tempore, dureſcit : mollis fuit herba ſub undis.

Experientia hoc falſi convincit. Teſtantur enim viri fide digniſſimi, inquit Eruditiſſimus D. *Rai* qui ejus piſcationi (ut loquuntur) interfuerun non minùs ſub undis, quàm ſupra undas durum lapideum eſſe, cortice duntaxat molli & muſco (qui tamen facilè deraditur) integi.

Machina quâ ad Coralium extrahendum u tuntur indigenæ, ad Promont. *Cau de Creux* i *Catalonia*, eſt Crux lignea grandis cujus centr ut in aquis promptè ſubſidat, affigitur globu plumbeus magni ponderis : Huic autem adnecti tur funis validus, prælongus. Unicuique cru ſeu extremo crucis rete orbiculare appenditur Demiſſa in aquas cruce, cum Urinatores in im mari rupem invenerunt cavernoſam, Coralii fe tam, is cui funis regendi cura demandatur, i ejus cava unum vel alterum Machinæ crus im pellit, adeòque Coralium (ſi quod inibi oritur retibus implicitum abrumpunt & extrahunt q ſupernè in lembis præſtolantur. *R. H.* p. 6 quibus plura de Coralio adeat lector. Item i Epiſtolis *Boccone, Fer. Imperatum* in Hiſtoria, *Ganſium*, &c.

CLA

CLASSIS SECUNDA,

SEU

BOTANOLOGIÆ,

SECTIO PRIMA.

De Plantis imperfectis,

Pag. 114. aut lin. 1. adde,

I. *De Alga graminea.*

NOTÆ *ſunt: planta ſubmarina conſiſtentiæ herbaceæ foliis gramineis in foliorum ſinu ſemina continentes,* R. Meth. Auct. p. 4.

A. Alga, *Offic. Ger. Chab.* anguſtifolia vitrariorum *C. B. J. B.* Fucus ſecundus, *Dioſc.* marinus ſive Alga marina graminea, *Park.* Graſs-Wrack. In litoribus marinis ubique repetitur. *Uſu.* Herba. *Vires.* Vim habet refrigeratoriam, non podagræ modò, ſed etiam inflammationibus utilem, *Dioſc.*

II. *De Fuco.*

Plantæ ſunt ſubmarinæ conſiſtentiæ mollioris, fo liculacei, plerumque dichotomi, ſeminiferi du plicis generis folliculos habens, alios ventoſos & ae duntaxat plenos, alios ſeminibus fœtos, Raii Met Auct. p. 4.

1. A. Quercus marina, *Offic. Ger. Park.* Fuc maritimus vel Quercus maritima veſiculas ha bens *C. B.* ſive Alga marina latifolia vulgatiſſim *R. H.* p. 70. *Synop. Plant. ejuſd.* Common Sea Wrack. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribu convenit.

Deſcriptio quam Quercus ſuæ marinæ *Theo phraſtus* tradit, adeò brevis eſt & imperfecta, u Botanicis inter ſe altercandi occaſionem præbu erit. *Cluſius* & *Cæſalpinus* Corallinæ frutico ſpeciem quandam eſſe volunt, quibuſcum con ſentire non poſſum, ſed huc potiùs referenda cenſeo, quòd *Theophraſtus* Quercum ſuam mar nam folium oblongum, craſſum & carnoſum ha bere prodiderit.

2. Fucus, *Offic.* tertius, *Dioſc.* Alga tinctori *J. B.* tinctoria ſive Fucus marinus Rocella tin ctorum dictus *C. B.* Fucus marinus Rocella tin ctorum *C. B.* Alga cornu cervi diviſura, *Ejuſ* An Fucus ſive Alga membranacea purpurea par va *R. Synop* ? Purple Sea-Wrack. In mari Me diterraneo reperitur. *Uſu.* Herba. *Vires.* Ad verſus Serpentes dedit Nicander. Hoc Fuco qui dam putant mulieres ſuum colorem mentiri, cum tamen ſit radicula ejuſdem nominis, qua ſeſe fu cant, *Dioſc.*

3. Vir

3. Vitis marina & Lenticula marina, *Offic.* nticula marina ſerratis foliis, *Ger. Park.* Fucus lliculaceus ſerrato folio, *C. B.* folliculaceus ma-imus bacciferus, *Ejuſd.* Sargaſo, *Piſ.* Sea-ntils. In rupibus maritimis. *Uſu.* Herba. *ires.* Contra difficultates urinandi utuntur Luſi-ni & Batavi, *Piſon.*

III. *De Muſco Marino.*

A Lichen marinus, *Offic. Ger.* marinus platy-phyllos, *P. Al.* Fucus marinus, Lactuca arina dictus, *Park.* Primus, *Dioſc.* Lactucæ fo-o, *El. Bot. T. Inſt.* Muſcus marinus Lactucæ lio, *C. B.* Lactuca marina, *Chab.* marina ſive ntybacea, *J. B.* Oyſter-green. Petris, Scopulis, ſiſque teſtis adnaſcitur. *Uſu.* Herba. *Vires.* um Alga viribus convenit.

2. Muſcus marinus, *Offic.* marinus capillaceus ioſcoridis, *Park.* marinus capillaceus Dioſcori-is Donati, *R. H.* p. 79. Marinus verus Dioſco-dis, *Donat.* p. 61. Fucus capillaceo folio, *Theoph.* Sea-Moſs. In mari Adriatico invenitur, in ſco-ulis teſtaceiſque. Planta eſt gracilis, capillacea, ulis, expers. *Uſu.* Tota planta. *Vires.* Præ-ipua ei ſpiſſandi vis, & collectiones cohibendi, & odagras; quas refrigerare opus ſit. *Dioſc.*

Hæc planta *Conſtantino* pro Muſco marino *Dioſcoridis* accipitur, cum quo potiùs conſentio uàm cum iis qui pro Muſco illo *Coralinam* fficir. habent. *Parkinſonus* noſter pro Fuco apillaceo folio *Theophraſti* habet.

Pag. eadem, lin. 14. ſubjunge,

V. *De Alyconio.*

Quænam ſint corpora illa Alcyonia *Græcis dicta, & unde originem habeant, inter Botanicos controvertitur, & adhuc dubium manet.* Plinius *nidos quarundam avium in mari extructos esse tradit.* Imperatus *minuta paleæ & pilorum fruſtula in maſſas agitatione maris conglobata.* Schrochius *arundinum cum foliis ſuis progeniem eſſe, quod in pluribus quæ diſſecuit & aperuit, plantam ipſa obvolutam in medio invenerit, affirmat.* Dioſcorides 5 *ſpecies enumerat. Harum quatuor in hoc capite exhibemus; quintam* lib. 3. in *capite* Oſtreorum *vel* Mytilorum; *quorum ſcilicet progenies eſt. Eorum autem utrumvis ſecundum* Dioſcoridis *cenſeri poteſt, notis ſcilicet nullis in textu propoſitis reclamantibus.*

1. *Alcyonium* durum, *Offic.* durum ſive primum Dioſcoridis Imperato *C. B.* Spongioſum Officnarum, *J. B. Chab.* Hard-Baſtard-Spunge. *Uſu.* Tota planta. In fœminarum ſmegmata aſſumuntur contra lentigines, lichenes, lepras, vitiligines, nigritias & maculas in facie, reliquoque corpore, *Dioſc.*

2. *Alcyonium* vermiculatum, *Offic.* vermiculatum Imperati *C. B.* vermiculatum purpureum candidum & flaveſcens *T. Inſt.* Vermiculate Baſtard Spunge. *Uſu.* Planta integra. *Vires.* Iis qui difficili urina vexantur, aut arenulas in veſica colligunt idoneum eſt: item renibus affectis, aquæ inter cutem, lieni, *Dioſc.*

3. *Alcyonium*

, *Alcyonium* ſtuppoſum, *Offic.* Stuppoſum im-ati *J. B.* Stuppoſum dictum, *Chab.* Stuppoſum quartum *Dioſcoridis* Imperato, *C. B.* Threadp ſtard-Spunge. *Uſu.* Planta. *Vires.* Ejuſdem n præcedenti vires obtinet verum haud parum ecilliores, *Galen.*

. *Alcyonium* tubuloſum, *Offic.* *J. B.* forma ctus alicujus ficus, *C. B.* Tubuloſe Baſtard unge. *Uſu.* Integra planta. *Vires.* Dealbandis tibus aptum eſt: in alia Smegmata, Pſilothra- aſſumitur cum ſale miſtum, *Dioſc.*

VI. *De Fungo.*

Lin. 21.

1. Fungus, *Offic.* eſculentus 12 *Park.* pileolo lato & rotundo livido, *C. B.* campeſtris us ſuperne, infernè rubens *J. B.* *Chab.* The hrome or Champignon. In paſcuis ſterilioribus utumno. *Uſu.* Integra planta in culinis Aceto dita, in Officinis autem rarò aut nunquam rpatur.

. 2. Crepitus Lupi, *Offic.* Lupi ſive Fungus tus, *Park.* Fungus rotundus orbicularis, *C. B.* icularis, *Ger.* Pulverulentus dictus Crepitus pi, *J. B.* *Chab.* Lycoperdon vulgare, *El. Bot.* *Inſt.* Puff-Balls, Bull-fiſts, Mold-puffs. In cuis ubique ferè in Autumno invenitur. *Uſu.* egræ plantæ. *Vires.* Siccat & aſtringit, unde neribus inſperſus ſanguinem ſiſtit, ulcera inve-ta deſiccat, hæmorrhoidum fluxum cohibet: ulis tamen inimicus cenſetur, *R. H.* p. 105.

A. 2. Lycoperdon maximum, *Offic.* Alpinum maximum, *El. Bot.* Alpinum maximum, cortice lacero, *T. Inſt.* Fungus maximus rotundus pulverulentus dictus, Germanis Puff-ball, *J.* Fungi rotundi orbicularis ſecundum genus *C.* Great-Duſty-Mushrome. In pinguioribus paſcuis & ad fimeta. *Uſu.* Planta integra. Caput humanum magnitudine interdum æquat. *Vires.* compeſcendas ſanguinis eruptiones etiam pericloſiſſimas commendatur: in quem uſum Tonſores eos adſervare multis Germaniæ in locis obſervavit *Cluſius.*

Pag. 115. lin. 27. ſubjunge,

A. 6. Tubera, *Offic. C. B. J. B.* Matthioli, *Bot.* terræ *Ger.* terræ edibilia, *Park.* Truffles, Trubs. E terra effodiuntur. *Uſu.* Integ. Planta magnitudine varia, tuberculis extantibus inæqualis, externâ facie rugosâ, nigrâ, interne ſubſtantia alba, guſtu fatuo, odore nonnihil grav. *Vires.* Venerem ſtimulant, cocta & pro Empaſtro impoſita Anginoſis proſunt. Vaſcula ſeminalia in Tuberibus Terræ obſervavit D. *Tancredus Robinſon, M. D.* viginti abhinc annis. V. *Tranſact. Phil.* in juſculis & acetariis frequens eorum uſus.

7. Boletus, *Offic.* Tubera cervina, *C. B. Par.* Tuberum genus quibuſdam Cervi Boletus, *J.* Cervi Boletus, *Chab.* Deers-Balls. E terra effodiuntur. *Uſu.* Integra planta magnitudine Jugulandis, inæqualis, externè cineraceo colore, internè ex albo purpuraſcente, guſtu grato. *Vires.* Rari uſûs eſt, nec adhibetur niſi quod nonnulli ad libidinis ſtimulum, lactiſque incrementum eum commendent. Extrinſecus commendatur a

Uteri-

terinas aſcenſiones compeſcendas & partus difficultatem, *Schrod.*

In Italia Tubera terræ quærendi & colligendi odo ridiculo utuntur. Porcellum ſcilicet in ſcua ubi eorum proventus eſt agunt, qui odore venta roſtro eruit; eumque inſequitur quidam, i eruta colligit.

VII. *De Muſco.*

Pag. 117. lin. 5.

A. Muſcus pyxidatus, *Offic. Ger. Park. J. B.* pyxidatus major & minor, *T. Inſt.* pyxoides B. Muſco-Fungus pyxidatus vulgatior minor *Ox.* Cup-Moſs. In aridioribus. *Uſu.* Integra rba. *Vires.* In Tuſſi convulſivo puerorum ſpeci- æſtimatur.

A. 4. Lichen cinereus terreſtris, *Offic. R. Synop.* *Plant.* & *Hiſtor.* Muſco-fungus terreſtris ifolius cinereus Hepaticæ facie, *H. Ox.* Muſcus reſtris Hepaticæ facie *vulgò* Ground-Liverwort. paſcuis ſiccioribus non infrequens reperitur. *u.* Tota planta. *Vires.* Adverſus morſum nis rabidi egregium eſt medicamentum.

SEC-

SECTIO SECUNDA.

Herbæ ſemine minutiſſimo & nudi oculis vix conſpicuo.

II. *De Muſco trichoide.*

Pag. 120. lin. 14.

A. Muſcus clavatus, *Offic.* clavatus ſi Lycopodium, *Ger. Park.* ſquamoſ vulgaris repens, clavatus, *T. In* terreſtris repens ſive clavatus, *C.* terreſtris repens à Trago pict *J. B.* terreſtris repens Tragi, *Chab.* Club-mo In ericetis & montoſis. Julio & Auguſto flore *Uſu.* Planta integra, Flos ſive Pulvis clavaru citrinus. *Vires.* Refrigerat & ſiccat. Uſ præcipui in Calculo expellendo, in fluxu alv Extrinſecus in laxitate dentium, in conſolidatio & ſiccatione vulnerum, *Schrod.* In Epilepſia pue rorum flos multum valet, inque Cardialgia e rundem & torminibus ventris flatulentis, *R. Syn*

VI, D

VI. *De Equiſeto.*

Pag. 123.

A Cauda Equina minor & Equiſetum minus, *Offic.* Equiſetum ſegetale, *Ger.* arvenſe ngioribus ſetis, *C. B.* minus terreſtre, *J. B.* mi-s terreſtre ſive arvenſe, *Chab.* Corn-Horſe-tail. ter ſegetes ſolo humidiore. *Uſu.* Herba. *Vires.* um priore viribus convenit.

A. 3. Polygonum fœmina, *Offic.* Equiſeti facie olygonum fœmina, *J. B. Chab.* Cauda Equina emina, *Ger.* Equiſetum paluſtre brevioribus fo-s polyſpermon, *C. B.* paluſtre alterum breviori-us ſetis, *Park.* Female Horſe-tail. In ſtagnis & cubus, & ad fluviorum ripas. *Uſu.* Herba. *ires.* Vulneraria eſt planta.

Herbæ ſemine minutiſſimo, caule carentes, Epiphylloſpermæ.

Pag. 124. lin. 7.

II. *De Hemionitide.*

Foliis integris eſt & indiviſis, ſinu in baſi uni-uſcujuſque ad pediculum falcato, cum appendi-utrinque producta, R. Meth. p. 63.

Hemionitis, *Offic. J. B.* vulgaris, *C. B.* ma-r, *Ger. Park.* Hemionium ſive Hemionitis qui-uſdam Splenium, *Chab.* Mules-Fern. In

Italia provenire dicitur. *Vſu.* Herba. *Vires* Ex Aceto pota Lienem abſumit, *Dioſc.*

Pag. eadem lin. ult.

IV. *De Lonchitide.*

ANguſtia & longitudine foliorum, ut & loc natali à Polypodio differt. R. Synop. p. 45.

A. Lonchitis, *Offic.* aſpera, *Ger.* aſpera minor *C. B. Park.* altera foliis Polypodii, *J. B.* altera foliis Polypodii, Aſplenium ſylveſtre nonnullis *Chab.* Filix ſive Lonchitis altera foliis Polypodii *P. Al.* Polypodium anguſtifolium folio vario, *Inſt.* Rough Spleenwort. In humidioribus nemoroſis aſperis & ericetis. *Vſu.* Folia. *Vires.* Herbam eſſe vulneribus glutinandis, in eiſque inflammationem excitari non patitur. Pota ex aceto Lienem abſumit, *Dioſc.*

Lonchitis *Dioſcoridi* duplex eſt, altera folio Porri, quam ſolum *Plinius* novit, cujus ſemen triangulum & lanceæ cuſpidi ſimile, unde etiam planta ipſa ſibi cognomentum arrogavit, nec unquam reperiſſe, nec ab aliis inventum vidiſſe ſcribit *Matthiolus.*

Pag. 126. lin. ult. ſubjunge,

Laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu & illitu cum axungia vulneribus ſagittarum arundinacea factis eſt auxilio, *Dioſc.*

VII

VIII. *De Dryopteride.*

Pinnis denſiùs diſpoſitis, anguſtioribus, pediculis brevibus aut nullis inſidentibus, filici mari ſimilis, R. Meth. p. 64.

A. Dryopteris, *Offic.* Adverſariorum, *Ger. emac.* ſive Filix Querna repens, *Park.* Filix Querna, *C. B.* minor non ramoſa, *J. B. Chab.* minor paluſtris, *R. Cat.* & *Hiſt. ejuſd.* Oak-fern. In locis paluſtribus & putridis. *Uſu.* Integra planta. *Vires.* Pſilothrum eſt cum Radicibus trita: illinitur enim primum poſtquam corpus exudavit, mox ſudor abluitur, & recens imponitur, *Dioſc.* Facultatem habet ſepticam.

Hujus uſum *Rondeletius* pernicioſum eſſe compertum affirmat, cùm ab ignaris quibuſdam Delphinatûs Pharmacopœis vice Polypodii medicamentis immitteretur. In Pharmacopolarum quorundam officinis aliquando inveni ſub titulo *Adianthi albi.*

Pag. 129. lin. ult.

XIII. *De Agno Scythico.*

AGnus Scythicus, *Offic.* Scythicus Borometz, *J. B. Chab. append.* Tartaricus, *Act. Philoſ. Lond. N.* 247. *p.* 461. Frutex Tartaricus, *C. B.* Planta-Animal ſeu Borometz, Agnus Scythicus, *Park.* The Scythian or Tartarian Lamb. Ex China & Tartaria allata eſt. *Uſu.* Lanugo *Poco Sempie*, *Offic.* Golden Moſs, *Muſ. Reg. Soc.*

p. 386. Colore eſt luteſcente obſcuro unam circiter quartam unciæ longa, ſerici inſtar ſplendens, *Vires.* Adverſus Hæmoptyſin uſurpatur. Doſ. Sex grana. Tres autem doſes curationem perficere traduntur. *D. Brown* apud Chinenſes in frequenti uſu eſſe refert ad ſanguinem è vulneribus recentibus fluentem ſiſtendum, quemadmodum apud nos Aranearum telæ.

Non opus eſt ut hîc repetam mirabilem & fabuloſam hiſtoriam hujus plantæ quæ à *Dureto*, *Scaligero*, aliiſque eorum ſequacibus traditur. Sufficiat dixiſſe, quòd in arcula rariorum *Chinenſium* ad Regiam Societatem *Londin.* miſſa inerat, quòd plus pedem longa erat, carpum humanum craſſa, protuberantiis variis inæqualis, & prope extremum pediculos quoſdam emittens 3 aut 4 uncias longos Filicino cauli exactè ſimiles, lanugine prædicta obtectos. Similitudo quam obtinet cum Filicibus quibuſdam arboreis Jamaicenſibus fecit, ut hic tantiſper eam collocem, donec pleniorem ejus cognitionem & hiſtoriam conſequar. V. *Philoſ. Tranſact.* n. 247. p. 461.

SECTIO

SECTIO TERTIA.

De Herbis flore imperfecto ſeu ſtamineo.

Pag. 135. lin. 11. adde,

V. *De Mercuriale.*

Cujus Notæ, Folia in caule bina oppoſita, per margines crenata, Florum calices triphylli, Fructus in fœmina didymi, i. e. bini conjuncti, ſinguli ſingula ſemina continentes. Calices triphylli etiam in fœmina fructui ſubſunt, R. Meth. p. 20.

A. 1. Mercurialis, *Offic. Schrod.* mas & fœmina, *Ger. Park. J. B. Chab.* annua, *H. Ox.* annua glabra vulgaris, *R. Synop:* teſticulata ſive mas Dioſcoridis & Plinii, *C. B.* ſpicata ſive fœmina Dioſcoridis & Plinii, *Ejuſd.* **French Mercury.** In hortis & incultis reperitur. Æſtate floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Calfacit & ſiccat, abſtergit, alvum movet, bilem ac aquas purgat. Extrinſecus vulvæ adhibita Menſes & ſecundinas trahit, humores emollit, creberrimi uſûs eſt in clyſteribus, *Schrod.*

A. 2. Cynocrambe, *Offic.* mas & fœmina, *Ger. emac.* mas & fœmina ſive Mercurialis repens, *J. B. Chab.* Mercurialis perennis repens Cynocrambe dicta, *R. Synop.* ſylveſtris Cynocrambe dicta mas & fœmina, *Park.* montana teſticulata & ſpicata, *C. B.* **Dogs Mercury.** In ſylvis & ſepibus. Vere floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Hæc quamvis *Prævotio* eaſ-

dem cum præcedente vires obtinere dicatur; effectus tamen quos in nonnullis prope *Salopiam* eam comedentibus produxit, eam Soporiferæ & malignæ qualitatis participem esse convincunt.

Quænam planta sit *Cynia* seu *Cynocrambe Dioscoridi* dicta *Botanici certant, & adhuc sub judice lis est. Cæsalpinus* Atriplicis speciem esse vult. *C. Bauhinus* Parietariæ. *Lonicerus* ad Apocynum eam refert. *Matthiolus* ad plantas quas hîc exhibeo, quæ quidem cum *Dioscoridis* descriptione aliqualiter conveniunt, præsertim fœmina.

3. Phyllon, *Offic.* Arrhenogonon & Thelygonon, *Chab.* Arrhenogonon & Thelygonon folio incano Monspessulanum, *J. B.* Arrhenogonon sive marificum & Thelygonon sive fœminificum, *Ger.* marificum & fœminificum, *Park.* testiculatum & spicatum, *C. B.* Mercurialis perennis maritima incana Phyllon dicta testiculata & spicata, *H. Ox.* fruticosa, incana testiculata & spicata, *El. Bot. Inst.* Childrens Mercury. In hortis curiosorum apud nos reperitur. Æstate floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Mauritanis ad muliebres morbos magno in usu est, *Clus.* Illius decoctum demorsis à cane rabido commendant aliqui, *Magnol.*

VI. *De Ambrosia.*

Fructu echinato monospermo, à flore remoto, foliis laciniatis à reliquis differt.

Ambrosia, *Offic. Ger. Chab.* hortensis, *Park.* hortensis lanuginosa, *H. Ox.* maritima, *C. B.* quibusdam *J. B.* foliis Absinthii odoratis humilior, *Herm. Cat.* Oak of Cappadocia. Apud nos in hortis colitur.

Usu.

Usu. Herba. *Vires.* Repellendi & reprimendi facultatem obtinet, *H. Ox.* Vim habet astringentem, inquit *Galenus.*

Ambrosia à *Dioscoride* in hunc modum describitur, *Pusillus frutex est, ramosus trium palmarum altitudine : foliis Rutæ, circa imum caulem exiguis : cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis, gravidi, qui nunquam florem pariunt, odore vinoso suavi : radice tenui sesquipedali.* Cujus descriptionis brevitas non levis controversiæ & dissensionis inter Autores occasio fuit. *Nicander* referente *Anguillara* pro Lilii specie eam habet, *Cordus* ad Tanacetum refert, *Lonicerus, Lacuna* aliique ad Abrotonum : *Tabernæmontanus* ad Artemisiam, *Matthiolus* ad Nasturtii genus, *C. Bauhinus* & sequaces ad plantam hìc traditam, quibus & nos potiùs consentimus. *N. B. Catalogum* Pharmacopœiæ Londinensi *præfixam* Ambrosiam *à* Botrye *non distinguit, sed utramque unius plantæ synonymam facit.*

Pag. 136. lin. antepenult. verbo *est* adde,

Ad necandos vermes in corpore humano insigne est remedium, *Harlow in Med. curios. sub titulo* Mexico-seeds.

Pag. 137. lin. ult. adde,

In ſuperiore meo libro pro *Grana Tiglia* Ricini vulgaris ſemina deſcripſi, in quem errorem indi lapſus ſum, quod in Officinis Pharmacopolarum noſtratium titulo Granadillorum Peruvianorum ea divendita fuiſſe obſervaveram, cùm ea ita de ſcripſiſſe debuiſſem, fructus eſt oblongus, ovali glaber, Ricino vulgari minor & anguſtior, un parte gibbus, altera depreſſus, colore fuſco, ſapori acris, exurentis & nauſeoſi.

X. *De Lapatho.*

Pag. 139. lin. 15.

AN Rhaponticum Antiquorum & Rhabarba rum modernorum ſit una & eadem ſpeci planta à Botanicis controvertitur (ut rectè obſerva clariſſimus & eruditiſſimus *D. Raius*) aliis eandem eſſe affirmantibus, aliis negantibus: Nonnulli e tiam ſibi non conſtant, & nunc eandem nunc di verſam affirmant, quorum ſententias & ratione vide apud *J. Bauhinum in Appendice* Tom. 2 *Hiſt. Plant.* Id tamen hoc in loco cum *Alpin* obſervabo, Plantam hanc verum eſſe *Dioſcorid* Rhaponticum à Rhabarbaro Officinarum omnin diſtinctum, ut ſuo in loco oſtendam, eamque ra dicem quæ in Pharmacopœorum & Pharmacopo larum Officinis pro Rhapontico divenditur hujus plantæ radicem non eſſe, ſed Centaurii majoris cujuſdam ſpecies, ut eodem in loco demonſtravi.

Pag

Pag. 140. lin. 13. ſubjunge,

Hanc plantam veram & genuinam *Dioſcoridis* Britannicam eſſe contendit *Muntingius*, ſiquidem deſcriptionibus ejus, inquit doctiſſimus *D. Raius*, quæ apud veteres extant tum facie tum viribus per omnia reſpondeat.

Pag. eadem lin. 22. adde,

A. 6. Lapathum ſanguineum, *Offic. Park.* ſativum ſanguineum, *Ger.* ſanguineum ſive ſanguis Draconis herba, *J. B. Chab.* folio acuto rubente, *C. B.* Blood-wort. In hortis colitur. Junio floret. *Uſu.* Folia, Semen. *Vires.* Folia alvum cient in juſculo. *Semen* pulverizatum & in aliquo decocto aſtringente potum ſingularem habet efficaciam in ſiſtendis nimiis menſibus & ſimilibus fluxibus, *Cam.*

At perperam eos omninò facere, qui ſuccum hujus Lapathi Sanguinem Draconis Officinarum vel nuncupant vel ſuſpicentur, *Chab.*

Pag. 141. lin. 9. verbo *Foliorum* ſubjunge,

Vires. Palato gratior eſt quàm vulgaris, belleque omnia præſtat quæ illa, *Chab.*

Pag. eadem lin. 15. ſubjunge,

XIII. *De Fegopyro.*

NOtæ ſunt floſculi pentaphylli ſpecioſi, in ſpicis è foliorum alis egreſſis, Semine triquetro cum congeneribus convenit, ejus tamen colore ſordidiore & farinâ eſculentâ ab iiſdem differt, R. Synop. p. 58.

A. Fegopyrum, *Offic.* vulgare erectum, *El. Bot. T. Inſt.* Dodonæi, *H. Ox. R. Synop. Volck.* Fagotriticum, *J. B. Chab.* Tragopyrum, *Ger. emac. Park.* Frumentum Saracenicum Matthioli vulgò Fagopyrum, *Herm. Cat.* Eryſimum cereale, ſeu Theophraſti folio hederaceo, *C. B.* Buck-Wheat or Beanh. Seritur in agris, Julio floret. *Uſu.* Semen triangulum colore ſordidum. *Vires.* Minus nutrit quam Hordeum aut Secale,

Pag. eadem lin. ult. adde,

Vires. Inter diuretica potentiſſima eſt. *Nob. Boyleus* Aqua diſtillata in calculo laudat. Ad ulcera ſordida mundificanda maximè commendat *Theophr.*

Pag. 142. lin. pro Capite XVII. adde,

XVII. *De Potamogeitone.*

POtamogeitonis notæ ſunt in aquis naſci; flores ſpicati, quadrifolii, quorum ſingulis quaterna continentur ſemina; florum ſpica pediculis oblongis inſidentes, R. Synop. p. 62.

A.

A. Potamogeiton, *Offic. Chab.* rotundifolium, *C. B.* rotundiore folio, *J. B.* latifolium, *Ger.* Fontalis major latifolia vulgaris, *Park.* Pond-weed. In aquis ſtagnantibus & piſcinis frequens. Junio & Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Refrigerat & inſpiſſat: pruriginibus utile, & contra vetera ulcera & nomas, *Dioſc.*

XVIII. *De Atriplice.*

Pag. 143. pro 2da ſpecie Atriplicis adde,

2. HAlimus, *Offic. Chab.* Cluſii, *J. B.* latifolium, *Ger.* latifolius ſive fruticoſus, *C. B.* latifolius, ſive Portulaca marina incana major, *Park.* Atriplex Halimus dicta latifolia, *R. H.* latifolia, ſeu Halimus fruticoſus latifolius, *H. Ox.* maritima fruticoſa Halimus dicta latifolia, *B. Al.* Tree Sea-Purſlane. In ſepibus mari proximis, regionibus calidioribus, floret æſtate. *Uſu.* Radix. Folia. *Vires.* Radix convulſa, rupta, torminaque mitigat, drachmæ pondere in aqua mulſa pota: eadem lactis ubertatem facit. Folia decoquuntur ciborum gratia, *Dioſc.*

XIX. *De Blito.*

Pag. eadem lin. 20. verbo *humectat* adde,

eſtur oleris modo, alvo utile eſt, *Dioſc.*

2. A. Atriplex ſylveſtris, *Offic. J. B. Chab.* ſylveſtris altera, *C. B. Ger. emac.* ſylveſtris folio ſinuato ſaturate virente ſpica rubra,

H.

H. Ox. Chenopodium folio laciniato coma purpuraſcente, *T. Inſt.* Wild Orache. In ſimetis. Æſtate floret. *Uſu.* Herba, Semina parva, compreſſa, rotunda, nigra, ſplendentia. *Vires.* Alvum mollit. Panas diſcutit ſive crudum ſive coctum illinatur. Semen cum aqua mulſa potum Regium morbum ſanat, *Dioſc.*

A. 3. Atriplex olida, *Offic. Ger.* fœtida, *C. B. J. B. Chab.* olida ſive ſylveſtris fœtida, *Park.* Blitum fœtidum Vulvaria dictum, *R. Synop.* Chenopodium fœtidum, *El. Bot. T. Inſt.* Stinking Orache. In locis ruderatis & in ſimetis. Auguſto floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Uterina eſt, menſes provocat, fœtum mortuum ſecundinamque expellit, in Hyſtericis multùm prodeſt.

A. 4. Pes anſerinus, *Offic.* Atriplex dicta: Pes anſerinus, *J. B. Chab.* ſylveſtris latifolia, *C. B.* ſylveſtris latifolia ſive Pes anſerinus, *Ger. emac. Park.* Blitum Pes anſerinus dictum, *R. Synop.* Chenopodium Pes anſerinus primum Tabernæmontani, *El. Bot. T. Inſt.* Gooſe-foot. In ſimetis. Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Viribus præſtat, quibus & præcedentes.

Pag. 145. lin. 13. addè,

Coquitur cum lenticula ut ventrem ſiſtat: quod magis radice ejus præſtatur, *Dioſc.*

Pag.

Pag. 147. lin. 14. ſubjunge,

XXIV. *De Percepier.*

SITU florum in foliorum alis, calicibus quadripartitis, ſeminibus in ſingulis utriculis ſingulis ab Alchimilla differt, ut omnino genere diſtinctum ſit, R. Meth. A. p. 23.

A. Percepier, *Offic.* Anglorum, *Ger. emac.* Anglorum quibuſdam, *J. B. Chab.* Polygonum Senoides, *Park.* Chærophyllo nonnihil ſimilis, *C. B.* Alchimilla annua minima hirſuta foliis infernè albicantibus, *H. Ox.* Parſly-piert. Inter ſegetes & in ſolo reſtibili ſteriliore. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Vehementer & repentè urinas ciere & calculum comminuere creditur, *R. Synop.*

XXV. *De Camphorata.*

Pag. eadem lin. ult. verbo *Herba* adde,

Vires. Siccat & aſtringit, nervoſum genus roborat, confert in doloribus Arthriticis, Spaſmis, Paralyſi, defluxionibus oculorum, Catarrhis, Cephalica eſt planta.

XXVI.

XXVI. *De Kali.*

Pag. 149. lin. ult. ſubjunge,

AT neque ex hac herba ſola conficitur Soda, ſed nonnullis in locis Fucos aliaſque plantas marinas urunt ad eum uſum. Item ad cineres clavellatos pro Sapone communi efficiendo filicem fœminam urunt una cum ſtramine, in lixivio cinerum ligni prius macerato. *Harvici* inſuper mihi narratum eſt, quod lixivium quo ibi utuntur ad linteamina mundanda è Lupuli viminum exſiccatorum cineribus paratum eſſe.

SECTIO QUARTA,

Herbæ flore aggregato ſeminibus pappoſis.

I. *De Lactuca.*

Pag. 153. lin. ult.

A Lactuca ſylveſtris, *Offic.* ſylveſtris coſta ſpinoſa, *C. B.* ſylveſtris laciniata, *Park.* ſylveſtris foliis diſſectis, *Ger. emac.* ſylveſtris, ſeu Endivia multis dicta folio laciniato, dorſo ſpinoſo, *J. B. Chab.* Jagged-leaved Wild Lettuce. ad ſepes. Junio floret. *Uſu.* Herba, Semen. *Dioſc.* Dolores mitigat, ſemen minuit, libidinem opprimit, & Venerem arcet, *Dioſc.*

3. Chondrilla prima, *Offic. Dioſc.* cœrulea, *Ger.* cœrulea altera Cichorei ſylveſtris folio, *C. B.* cœrulea latifolia laciniata, *ejuſdem* & *Park.* cœrulea ve purpurea, *ejuſd.* Chondrille vel Chondrilla, *Chab.* vel Chondrilla cœrulea, *J. B.* Lactuca ſylveſtris perennis, purpuro-cœruleo, laciniato longo folio, *H. Ox.* perennis humilior flore cœruleo, *R. Bot. T. Inſt.* Cum Succoſp. In Italia & Germania in locis incultis creſcit. Æſtate floret. *Uſu.* Herba.

Hanc plantam Chondrillam primam Dioſcoridis exiſtimo.

II. *De*

II. *De Chondrilla.*

NOTÆ *ſunt, florum capitula ſeu caulicul* *Lactucæ minores habere caulibus ſecundu* *longitudinem preſſius junctos, Folia alterna, lævi* *Lactuca anguſtiora, ſemina oblonga, & anguſta.*

Chondrilla altera, *Offic.* viminea, *J. B. Cha* juncea, *Ger.* juncea viſcoſa arvenſis : quæ prim Dioſcoridis, *C. B.* viminalibus virgis, *Park.* La ctuca ſylveſtris viminea, *Volck.* ſylveſtris pere nis lutea juncea viminalibus virgis, *H. Ox* Gum Succory with yellow Flowers. In areno Germaniæ, Italiæ, &c. Julio floret. *Uſu.* Her ba. *Vires.* Caules & folia concoquendi vim h bent. Succus incommodos palpebrarum pil reflectit, *Dioſc.*

Hanc pro Chondrilla 2da Dioſcoridis *Folia ferens oblongum, circumroſum, humi ſparſum : caule ſucco madentem luteo : radice tenui rotunda lat vegeta flaveſcente, ſuccoſa,* potiùs habendam exiſtim quam Chondrillam bulboſam *C. Bauhini.*

Dioſcorides duo hujus plantæ genera memora De priore hæc habet : *Caulem, flores & folia h bet Cichorio ſimilia : qua ex cauſa nonnulli ſylv ſtris* Intybi *ſpeciem eſſe pronunciarunt, verùm t nuior tota eſt.* Ideoque neque Chondrilla junce viſcoſa arvenſis, *C. B.* neque Chondrilla prior le gitima *Cluſii* eſſe poteſt, cum earum utraque flo res luteos habeat, ſecus quàm Cichoreum, quo cœruleos obtinet.

III. D

III. *De Soncho.*

Pag. 154. lin. 9. verbo *Folia* adde,

Vires. Cum Lactuca viribus convenit.

Pag. eadem lin. 17. ſubjunge,

3. A. Hieracium majus, *Offic.* majus folio Sonchi vel Hieracium Sonchites, *C. B.* Sonchus Hieracites major repens] cauliculo hirſuto inter ſegetes, *H. Ox.* repens multis Hieracium majus, *J. B.* repens multis, quibuſdam Hieracium majus, *Chab.* arboreſcens, *Ger. Park.* aſper arboreſcens paluſtris Hieracii facie, *Herm. Cat.* The greater Hawkweed. In arvis. Julio floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Vim refrigerandi habet & modicè ſubſtringendi, inflammationibus prodeſt. Herba cum radice illita, vibratis à Scorpione ictibus auxiliatur, *Dioſc.*

Pag. eadem lin. ult. adde,

Vires. Vim ſuam ad ea ad quæ ſuperior impendit, *Dioſc.*

V. De

V. *De Pulmonaria Gallica.*

A Reliquis Hieraciis differt ſemine parvo brevi nigro; ab Auricula muris, quod folia pilis longis hirta non ſint, quemadmodum illius, & in pleriſque ſpeciebus laciniata aut dentata, R. Meth. p. 30.

A. 3. Pulmonaria Gallica & Pulmonaria aurea, *Offic.* Gallica Phthiſica ſive aurea latifolia, *Ger. emac. Hoffman. Flc. Alt.* Hieracium murorum folio piloſiſſimo, *C. B.* latifolium hirſutum folio unico cauli inſidente, *H. Ox.* murorum Bauhini, quod eſt Pulmonaria Gallorum Lobelii, *Park.* Piloſella major quibuſdam, aliis Pulmonaria flore luteo, *J. B. Chab.* French or Golden Lungwort. In ſylvis, muris antiquis, & aggeribus umbroſis. Junio & Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum Pulmonaria maculoſa viribus convenit.

Pag. 156. lin. 16. ſubjunge,

IX. *De Tragopogone.*

INſigni notâ à reliquis differt, quod calycis floris radii ipſius folia ſeu petala longitudine excedant: folia herbæ gramineæ imitantur, R. Synop. p. 76.

A. Tragopogon, *Offic. Chab.* luteum, *Ger. Park. parad.* prarenſe luteum majus, *C. B.* flore luteo, *J. B.* Yellow Goats-beard. In pratis & paſcuis, Junio & Julio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Radices valde nutriunt, unde tabidis & macilentis conducunt.

ducunt. Vitiis pectoris, tussi & respirationi difficili, necnon pleurisi mederi dicuntur. Urinæ stillicidio subveniunt, & calculum expellunt, lanationibus æstuantibus ventriculi & thoracis auxiliantur.

Herbæ flore aggregato seminibus pappo destitutis.

Pag. 157. lin. ult. subjunge,

XII. *De Lampsana.*

Floribus caules & ramulos terminantibus cum Hieracio convenit, à Cichorio differt; seminibus solidis seu pappo destitutis cum hoc convenit, ab illo diversum est, R. Synop. p. 77.

A. Lapsana, *Offic. Ger.* sive Lampsana, *Chab.* vulgaris, *Park.* Dodonæi, *J. B. El. Bot.* Soncho affinis Lampsana domestica, *C. B.* Cichorio affinis Lampsana domestica, *Mor. Prælud. Bot.* Intybus sive Endivia erecta lutea Napifolia, Lampsana dicta, *H. Ox.* Nipplewort. In hortis & incultis frequens. Junio & Julio florer. *Usu.* Herba. *Vires.* Efficax esse censetur in sanandis papillis ulceratis, unde & nomen Papillaris sortita esse videtur, *R. H.* Reficcantem ac extergentem, & nonnihil digerentem facultatem obtinet: folia caulisque coquuntur & in cibum recipiuntur, *H. Ox.*

Quæ veteribus fuerit Lampsana non facile est nobis explicare, *Dioscoridi* sylvestre est olus, plus nutriens quam Lapathum, ac cujus caules & folia cocta eduntur. Lampsanæ autem nomine

mine variæ ac diverſæ à ſcriptoribus Botanicis donatæ fuere plantæ.

XIII. *De Seſamoide.*

Flore eſt radiato, floſculis marginalibus iis qui diſcum medium componunt, multo longioribus. R. Meth. p. 31.

Seſamoides parvum, *Offic.* parvum Matthioli *Ger.* Chondrilla Seſamoides dicta, *Park.* cœrulea Cyani capitulo, *C. B.* Catanance quorundam, *Bot. T. Inſt.* Dalechampii flore Cyani ſolio Coronopi, *J. B. Chab.* Cichorium Cyani capitulo, *Prælud. Bot.* cœruleum Coronopi foliis anguſtis calyculis ſquamatis argenteis, *H. Ox.* Baſtard Succory. In aridis locis tranſmarinis calidioribus Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Detrahit bilem, pituitoſoque humores, illitum ex aqua tumores ac tubercula diſcutit, *Dioſc.*

Seſamoidis duæ ſpecies à Dioſcoride memorantur & deſcribuntur. Verùm deſcriptiones ejus adeò breves ſunt & obſcuræ, ut quænam ſit major ejus ſpecies ad hanc uſque diem dubium & incertum maneat, nonnullis ad Heleborum eam referentibus, aliis ad Reſedam, aliis ad Thymelæam: De minore etiam ſpecie variæ opiniones ſunt, verùm quam hîc exhibeo cum deſcriptione Dioſcoridis, quam ſubjungo, omnium optimè convenit.

Seſamoidi parvo cauliculi ſunt dodrantales: folia Coronopi, minora, hirſutiora: & in cauliculorum cacumine Capitula florum pene purpureorum medio eorum albo: Semen Seſame fulvum amarum: radix tenuis.

XIV.

XIV. *De Scolymo Theophraſti.*

NOTÆ *ſunt Folia ſpinoſa Carduo ſimilia, floſculi & ſemina foliolo ad ſingula appoſito ſeparata*, R. Meth. A. p. 31.

Scolymus, *Offic.* Chryſanthemus, *C. B.* Theophraſti ſive Eryngium luteum Monſpelienſium, *Park.* Eryngium luteum facie Cardui, *Herm. Cat.* Carduus chryſanthemus Narbonenſis, *Ger.* Spurius chryſanthemus Narbonenſis, *Volck.* Spina lutea, *J. B.* lutea, Scolymus Theophraſti, Eryngium luteum Monſpelienſium, *Chab.* Cichorium luteum Scolymoides ſpinis horridum Narbonenſe, *Ox.* Cichorio affinis, chryſanthemus aculeata Cardui facie perennis, *P. Al.* Golden Thiſtle. In Italia reperitur. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum Eryngio viribus convenire creditur.

SECTIO

SECTIO QUINTA.

De Herbis flore compoſito diſcoid pappoſis.

III. *De Conyza.*

Pag. 162. lin. 4. ſubjunge,

1. COnyza major, *Offic. Ger.* major ver *H. Ox.* major verior Dioſcorid *Park.* mas Theophraſti major Di ſcoridis, *C. B.* major Monſpelien odorata, *J. B.* Conyza Pulicar *Chab.* Virga aurea major foliis glutinoſis & gr veolentibus, *El. Bot. T. Inſt.* Greater Fleaban In Italia, &c. juxta vias paſſim provenit. Julio Auguſto floret. *Uſu.* Folia, *Vires.* Suffitu ven natas beſtias fugat, culices abigit, & pulices nec *Dioſc.*

Pag. eadem lin. 14. ſubjunge,

3. Conyza minor, *Offic.* minor vera, *Ger. Ox. J. B. Chab.* minor vera Penæ, *Park.* fœmi Theophraſti minor Dioſcoridis, *C. B.* Virga a rea minor foliis glutinoſis & graveolentib *T. Inſt.* Small true Fleabane. In calidiorib regionibus juxta mare reperitur. Autumno fl re

et. *Uſu.* Herba *Vires.* Cum primo viribus onvenit.

IV. *De Tripolio.*

HErba eſt flore compoſito in pappos abeunte, inodora, foliis integris & indiviſis, innoxia, R. ynop. p. 79.

A. Tripolium, *Offic. Chab.* majus, *ejuſd.* majus minus, *J. B.* vulgare majus & minus, *Ger.* ajus ſive vulgare & minus, *Park.* majus cœruum & minus, *C. B.* majus flore albo, *Comel.* at. flore albo, *Breyn. P.* 1. flore nudo, *R. Synop.* after maritimus cœruleus Tripolium dictus, *ejuſd.* aritimus purpureus Tripolium dictus, *R. H.* œruleus glaber littoreus, pinguis Tripolium maus dictus, & littoreus pinguis Tripolium minus ictus, *H. Ox.* maritimus paluſtris cœruleus Saicis folio, *El. Bot.* Sea Star-wort. In ſalſis aritimis. Julio florer. *Uſu.* Radix. *Vires.* n vino pota 3ii aquam urinamque per alvum exrahit, *Dioſc.*

VI. *De*

VI. *De Doronico.*

Pag. 162. lin. 13. adde,

Vires. Calfacit & ficcat, tumores diſcutit, A[lexi]lexipharmica eſt, &c. *Schrod.* ſed credat qui vult, verùm enimverò noſtra ſententia venenoſa eſt planta & non ſine periculo ſumenda, cui tamen quidam moderni minimè aſtipulantur.

2. Doronicum Germanicum & Arnica, *Offic.* Germanicum, *Park.* Plantaginis folio alterum, *C. B.* Germanicum foliis ſemper ex adverſo naſcentibus villoſis, *J. B. Chab.* Calendula Alpina *Ger.* Arnica, *Schrod.* German Leopards-bane. In montoſis reperitur. Æſtate floret. *Uſus.* Planta *Vires.* Calfacit & ficcat, partium eſt tenuium, Sudorifica & diuretica nonnunquam & vomitoria, &c. *Schrod.* In officinis noſtris rarò aut nunquam occurrit, pernicioſam eſſe plantam etiam exiſtimo.

3. Aliſma, *Offic.* Aliſma Matthioli ſive Plantago montana, *J. B.* Doronicum Pannonicum ſextum, *Cluſ.* Doronico affine Aliſma Matthioli ſeu potiùs Plantago montana, *Chab.* Hungarian Leopards-bane. In Pannonia. Maio floret. *Uſus.* Folia. *Vires.* Planta vulneraria & diſcuſſoria reperta eſt frequenti experientia utpote unica & optima panacea ab alto lapſorum, *Ephem. Ger. Anno* 9 & 10.

VIII D[e]

VIII. *De Virga aurea.*

Pag. 163. lin. 8. ſubjunge,

HErba Doria, *Offic.* Doria Lobelii, *Ger.* Doria vulgaris, *Park.* Virga aurea major vel Doria, *C. B.* aurea major carnoſis ſuculentis foliis ad caulem latis, *H. Ox.* Aliſma Matthioli ſive Doria, *J. B.* ſive Damaſonium, Doria & virga aurea Monſpelienſium, *Chab.* Jacobæa pratenſis altiſſima Limonii folio, *El. Bot.* Doria's Wound-wort. Ad ripas fluviorum oritur. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Vulneraria eſt inſignis & cum priore viribus convenit.

VIII. *De Helichryſo.*

Pag. eadem lin. 22. ſubjunge,

2. STœchas Citrina Germanica, *Offic.* Citrina Germanica latiore folio, *J. B.* Elichryſum ſeu Stœchas citrina latifolia, *C. B.* Helichryſum ſive Chryſocome caulibus deciduis, latiore folio Germanica, *H. Ox.* 3. Amaranthus luteus latifolius, *Ger. emac.* German Golds-locks. In Germania reperitur. Julio floret. *Uſu.* Herba, Coma. *Vires.* Excalfacit, ſiccat, aperit, & abſtergit: Omnibus cerebri morbis à frigido provenientibus celebratur.

3. Chryſocome, *Offic.* peregrina major fruteſcens, *Breyn. Cent.* Elichryſon Orientale, *C. B.* Helichryſum ſive Chryſocome fruteſcens latifolia flore corymbifero toto aureo, *H. Ox.* Heliochryſum Orientale ſive Amarantus luteus, *Park.* Stœchas citrina floris magnitudine, & colore ſpecioſa, *J. B. Chab.* Gnaphalium Alexandrinum ſive Stœchas citrina Orientalis *H. R. P.* luteum peregrinum ſpecioſo flore, *Volck.* Oriental Golds-locks. In *Creta* Inſula reperitur. Julio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Excalfacit & adſtringit: his conveniens quos jecur, aut pulmonis inflammatio male habet, contra purgationes Vulvæ decocta cum Hydromelite aſſumitur, *Dioſc.*

A. 4. Pes Cati, *Offic.* Gnaphalium montanum ſive Pes Cati, *Park.* montanum album, *Ger. emac.* montanum folio rotundiore, *C. B.* Elichryſum montanum flore rotundiore, *Tourn. Inſt.* Piloſella minor quibuſdam aliis Gnaphalii genus, *J. B.* Pilo-

Piloſella Gnaphalii genus: Piloſella minor, *Chab.* Chryſocome humilis montana folio rotundiore, *H. Ox.* 3. 89. Cats-foot. In montoſis cretaceis reperitur. *Uſu.* Herba. *Vires.* Siccat & aſtringit, ad pulmonum exulcerationem, & ſanguinis expuitionem æſtimatur Syrupus, *H. Ox.*

IX. *De Jacobæa.*

A Cæteris pappoſis non lacteſcentibus foliis laciniatis, floribus flavis radiatis in umbellas digeſtis differt, R. Synop. p. 82.

A. Jacobæa, *Offic. Ger.* ſive Jacobi flos, *Chab.* vulgaris, *C. B.* vulgaris major, *Park.* vulgaris laciniata, *C. B.* Ragwort or Seggrum. In paſcuis humidioribus ad vias & locis incultis. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum Senecione vires & facultates eaſdem obtinet, *Trag.* Imprimis autem vulneribus, inflammationibus & fiſtulis medetur, *R. H.* p. 285. Calidam cataplaſmatis formâ adverſus ventris tormina, (quæ miſerè Dyſenteriâ affectos excruciant & tantùm non interimunt) felici ſucceſſu fuiſſe abdomini applicatam obſervat *Hofman.*

Pag. 164. lin. 21. ſubjunge,

XII. *De Cacalia.*

NOTÆ *ſunt* Calix *floris integer, tubi cylindrici formâ, ad margines duntaxat denticulatus, floſculi quadrifidi, folia ſubrotunda, integra ſerrata,* R. Meth. A. p. 34.

Cacalia, *Offic.* quibuſdam, *J. B.* incano folio, *Ger.* folio rotundo incano, *Park.* foliis craſſis hirſutis, *C. B.* ſive Leontice Veterum quibuſdam: aliis vero, Tuſſilaginis ſpecies, *Chab.* Strange-Coltsfoot. Ad Sylvarum margines, inter frutices & umbroſis in locis. Junio & Julio floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* In tuſſi & Scabritie arteriæ aſperæ commendatur. Succus ejus defluens prodeſt arteriæ aſperæ ſimiliter ut Glycyrrhiza, *Galen.*

XIII. *De Bacchare.*

FLoribus *nudis, foliis integris odoratis, ſapore acri & amaro, necnon magnitudine ſuâ à reliquis hujus generis diſtinguitur.* R. Synop. p. 83.

A. Baccharis, *Offic.* Monſpelienſium, *Ger.* *Park.* Conyza major vulgaris, *C. B.* major Matthioli, Baccharis quibuſdam, *J. B.* Conyzæ majoris genus Baccharis quibuſdam, *Chab.* Eupatorium montanum Verbaſci folio vulgatius Baccharis dictum, *H. Ox.* Plowmans Spikenard. In montoſis ficcioribus & in aggeribus. Autumno floret. *Uſu.* Folia, Radix. *Vires.* Radix in aqua decocta, ruptis, vulſis, ex alto præcipitatis, ſpirandi difficultati ſalutaris, &c. Folia adſtringunt. Capitis

pitis dolore proſunt, &c. odor ſomnum gignit, *Dioſc.*

Quænam planta ſit Baccharis *Dioſcoridis* inter Botanices ſcriptores dubium adhuc manet, aliis ad Conyzam, aliis ad Gnaphalium, nonnullis ad Aſterem eam referentibus.

Pag. 165. lin. 3. ſubjunge,

Extrinſecus è nobiliſſimis eſt vulnerariis.

XIV. *De Gnaphalio.*

Pag. eadem, lin. ult. adde,

GNaphalii hiſtoriam adeo paucis perſtrinxit *Dioſcorides*, ut non modo difficile, ſed etiam impoſſibile videatur (ut rectè obſervat *Matthiolus*) ut quiſquam conjicere ac diſcernere poſſit, quænam planta ſit, quæ verum repræſentat: Nos ad ſpeciem vulgariſſimam potiùs referendam cenſuimus, ut quæ omnium frequentiſſima occurrat.

2. Leontopodium, *Offic.* majus, *Park.* Gnaphalium Alpinum, *Ger.* Alpinum magno flore folio oblongo, *C. B.* Alpinum pulchrum, *J. B. Chab.* Filago Alpina capite folioſo, *T. Inſt.* Lions-foot. In montoſis. Julio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Appenſum ad amatoria prodeſſe & tubercula diſcutere tradunt. *Dioſc.*

SECTIO TERTIA.

De Herbis Capitatis.

I. *De Cynara.*

Pag. 176. lin. 12. ſubjunge,

2. SColymus ſylveſtris, *Offic.* Dioſcoridis, *Park.* Cinara ſylveſtris, *Ejuſd. Parad. Ger.* ſylveſtris latifolia, *C. B.* Carduus Scolymus ſylveſtris, *J. B.* ſive Scolymus ſylveſtris; Scolymus Dioſcoridis, *Chab.* ſive Cinara ſylveſtris latifolia, *H. Ox.* Wild Artichoke. In Italia & Gallia occurrit. *Uſu.* Flos. *Vires.* Contra ſteriliratem valere & gravidarum partus ad juſtum tempus conſervare, vulgus arbitratur. Lac coagulat, *Magol.*

3. Cactos, *Offic.* Scolymus, *Chab.* Carduus eſculentus, *Park. parad.* ſive Scolymus ſativus ſpinoſus, *J. B.* ſpinoſiſſimus elatior Chardone dictus, *H. Ox.* Cinara ſpinoſa cujus pediculi eſitantur, *C. B.* The Chardon. In Italia invenitur. *Uſu.* Pediculi foliorum Terrâ obruti candidi à cute emundati. *Vires.* Cum reliquis viribus conveniunt. Hyeme crudi cum ſale & pipere in cibos veniunt, *C. B.*

4. Co-

4. Coſtus nigra, *Offic.* Cinara ſylveſtris Cretica, *C. B. Park.* Carduus Agriocinara Cretenſium ex quo Coſtus nigra Officinarum, *J. B.* Agriocinara Cretenſium, *Chab.* Candy Artichoke. In *Creta* reperitur. *Uſu.* Radix nigra.

Bellonius Pharmacopolas Gallicos radicem hujus pro *Coſto Indico vero* divendere ſcribit, & apud veteres in uſu fuiſſe credit.

5. Carduus pinea, *Offic.* pinea Theophraſti, *Alp. exot.* Creticus humillimus integris & anguſtis foliis, *H. Ox.* pinea ſeu Ixine Theophraſti, *Park.* Carlina acaulos gummifera, *C. B.* Cinara acaulis gummifera, *R. H.* p. 301. Cnicus Carlinæ folio, acaulos, gummifer, aculeatus, flore purpureo & flore albo, *T. Coroll.* The Pine-Thiſtle. In Inſula *Creta* invenitur.

II. *De Carthamo.*

Foliis lævibus viridibus, floribus crocei coloris in capitulis modice ſpinoſis, ſemina alba quadrangula continens pappo deſtituta à reliquis differt.

Pag. 168. ante lin. 1. inſere,

III. *De Cnico.*

Foliis ſpinoſis mitioribus, capitula foliorum circulo obvallata, floribus flavis ab aliis diſtinguitur.

Pag. eadem, lin. 16. adde,

IV. *De Cirſio.*

Foliis integris, ſpinulis mitioribus brevioribus & minus pungentibus ab aliis differt.

Cirſium, *Offic.* foliis non hirſutis, floribus compactis, *C. B.* foliis non hirſutis, *Ger. emac.* montanum capitulis compactis, *Park.* Monſpelianum folio longo glabro Matthioli, *Chab.* Carduus cirſium Monſpeliacum, folio longo glabro Matthioli *J. B.* Carduo-Cirſium foliis non hirſutis floribus compactis, *P. Al.* Melancholy-Thiſtle. Juxta Monſpelium variis in locis. Junio floret. *Uſus.* Radix. *Vires.* Loco laboranti adalligatum, dolores varicum ſedare ſcripſit *Andreas.*

V. *De Carduo.*

Carduus foliis ſpinoſis ſeu aculeis rigidoribus armatis, floribus purpureis, ſeminibus pappoſis à reliquis capitatis diſtinguitur.

Pag. eadem, lin. 25. verbo *Schrod.* adde,

Menſes movet & urinam in decoctis, *Lo Mort.*

Lin

Lin. ult. adde,

Acerrimæ facultatis eſt, ſuccus cutem adurit, eſt tamen ad ulcera maligna depurganda utilis. *Bellon. Epiſt. ad Cluſ.*

3. Acanus, *Offic.* Theophaſti, *Park.* Carduus latifolius acinos obſoletæ purpuræ ferens, *C. B.* Theophraſtus his Thiſtle. In Inſula Creta reperitur, ubi antequam in caulem abeat comeditur. *Vires.* De viribus hujus Cardui nihil invenio inter authores.

Hanc ſtirpem Acanon veteribus dictam fuiſſe judicat *Bellus* conjecturis non deſpiciendis fretus, quas apud ipſum vide, *R. H. p.* 314. Conſule etiam *Parkinſonum* in *Theatro* ſuo *Botanico*, p. 974.

4. Acarna, *Offic.* Theophraſti, *Ger.* major caule non folioſo, *C. B. Park.* Acarnæ ſimilis Carduus polyacanthus, *Leon di Cardi Moſchio.* Caſabonæ, *Chab.* Polyacanthus Caſabonæ Acarnæ ſimilis, *J. B.* Carduus polyacanthus folioſo caule, Acerna dictus, *Herm. Cat.* polyacanthus caule non folioſo Acarna major dictus, *P. Al.* cœruleus procerior, ſpinis ternis per intervalla foliorum marginibus donatus, *H. Ox.* ſeu Polyacantha vulgaris, *El. Bot.* Fiſh-Thiſtle. In Italia ſponte oritur apud nos in hortis colitur. Julio florer.

A. 5. Acanthium, *Offic.* vulgare, *Park.* album, *Ger.* Spina alba latifolia tomentoſa ſylveſtris, *C. B.* alba ſylveſtris Fuchſio, *J. B. Chab.* Carduus tomentoſus Acanthium dictus vulgaris, *R. Synop.* tomentoſus latifolius ſylveſtris ; Spinâ alba vel Acanthium dictus, *Herm. Cat.* alatus tomentoſus latifolius vul-

garis, *H. Ox.* tomentoſus Acanthi folio vulgaris *T. Inſt.* Acanthum dictus, *Volck.* Cotton-Thiſtle. Ad vias & in incultis. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Folia & Radices. *Vires.* Ad remedia opiſthotoni bibuntur.

VI. *De Calcitrapa.*

Capitulorum ſquamis in aculeos rectos, oblongos & rigidos exeuntibus: foliis non ſpinoſis à reliquis differt.

A. Carduus ſtellatus, *Offic. Ger.* ſtellatus foliis Papaveris erratici, *C. B.* ſtellatus ſive Calcitrapa, *J. B. Chab.* Stellatus ſive Calcitrapa vulgaris, *Park.* Jacea ramoſiſſima, capite longis aculeis ſtellatim naſcentibus armato, *H. Ox.* Star-Thiſtle. Juxta vias publicas inque incultis & ſterilioribus. Æſtate floret. *Uſu.* Flos, Semen. *Vires.* Aqua florum, vel pulvis ſeminum Calculum expellit.

Pag. 169. lin. 11. adde,

Frigidæ eſt & temperatæ, atque adeo repellentis facultatis; in Eryſipelate, morbo regio, palpitatione cordis & uterina ſuffocatione prodeſſe dicitur, *H. Ox.*

Pag.

Pag. eadem lin. 20. ſubjunge,

VIII. *De Jacea.*

A. *Cyano differt figura floſculorum ex quibus totalis flos componitur, profundius, ſc. in longas & anguſtas lacinias diviſis,* R. Synop. p.89.

1. Jacea, *Offic.* nigra, *Ger. Chab.* nigra vulgaris, *Park.* nigra pratenſis latifolia, *C. B.* nigra vulgaris capitata & ſquamoſa, *J. B.* Knapweed or Matfellon. In paſcuis nimis frequens. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Contra Tonſillarum tumores valet.

2. Stœbe, *Offic.* argentea major, *Ger.* major foliis Cichoraceis, mollibus, lanuginoſis, *C. B.* Salmantica prima Cluſii, *Park.* Salmanticenſis prior Cluſiii ſive Jacea Intybacea, *J. B. Chab.* Jacea Intybacea, *Volck.* major foliis Cichoraceis mollibus, Flore ſtamineo, *H. Ox.* foliis Cichoraceis, villoſis altiſſima Flore albo, *T. Inſt.* Foliis Cichoraceis villoſis altiſſima, *El. Bot.* Silver-Knapweed. In hortis apud nos colitur. Julio floret. *Uſu.* Herba, Semina. *Vires.* Folia & ſemen aſtringunt, quapropter decoctum Dyſentericis infunditur, auribus quoque purulentis inſtillatur. Illita folia oculis ab ictu cruentis proſunt, & erumpentis ſanguinis impetus cohibent, *Dioſc.*

Tam brevis eſt & imperfecta *Stœbes* deſcriptio apud *Dioſcoridem*, ut Botanicos in varias diſtraxerit ſententias, &, ut diverſis plantis id nominis attribuerent, induxerit. Cujus hic loci Synonyma exhibeo, æquo aut forte potiori jure hoc nomen ſibi vendicare poſſit, cùm in calidioribus regionibus frequens naſcatur, quam *Jacea magna*

cujus

cujus iconem *Matthiolus* exhibet, eâve quam *Dodonæus* è *Bibliotheca Cæſarea* hauſit. Quomodo vires hujus cum ea *Dioſcoridis* conveniunt experimentis factis tempus prodet.

Pag. 170. lin. 14. poſt verbum *reperitur* adde,

Radix craſſa, oblonga, denſa, foris fuſca, intus ad croceum tendens, per tranſverſum ſecta, ſpiras oſtendens, ſaporis amaricantis ſubacris & ſubaſtringentis, odoris non ingrati.

Lin. 16. verbo *venditur* adde,

Quænam ſit genuinum *Dioſcoridis* Rhaponticum ſuperiùs in Capite de Lapathis oſtendi.

X. *De Serratula.*

Folio non ſpinoſis à Carduo, iiſdem ſerratis à Jacea differt, omnium partium parvitate à Centaurio majore diſtinguitur.

A. Serratula, *Offic. C. B. J. B.* Tabernæmontani, *Chab.* purpurea, *Ger.* vulgaris flore purpureo, *Park.* vulgaris foliis laciniatis, *H. Ox.* Jacea nemorenſis quæ Serratula vulgo, *El. Bot.* Sawwort. In ſylvis & in pratis. Julio floret. *Uſus.* Herba. *Vires.* Vulneraria eſt, Ulcera mundat & carne replet, hæmorrhoidum dolores mulcet, enterocelas ſanat. *R. Synop.* p. 88.

XI. *De*

XI. *De Bardana.*

Pag. 171. lin ult. ſubjunge,

A. 2. Arctium, *Offic.* Lappa major montana capitulis tomentoſis ſeu Arctium, *C. B.* Bardana major altera, *Ger. emac.* major lanuginoſis capitulis, *Park.* Perſonata ſive Lappa altera cum capitulis villoſis, *Chab.* altera cum capitulis villoſis, *J. B.* vulgaris capitulis minus tomentoſis, *R. Synop.* Woolly-headed Burdock. In locis ruderatis, & ad vias. Julio floret. *Uſu.* Radix, ſemen. *Vires.* Cum priore viribus pollet. Decocta cum ſemine radix in vino dentium dolores mulcet, ſi contineatur in ore decoctum: ambuſta pernioneſque foventur eodem: Bibitur adverſus coxendicum dolores & ſtranguriam è vino, *Dioſc.*

SECTIO

SECTIO SEPTIMA.

De Herbis Corymbiferis.

Pag. 174. lin. ult. ſubjunge,

I. *De Flore Salis.*

A Reliquis cujuſcunque generis plantis diſtingui tur flore omnium maximo barbulis umbonem medium coronantibus flavis & cuſpidatis, R.H.

1. Flos Solis, *Offic.* Solis major, *Ger.* Chryſan themum Peruvianum ſive Flos Solis, *Park. parad* Indicum, Flore & Semine maximis annuum, *Herm Cat.* Indicum maximum annuum non ramoſum *H.Ox.* Helenium Indicum maximum, *C.B.* Her ba maxima, *J. B. Chab.* Chimalath Peruviana Flos Solis, *Hern.* Corona Solis Tabernæmontani *El. Bot. T. Inſt.* Sun-flower. In hortis colitur Auguſto floret. *Uſu.* Germina Floris, Semina oblonga, tumidiuſcula & nonnihil compreſſa, ni gra. *Vires.* Germina cocta Venerem ſtimulant *Semina* pectus leniunt & ardorem extinguunt liberalius autem devorata capitis dolorem exci tant. Traumatica eſt planta.

2. Battata Canadenſis, *Offic.* Battatas de Ca nada, *Park.* & *Parad.* Flos Solis pyramidalis parvo Flore, tuberoſa Radice, Heliotropium In dicum quorundam, *Ger. emac.* Solis tuberoſus Indicus

ndicus, ſive Adenes Canadenſis, *Griſl. virid. Lu-*
an. Corona Solis parvo Flore, tuberoſa Radice,
l. Bot. Helianthemum Indicum tuberoſum,
B. Helenium Indicum tuberoſum, *H. R. P.*
hryſanthemum Indicum Radice tuberoſa, *Herm.*
at. perenne majus foliis integris Americanum
berоſum, *H. Ox.* Canadenſe ſtrumoſum, *Florent.*
h. Adenes ſive Flos Solis glanduloſus, *J. B.*
erуſalem Artichoke. In hortis apud nos colitur.
ſu. Radix in culinis.

III. *De Chryſanthemo.*

Pag. 175. lin. 19. verbo *occurrit* adde,

Olia ſeu Herba ferventi ſtomacho, oculorum
inflammationibus, prociduæ ſedi, ac ingui-
um tumoribus auxiliantur. Aqua Florum ſi biba-
r, anginæ & puerorum comitiali malo opitulatur,
ioſc.

2. Buphthalmum, *Offic. Chab.* Cotulæ folio
B. alterum, *Matth.* peregrinum, *Alp. exot.* al-
rum Cotulæ folio, *Park. Ger. emac.* tenuifolium
lio Millefolii ferè, *J. B.* Chryſanthemum Co-
læ folio, *Her. Cat.* alterum Cotulæ latiori folio,
Al. orientale Cotulæ folio ampliore, *H. Ox.*
otula Flore luteo radiato, *El. Bot. T. Inſt.*
Ope. In locis orientalibus ſponte oritur, apud
os in hortis curioſorum nutritur. Junio floret.
ſu. Herba, Flos. *Vires.* Herba vulneraria eſt.
lores cum cerato triti tumorum duritias diſcuti-
nt, *Dioſc.*

Buphthalmi nomine variæ donantur plantæ,
nperatus hoc legitimum eſſe ſtatuit, cui &
nos

nos ſubſcribimus, Buphthalmum enim Fœnic folia habere affirmat ipſe *Dioſcorides*.

3. Chryſanthemum, *Offic.* foliis Matricariæ, *C.* veterum ſeu majus folio valde laciniato, *Ch* majus folio valde laciniato flore croceo, *J.* Dioſcorides his Corn Marygold. In hortis c litur, ſed rarius. Æſtate floret. *Uſu.* Flore *Vires.* Cum cerato triti ſteatomata diſcutere pr duntur. *Dioſc.*

IV. *De Othonna.*

Hujus Notæ ſunt floris calyx integer oblong petala lata, ſemina longa compreſſa: fo laciniata Tanaceti æmula, R. H. p. 342.

Othonna *Offic.* Tagetes Indicus, Flos Africanu *Chab.* Tagetes Indicus minor ſimplici flore, & Caryophyllus Indicus, ſive Flos Africanus, *J.* Flos Africanus minor ſimplici flore, *Ger.* min ſimplex, *Park.* Tanacetum Africanum ſive flos A fricanus minor, *C. B.* Chryſanthemum Africanu Tanaceti folio procumbens, ſive minus flore ſi plici, *H. Ox.* Caryophyllus Mexicanus quint Tlapalcoſatli Coaxochitl, *Herm.* African Mary gold. In hortis ſeritur. Æſtate floret. *U* Succus inſpiſſatus. *Vires.* Oculorum medic mentis adjicitur, ubi expurgare eſt opus: abſte git enim omnem caliginem. *Dioſc.*

Pag. 176. lin. ult. ſubjunge,

V. *De Millefolio.*

ACchillea, *Offic.* ſive Millefolium nobile, *Ger.* Achillea ſiderites ſive nobilis odorata, *Park.* Achillea Millefolia odorata, *J. B. Chab.* Millefolium majus album odore Camphoræ, *Herm. Cat.* nobile Trago, *T. Inſt. El. Bot.* nobile & Stratiotes vera Tragi, *H. Ox.* Tanacetum minus album odore Camphoræ, *C. B.* Achilles his Iron-wort. In Germania, Italia & Gallia provenit. Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Sanguinis fluxus ſeu profluvia ubicunque ſiſtit. Extrinſecus Vulneraria eſt inſignis.

Pag. 179. lin. ult. ſubjunge,

X. *De Bidente.*

NOTÆ ſunt ſemen cornutum ſeu bidens, folia in caule bijuga, flores interdum radiati, alias nudi, R. Meth. Auct. p. 37.

Acmella, *Offic.* Chryſanthemum bidens Zeylanicum Acmella dictum ſeu Bidens Zeylanicum, flore luteo, Lamii folio, *Breyn. Diſſert. Bot.* Cannabina aut Bidens Urticæfolia Indica lithontriptica, D. *Hotton, Act. Philoſ. Lond.* N. 257. *p.* 365. Senecio Indiæ Orientalis Ocymi majoris folio profundè crenato *P. Al. Tab.* 315. *n.* 2. Acmella, Athmella and Admella. In Inſula Zeylanica ſat copiosè reperitur, unde in Europam tranſ-

transportatur. *Usu.* Folia, semen. *Vires.* Diaphoretica est & anodyna, humores viscidos tenaces attenuat, obstructiones reserat, materiam tartaream in renibus vel vesicâ concretam resolvit, calculosque aliquomodo frangit. *Semen* in Colica, Febribus & Pleuritide optimum est remedium. *Breyn. Dissert.* p. 14.

Pag. 181. lin. 4. adde,

Prodest etiam in Cachexia, ad uterinos frigidos affectus utiliter adhiberi solet, menseſque provocat. Semen lumbricos expellit, *H. Ox.*

XV. *De Absinthio.*

Pag. 182. lin. 17.

CUM *Gerardo, C. Bauhino* aliisque hanc speciem Absinthium Ponticum *Dioscoridis* esse existimo: Vulgare enim *Romanum* est, sic olim dictum quòd fuerit Plebi Romanæ sacrum, & quod in agro Romano antiquisve ruderibus passim inveniatur: *Ponticum* verò à Ponto in quo plurimum nasci traditur: Unde fallunt:ur qui *vulgare* aliud à *Romano* & *Pontico* existimant.

Pag. eadem lin. 24. verbo *convenit,*

Sed mitiori, palato etiam magis grato. Ex longo usu comorum hujus, quæ Saccharo adservatæ fuerant, Hydropicos quosdam quasi deplora-tos sanitati restitutos se novisse scribit *Matth.*

Lin

Lin. ult. ſubjunge,

4. Abſinthium Santonicum, *Offic.* Santonicum allicum, *C.B. Magnol. append.* French Wormſeed. Gallia Narbonenſi reperitur cum Seriphio Galco permixtum. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum Seiphio viribus convenit, *Dioſc.*

Pag. 183. lin. 11. ſubjunge,

Non levis eſt controverſia inter Botanicos de umbricorum ſeminibus Officinarum: aliis Zedoariæ ſemina eſſe affirmantibus, aliis Abſinthii: edoariæ ſemina non eſſe audacter affirmare aum, quia hæc rotunda ſunt & fuſca, & vaſculo icapſulari contenta; quæ notæ Lumbricorum mini, *Offic.* noſtratibus ſuperius deſcripto nullanus conveniunt. Alii idcircò, ut dixi, Abſinii cujuſdam ſemina eſſe opinantur, cujus *C. auhinus* in Pinace, pag. 139. non pauciores quaor ſpecies producit, quarum primam & ſecunam, non tantùm unam & eandem plantam eſſe edo, verùm illam ipſam quæ noſtra Lumbricoum ſemina profert. *Rauwolfius* eam in *Palæſtina* bique provenire ſcribit. Utrum ad caput de bſinthio propriè pertineat, an ad illud de Abrono potiùs referenda, impræſentiarum determinae non liber.

6, Santonicum viride, *Offic.* Chouan, *Pomet.* Green Wormwood. Semini Lumbricorum ſuperis deſcripto ſimile eſt, majus duntaxat, & coloris uteo-viridis. *Vires.* Cum priori viribus convenit.

Huic

Huic ſimile ſi non idem me vidiſſe aliquando memini apud Pharmacopolas Londinenſes. *Pomet.* ad Pariſios è Turcia primò allatum eſſe affirmat.

7. Helichryſum, *Offic. Chab.* Heliochryſon, *Park. parad.* quorundam, foliis Abrotani, *J. B.* Elichryſon foliis Abrotani, *C. B.* Coma aurea ſive Helichryſon, *Ger.* Abſinthium tenuifolium corymbis æqualibus ſeu compactis, *H. Ox.* corymbiferum annuum, *El. Bot. T. Inſt.* Golden-Cudweed. In hortis apud nos colitur. Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Contra ſerpentum ictus, coxendicum dolores, urinæ ſtillicidia, ruptaque commendatur, ciet menſes, & ſanguinem concretum diſſolvit, diſtillationes ſiſtit, *Dioſc.*

XVI. *De Abrotano.*

Pag. ead. lin. ult. ſubjunge,

A. 2. Artemiſia tenuifolia, *Offic.* tenuifolia ſeu leptophyllos, aliis Abrotanum, *J. B. Chab.* Abrotanum campeſtre, *Ger. C. B. Park.* inodorum, *Schwenck.* Fine leav'd Mug-wort. In locis arenoſis reperitur. Junio floret. *Uſus.* Herba. *Vires.* Dolorem ventriculi & nervorum mitigat.

Pag. 184. lin. ult. ſubjunge,

XVIII. *De Dracone Herba.*

Floſculis in ſpicis diſpoſitis, foliis integris longis & anguſtis à reliquis diſtinguitur.

Dra-

Dracunculus, *Offic.* hortenſis, *C. B.* hortenſis
Tarchon, *J. B. Chab.* Draco herba, *Ger.*
ba ſive Tarchon & Dracunculus hortenſis,
k. Abrotanum Lini folio acriori & odorato,
Inſt. mas Lini folio acriori & odorato, *El.*
. Tarragon. In hortis apud nos colitur. Ju-
floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Excalfacit, in-
it, digerit, aperit, menſes provocat, flatus diſ-
at, appetentiam excitat, pituitam educit & ce-
rum humidum purgat.

De Herbis Corymbiferis affinibus.

II. *De Dipſaco.*

Pag. 186. lin. 16. ſubjunge,

3. Virga Paſtoris, *Offic. Park.* Paſtoris vul-
garis, *J. B. Chab.* Dipſacus minor ſive
rga Paſtoris, *Ger. emac.* ſylveſtris capitulo mi-
re, vel Virga Paſtoris minor, *C. B.* Schep-
ds-rod. Ad ſepes in humidis & aquoſis. Ju-
floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Aquam foliorum
appetitu depravato mulierum laudat *Æginet.*
lvis commendatur in Hæmoptyſi ad unciam u-
m, *Prax. Mayern.*

III. *De Echinopo.*

Signi capitis in Sphæricam figuram conglobati
notâ ab aliis plantis facilè dignoſcitur. R. H.
383.

1. Cro-

1. Crocodilion, *Offic.* Echinopus, *Chab.* major *J. B.* Scabiosa Cardui folio, Sphærocephala elatior, *Herm. Cat.* Carduus globosus, *Ger.* Sphærocephalus latifolius vulgaris, *C. B.* Sphærocephalus sive globosus major, *Park.* Globe-Thistle. In hortis colitur. Æstate floret. *Usu.* Radix. Semen. *Vires.* Radix pota sanguinem copiosum per nares pellit: datur lienosis, eos evidenter adjuvans. Semen Urinam ciet, *Dioscor.*

Crocodilion à *Dioscoride* ita describitur; *Chamæleontis nigri figuram habet: nascitur in sylvis, radice longa, lævi, aliquantulum lata, odore ut Nasturtii acri.* Sed quænam planta sit, quamvis variæ eo nomine à Botanicis scriptoribus appellentur, non ita facilè est determinare. Nonnulli *Carlinam* esse volunt, alii *Eryngium maritimum.* Utraque opinio à *Matthiolo* solidè refutatur, cujus rationes apud Authorem requirendas omitto. *Andreas Lucana, Adversariorum auctore & Lobelius in Observationibus,* plantam quam hic exhibeo *Crocodilii* nomine donant, quorum authoritati impræsentiarum sententiam meam submitto, ut quæ descriptioni superius datæ præcipuè convenire videatur.

2. Spina alba, *Offic.* alba quibusdam capitis echinato, *J. B.* leucas sive Spina alba, *Chab.* Carduus globosus acutus, *Ger.* Spærocephalus acutus minor, *Park.* Sphærocephalus capitulo longis spinis armato, *C. B.* Echinopus Creticus capitis magno aculeato, *T. Coroll.* Scabiosa acanthoides conglobato capite longis spinis munito, *P. Alp.* Prickly Globe-Thistle. In hortis curiosorum apud nos colitur. Æstate florens. *Usu.* Radix. Semen. *Vires.* Radix cœliacis efficax est, urinam ciet, decocta dentium dolori prodest. Semen convulsis

nvulſis Infantibus, & à Serpente demorſis auxi-
tur, *Dioſc.*

Spina alba *Dioſcoridis* quam his verbis deſcri-
t: *Folia fert albi Chamæleontis, anguſtiora, ali-
antum hiſpida, & aculeata: caulem ſupra bina
bita altum, pollicari aut ampliore craſſitudine,
icantem, intus cavum: in cacumine capitulum
ſt ſpinoſum, echini marini æmulum, ſed minus
oblongum: flores purpurei, in quibus ſemen, ceu
icum, ſed rotundius.* Eſt etiam planta contro-
rſa, quæque eruditorum nonnullorum ingenia
xavit eoſque in partes diſtraxit. *Anguillarius*
ique eam eſſe quam hic damus affirmant,
orum opinio maximè veriſimilis videtur, Au-
riſque deſcriptioni præ aliis convenire, idcóque
n ita appellavi.

3. Spina Arabica, *Offic.* Carduus ſpinoſiſſimus
hærocephalus rigidis aculeis armata, *C. B.* ſpi-
iſſimus Sphærocephalus, Cardui Arabici nomi-
miſſus, *Park.* Arabian Thiſtle. In hortis facilè
ueſcit. Æſtate floret. *Uſu.* Radix, folia.
es. Folia ad Sanguinis rejectiones, menſium
ndantiam, cæteraſque fluxiones radix etiamnum
et, *Dioſc.*

Spina Arabica *Dioſcoridis* eſt etiam alia planta
bigua; nec mirum, cùm nihil aliud de eo dicat,
m *quod naturâ Spinæ albæ ſimilem eſſe conſtet.*
od adeò obſcurum eſt, ut nodum hunc *Gordi-
m* ſolvere ferè impoſſibile fuerit. *C, Bauhinus*
nque ſecutus *Parkinſonus* Plantam de qua hîc
mus, eo nomine miſſum affirmantes, ut huc
rrem mihi autores fuerunt; quamvis *Cæſalpi-*
& *Anguillara* ad aliam plantam, nimirùm ad
rduum tomentoſum *Adverſariorum* Spinam
bicam *Dioſcoridis* retulerunt.

4. Ritro,

4. Ritro, *Offic.* Echinopus minor, *J. B. Chab.* Carduus globoſus minor, *Ger.* Sphærocephalus cœruleus minor, *C. B.* ſphærocephalus minor, *Park.* Scabioſa Cardui folio Sphærocephala humilior, *Herm. Cat.* Little Globe-Thiſtle. In hortis etiam colitur, Julio florens. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum primo viribus convenit.

Ritro, Tetralicis, & *Chalceios* plantarum meminit *Theophraſtus,* poſteriorum duarum etiam *Plinius,* nullis deſcriptionibus additis; unde quænam plantæ ſint Botanicorum nemo certò determinare poteſt. *Lobelius* in *iconibus* Echinopum, *Chab.* pro Ritro, *Tetralice* & *Chalceio* Ejuſdem Authoris accipit. *Anguillara* & *Lobelius* Ritro nomine hanc plantam appellantes ut eam hic collocarem me induxerunt. Huc etiam tranſcribam quicquid de iis, *C. Bauhinus* in Pinace pag. 381. habet.

Ῥίτρον Theophraſtus 6. Hiſt. 3. *hæc ſolum habet: Alia ſurpen.è cacumine tantum ramos ſpargunt quemadmodum* Ruthrum. *Sunt tamen qui velint mendosè pro* ἐρυγγίῳ *apud* Theophraſtum *legi quod ex* Pliniana lib. 21. cap. 16. *loci illius* Theophraſti *interpretatione colligitur cum ibi non* Ruthrum *ſed* Eryngium *legatur.*

Hæc libuit aſpergere, cùm huic & ſequentibus hæc nomina à quibuſdam tribuantnr: at verborum brevitas obſtat quo minus certi quid ſtatui poſſit.

Τετράλιξ (*quam cum reliquis aculeatis plantis enumerat* Theophraſtus 6. Hiſt. 3.) *inquit, quibuſdam vocata æſtate floret: Et* Plinius lib. 21. cap. 16. *quædam æſtate florent, ut* Tetralix. *Sed non eſt confundenda cum Erica, quam* Athenienſes Tetralicen *vocant, eodem* lib. 11. cap. 16. *auctore.*

Χαλκηΐς

Χαλκης (*Ærariam Gaza vertit*) *apud* Theophraſtum & Plinium *eſſe volunt, cum tamen ejus hiſtoria apud neutrum extet: Sic* Theophraſtus 6. Hiſt. 3. *inter natura ſpinoſas* Chalceios, *quæ tamen non aculeatis foliis conſtat: Et* Plinius lib. 21. cap. 16. *Item* Acarna, Leucacanthos Chalceos, &c. *in foliis non habent aculeos.*

IV. *De Eryngio.*

Pag. ejuſd. lin. ult. pro 2da & 3a ſpecie adde,

A. 2. Eryngium campeſtre, *Offic.* Eryngium, *Chab.* vulgare, *C. B. J. B.* mediterraneum, *Ger.* mediterraneum ſeu campeſtre, *Park.* Tom-nom Eryngo. In Anglia rarior eſt, in tranſmarinis autem frequens. Julio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

3. Eryngium trifolium, *Offic. Park. R. H.* trifolium Alpini, *H. Ox.* Trefoil-Eryngo. In hortis curioſorum nonnunquam colitur. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum primo etiam viribus convenit.

SECTIO OCTAVA.

De Herbis Monoſpermis.

I. *De Valeriana.*

Pag. 188. inter lin. 16. & 17.

A 2. Valeriana ſylveſtris, *Offic.* Valeriana, *Rivin.* ſylveſtris major, *Ger. Park. C. B.* ſylveſtris magna aquatica, *J. B. Chab.* ſive Phu majus ſylveſtre, *P. B.* major ſylveſtris foliis latioribus, *Mor. Umb.* Phu & Valeriana Officinarum Germanorum, *Volck.* Great wild Valerian. In ſylvis & dumetis præſertim humidis & ad aquas. Maio, Junio, & Julio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Pulvis ad coch. ſemiſſ. in Vino aut quovis liquore exhibitus, certum eſt remedium contra Epilepſiam. Pueris tamen minore doſi exhibetur in lacte. *Column.* Ruptis, convulſis & ex alto præcipitatis utilis. Ad oris & gingivarum inflammationes, exulcerationes & aphthas prodeſt. *H. Ox.* Contra febres tertianas valet. *Schwab.*

Pag. ead. lin. ult. viribus *Nardi Celticæ* adde,

Calfacit & ſiccat, viriúmque earundem eſt cum *Spica Indica*, majore tamen cum utilitate adhibetur

ibetur in urina cienda, ventriculo roborando, atibus diſcutiendis. Extrinſecùs additur Malag- natis unguentiſque calfacientibus, *Schrod.*

4. Nardus montana, *Offic. Ger. Chab.* montana uberoſa, *Park.* montana radice olivari, *C. B.* Valeriana Nardus dicta radice olivari, *H. Ox.* Mountain-Spike-Nard. In montibus Neapolitanis. Eſtate floret. *Uſu.* Radix cum foliis. *Vires.* Ad eadem ad quæ Celticum efficax, *Dioſc.*

II. *De Valerianella.*

Seminibus pappo deſtitutis à Valeriana differt, caulibus dichotomis ab aliis ferè omnibus planis. R. Meth. A. p. 44.

A. Lactuca agnina, *Offic. Ger. Park.* agnina rifolia, *P. B.* agnina vulgò, *Herm. Cat.* Valeriana campeſtris inodora major, *C. B.* Valerianella arvenſis præcox humilior, ſemine depreſſo, *Mor. Umb.* Pleudovaleriana annua arvenſis præcox, humilis, ſemine compreſſo rotundo, *H. Ox.* Locuſta Herba prior, *J. B.* Herba, Pes Locuſtæ, *Chab.* Lambs-Lettuce, or Corn-Sallet. Inter segetes, & in hortis. Vere floret. *Uſu* Herba. *Vires.* Refrigerat & humectat, facultate que & temperamento haud diſſimilis Lactucæ, cujus loco hybernis & primis veris menſibus inter olera obtinet locum.

III. *De Dentellaria.*

Hujus notæ ſunt fructus oblongi, hirti, villis armati; flores è tubo oblongo in quinque segmenta expanſi, & in ſpicas congeſti, folia alterna. R. Meth. A.

Plumbago, *Offic.* Plinii, *Ger.* quorundam Cluſii, *El. Bot.* Dentellaria Rondeletii, *J. B. Chab.* Lepidium Dentellaria dictum, *C. B.* Monſpeliacum Dentellaria dictum, *Park.* Lead-wort. In Gallia & Italia naſcitur. Auguſto floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cauſtica eſt planta. Dolores dentium mitigat carpis applicata, aliis vero manu tantum retenta.

VI. *De Pimpinella.*

Pag. 190. lin. ult. pro 2da ſpcie ſubjunge,

2. CUminum ſylveſtre, *Offic. Ger. Park. Chab.* ſylveſtre capitulis globoſis, *C. B.* ſylveſtre primum, valde odoratum, globuloſum, *J. B.* Cuminoides vulgare, *El. Bot. T. Inſt.* Paſtinaca tenuifolia Cretica capitulis globoſis, *Mor. Umb.* Daucus odoratus Creticus Sanguiſorbæ capitulis villoſis, *P. Al.* Umbelliferis affinis capitulis globoſis & villoſis, *H. Ox.* Wild Cumin. In Inſula Creta, &c. locis glareoſis. *Uſu.* Semen. *Vires.* Adverſus tormina inflationéſque commendatur; ſingultus ſedat, ſugillata tollit, teſtium inflammationes repellit.

Pag. 191. lin ult. pro cap. 8. adde,

VIII. *De Thalictro.*

CHaracteriſticæ ſunt folia umbellatarum in modum diviſa, flores ſtaminoſi, ſemina ut in umbelliferis ſtriata. R. Synop. p. 101.

A. Tha

A. Thalictrum, *Offic.* ſeu Thalictrum majus, *Ger.* majus vugare, *Park.* majus ſiliquâ angulosâ aut ſtriatâ, *C. B.* nigrius caule & ſemina ſtriato, *J. B. Chab.* Meadow-Rue. In pratis & locis humidis. Junio floret. *Uſu.* Herba, Radix. *Viret.* Ulcera antiqua ad cicatricem perducit. *Dioſc.* Aperit, incidit, alvum movet, urinam ciet, fœtum ſanat, peſti reſiſtit. Radix optimum Rhabarbari ſuſtitutum eſſe creditur.

SECTIO NONA.

De Herbis Umbelliferis.

Pag. 198. inter lin. 20. & 21. adde,

VI. *De Oreoſelino.*

NOTÆ *ſunt folia Petroſelini aut Cicutæ ſimilia, flores roſæ formæ.* R. Meth. A.

1. Petroſelinum montanum, *Offic. Schrod.* Oreoſelinum majus Cluſii, *H. Ox.* ſive Apium montanum & Apium montanum Dalechampii, *Chab. Ger. Mor. Umb.* Apii folio minus, *El. Bot. T. Inſt.* Apium montanum vulgatius, *Park.* montanum, folio ampliore, *C. B.* montanum Dalechampii, *J. B.* Libanotis montana Apii hortenſis foliis nigrioribus, *P. Al.* Moun-

tain-Parſley. In locis montanis reperitur. *Uſu.* Radix, Semen. *Vires.* Calfacit & ſiccat, alexipharmacum eſt, ſudorificum, diureticum, diſcutiens. Uſus præcip. in calculo renum ac veſicæ, in Peſte, in Flatibus, in Stranguria. *Schrod.*

2. Daucus montanus, *Offic.* montanus Apii folio major, *C. B.* ſelinoides major, *Park.* Libanotis Theophraſti nigra, *Ger.* altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra, *J. B. Chab.* nigra ſeu Saxifragia Venetorum, *Mor. Umb.* Laſerpitium minus Paludapii folio, ſemine criſtato, *P. Al.* Oreoſelinum Apii folio majus, *El. Bot. T. Inſt.* Mountain-Daube. In montoſis Italiæ Julio floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Calfacit, aperit, incidit, urinam & menſes ciet, partum expellit, tumores diſcutit.

X. *De Ferula.*

Pag. 200. lin. 5. Et omnia ſynonyma deleantur, in quorum loco ſubſtitue ſequentia.

1. FErula Galbanifera, *Offic.* fruticoſa ſemper virens, foliis Aniſi, Galbanifera, ex qua Galbanum Officinarum, *P. B. P.* Africana Galbanifera, Liguſtici foliis & facie, *Par. Bat.* Aniſum Africanum fruticeſcens folio & caule rore cœruleo tinctis, *P. P. Tab.* 12. *f.* 2. fruticoſum Africanum Galbaniferum, *H. Ox.* Oreoſelinum Africanum Galbaniferum fruteſcens, Aniſi folio, *T. Inſt.* Aniſoides arboreſcens, Liguſtici foliis & facie, Flore luteo, Capitis Bonæ Spei, *Breyn.* p. 2. An Ferula Galbanifera, *Lob.* ?

Pag.

Pag. eadem lin. ult. ſubjunge,

2. FErula, *Offic. Ger.* tenuiore folio, *Park.* major ſeu fœmina, *Mor. Umb.* fœmina Plinii, *C. B.* folio Fœniculi, ſemine latiore & rotundiore, *J. B. Chab.* Fennel-giant. In hortis Botanicorum aliquando colitur. Julio floret. *Uſu.* Medulla caulium, Semen, Succus ſeu Gummi Sagapenum dictus. *Vires.* Viridis medulla pota ſanguinem ſpuentibus & cœliacis prodeſt, ſanguinis eruptiones ſiſtit, capitis dolores lenit. Semen potum torminibus auxiliatur. *Dioſc.*

3. Panax Aſclepium, *Offic.* Aſclepias Ferulæ facie, *Ger. emac.* Libanotis Ferulæ folio & ſemine, *C. B.* quibuſdam, Flore luteo, ſemine Ferulæ, *J. B. Chab.* Ferulæ folio & ſemine, ſive Panax Aſclepium Ferulæ facie Lobelii, *Park.* Ferula Libanotidis odorem & ſuccum fundens, ſeu Panax Aſclepium, *Mor. Umb.* minor, *El. Bot.* minor ad ſingulos nodos umbellifera, *T. Inſt.* The All-heal of Eſculapius. In *Iſtria* proveni. Æſtate floret. *Uſu.* Flores, Semen. *Vires.* Auxiliarem vim habent Flores & Semina contra ulcera, phagedenas & tubercula, ſi trita & cum melle imponantur: adverſus Serpentes ſi vino bibantur, *Dioſc.*

4. Libanotis altera, *Offic.* Fœniculi folio, ſemine foliaceo, *C. B.* Panax Aſclepium Anguillaræ & Camerarii, *Park.* Ferula folio glauco, ſemine lato oblongo, quibuſdam Thapſia ferulacea, *J. B. Chab.* Candy-All-heal. In Inſula *Candia* reperitur. Æſtate floret. *Uſu.* Radix, Herba, Semen. *Vires.* Trita omni herba communiter Hæmorrhoidum profluvia ſiſtit: Sedis inflammationes & condylomata mitigat. Siccæ radices

ulcera purgant, menſes & urinas cient. Potum Semen ad eadem pollet. *Dioſc.*

Pag. 202. poſt lin. 13. adde,

XI. *De Libanotide.*

Nota hujus generis characteriſticæ ſunt folia tenuiter diſſecta, ſemina tumida, nuci Myriſticæ parvæ figurâ, fungoſâ ſubſtantiâ nucleum ambiente. R. H. p. 424.

Libanotis, *Offic. Chab.* Ferulæ folio, ſemine anguloſo, *C. B.* Cachryophorus quibuſdam floribus luteis, *J. B.* Galeni Cachrys verior, *Ger.* Ferulæ folio, ſive Cachryfera, ſive Cachrys vera, *Park.* Cachrys ſemine fungoſo lævi, *H. Ox.* ſive Libanotis Cachryophoros ſemine fungoſo lævi, *Mor. Umb.* ſemine fungoſo lævi foliis Ferulaceis *Ejuſd. El. Bot.* Fennel-Herb-Frankincenſe. In montibus *Italiæ* & *Siciliæ*, &c. Maio floret. *Uſu.* Radix & Semen. *Vires.* Vim habet excalfaciendi & vehementer exſiccandi; quare abſtergentibus medicamentis inſeritur. *Dioſc.*

XII. *De Laſerpitio.*

Nota ſunt, Quatuor alæ foliaceæ per longitudinem decurrentes in ſingulis ſeminibus. Alæ membranaceæ in binis ſeminibus dum adhuc viridia & conjuncta ſunt, ſex tantum videntur, bini illis ad baſin ſingulorum ſeminum arctè ſibi invicem commiſſis. R. Meth. A. p. 48.

Laſer-

Laſerpitium, *Offic. Ger.* Gallicum, *C. B. Park.* è regione Maſſiliæ allatum. *J. B.* lobis anguſtioribus lucidis ſaturatè virentibus plurifariam diviſis, *P. Al.* anguſtifolium foliis conjugatim poſitis quinquefidis, *H. Ox.* foliis anguſtioribus dilutè virentibus, *Mor. Umb.* Silphium ſive Laſerpitium, *Chab.* Laſerwort. In hortis colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Excalfacit, ſugillatis, ſtrumis ac tuberculis medetur, Iſchiadicis, excreſcentiiſque circa ſedem tollendis convenit. Veneri reſiſtit; os commendat. *Dioſc.*

XIII. *De Scandice.*

SEminibus in roſtrum productis, Geranii moſchati roſtra referentibus, ab aliis umbelliferis abnnàè diſtinguitur. R. Synop. p. 103.

A. Scandix, *Offic. Mor. Umb.* Semine roſtrato vulgaris, *C. B.* vulgaris, ſeu Pecten Veneris, *Park.* Pecten Veneris, *J. B. Chab.* Veneris ſeu Scandix, *Ger.* Shepherd's-Needle, or Venus-Comb. Inter ſegetes frequens. Maio & Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Stomacho & Ventriculo utile eſt. Decoctum, veſicæ, renibus & jecinori conſert. *Dioſc.*

XVIII. *De Angelica.*

Pag. 205. pro ſecunda Specie Angelicæ addè,

A. 2. Herba Gerardi, *Offic. Ger.* Podagraria vulgaris, *Park.* Angelica ſylveſtris minor ſive erratica, *C. B.* Sylveſtris repens, *J. B.*

Chab. Podagraria dicta, *Mor. Umb.* Goat-weed. Ad ſepes, præcipuè hortorum. Junio & Julio floret. *Uſu.* Radix, Herba. *Vires.* Eiſdem cum Sativa viribus pollere creditur, quamvis languidior ſit. Podagram juvat.

Pag. eadem, lin. ult. ſubjunge,

XXI. *De Bulbocaſtano.*

RAdice eſculenta, foliis tenuiùs inciſis, ſemine longiuſculo glabro, ab aliis Umbellatarum generibus facilè diſtinguitur. R. Synop. p. 105.

A. Bulbocaſtanum, *Offic. J. B. Chab. Mor. Umb.* Majus & minus, *Ger.* Majus folio Apii, *C. B.* Nucula terreſtris major & minor, *Park.* Earth-Nut, Kipper-Nut, Pig-Nut, and Hawk-Nut. In paſcuis ſolo arenoſo aut glareoſo frequens. Vere floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Venerem ſtimulat, multum nutrit. Cruenta mingentibus & etiam ſpuentibus auxiliatur. *Trall.*

XXIV. *De Siſaro & Amomo.*

Pag. 207. lin. ult pro 3a, 4ta, & 5ta Specie adde,

3. SEcacul, *Offic.* Siſarum Syriacum, *C. B.* alterum Syriacum, *Park.* Paſtinaca Syriaca & Sacacul Arabum quibuſdam, *J. B.* Apium Syriacum radice ampla eduli, *H. Ox.* Syrian Skirret. Circa Halepum reperitur. *Uſu.* Radix longa, craſſa, intus candida, lævis, externe verrucoſa. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

A. 4. Selinum ſegetale, *Offic. Park.* Sii foliis *Ger.* Sium terreſtre umbellis rarioribus, *H. Ox.* Siſon alterum vel Amomo congener Sii foliis noſtras, *P. Al.* Hone-woꝛt. Inter ſegetes ſolo humido & lutoſo. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Contra tumores valet.

A. 5. Sium, *Offic.* majus latifolium, *Ger.* latifolium, *C. B.* maximum latifolium, *J. B. Chab.* Dioſcoridis ſive Paſtinaca aquatica major, *Park.* Sion aquaticum latifolium, *Mor. Umb.* Water-Parſnep. In Fluviis & locis paludoſis. Julio floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Cruda coctáque eſa calculos rumpunt, atque excernunt, urinas cient, menſes & partus extrahunt, Dyſentericis in cibo auxiliantur, *Dioſc.*

XXVII. *De Apio.*

Pag. 209. pro 3a ſpecie Apii adde,

3. BUnium, *Offic.* Dalechampii, *J. B. Chab.* Daucus Petroſelini vel Coriandri folio, *C. B.* Petroſelini vel Coriandri folio ſeu Bunium Dalechampii, *Park.* Saxifraga montana minor Petroſelini vel Coriandri folio, *H. Ox.* Apium octavum, *R. H.* p. 449. Wild-Parſlep. In locis ſaxoſis & aſperis. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Urinam ciet, excalfacit, ſecundas evocat: lieni, veſicæ, renibus utile eſt. *Dioſc.*

XXIX.

XXIX. *De Cicuta.*

Pag. 210. pro 2da Specie Cicutæ lin. ult. ſubjunge,

2. SEſeli Peloponnenſe, *Offic.* Peloponneſiacum recentiorum, *Park.* Peloponnenſe Matthioli ſive Cicutaria quorundam, *J. B.* Cicutaria latifolia fœtida, *C. B.* maxima fœtida, *Chab.* Cicuta latifolia fœtidiſſima, *Ger. emac. Mor. Umb.* Great Broad-leaved-Hemlock. In montibus Rhætiæ invenitur. *Uſu.* Radix, Semen. *Vires.* Eiſdem viribus cum Seſeli Maſſilienſi præditum eſt. *Dioſc.*

XXX. *De Phellandryo.*

Nota ſunt caulis craſſiſſimus, folia ampliſſima, & multifariam in minutas particulas ad modum Cicutæ diviſa, florum petala æqualia, bifida. R. Meth. A. p. 52.

A. Phellandrium, *Offic. El. Bot. T. Inſt.* vel Cicuta aquatica quorundam, *J. B.* Plinii quibuſdam, aliis Cicutaria aquatica, *Chab.* Cicutaria paluſtris, *Ger.* Paluſtris tenuifolia, *Park. C. B. Mor. Umb.* Cicuta paluſtris Cordi, *Volck.* Water-Hemlock. In aquis cœnoſis & rivis pigrioribus. Æſtate floret. *Uſu.* Herba, Semen. *Vires.* Cum Cicuta viribus convenit.

Pag.

Pag. 212. poſt lin. 8. adde,

XXXIII. *De Gingidio.*

UMbella à flore delapſo, clauſa, ejuſque radiis prælongis, rigidis, duris ab aliis omnibus Umbelliferis diſtinguitur. R. H. p. 456.

Gingidium, *Offic.* umbellâ longâ, *C. B.* Hiſpanicum, *Ger.* Viſnaga, *J. B. Chab.* ſeu Gingidium, *Mor. Umb.* Gingidium appellatum, *Park.* Fœniculum annuum, umbellâ contractâ oblongâ, *T. Inſt.* Spaniſh Pick-tooth. In hortis apud nos colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Olus hoc crudum, coctum conditumve eſtur magna ſtomachi utilitate: Urinam cier. Decoctum ex vino potum veſicæ prodeſt, *Dioſc.* Radii Umbellarum pro dentiſcalpiis multis in uſum veniunt. *R. H.*

XXXV. *De Fœniculo.*

Pag. 113. poſt. lin. 14. pro 3a ſpecie Fœniculi adde.

3. MYriophyllon, *Offic.* Milleſolium aquaticum, *Ger.* Aquaticum vulgatius, *Park.* Aquaticum umbellatum capillaceo brevique folio, *C. B.* Aquaticum Fœniculo ſimile Umbelliferum, *J. B.* Fœniculo ſimile Milleſolium aquaticum umbelliferum, *Chab.* Water-Fennel. In paludoſis oritur. Aprili florer. *Uſu.* Herba. *Vires.* Vulneraria eſſe planta creditur.

XXXVI.

XXXVI. *De Pyrethro.*

Radice fervida, ſemine nigricanti à reliquis differt.

PYrethrum verum, *Offic.* Sylveſtre, *Ger.* Umbelliferum, *C. B.* Umbelliferum primum, *Park.* Umbelliferum Matthioli, *J. B.* Umbelliferum latiore folio, *H. Ox.* True Pellitory of Spain. In hortis Botanicorum colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Radix pollicis craſſitudine, colore exterius ex fuſco flaveſcente, interius nigro, ſapore acri admodum & fervido. *Vires.* Ad dentium dolores tollendos cum ſua cauſa non infeliciter in ore continetur. In Lethargicis affectibus, Paralyſi, &c. uſurpatur.

Pag. 214. poſt lin. 2. inſere,

XXXVIII. *De Dauco Cretico.*

NOtæ ſunt, *folia minutiſſimè diſſecta, ſemen longum, incanum, villoſum, acre.* R. Meth. A. p. 52.

Pag. eadem poſt lin. 12 adde,

XXXIX. *De Petroſelino.*

FOlia *Apio hortenſi ſimilia, ſemen parvum oblongum hirſutum, quibus à reliquis differt.* R. Meth. A. p. 52.

Pag.

Pag eadem lin. 22. ſubjunge,

2. Selinum montanum, *Offic.* Apium peregrinum foliis ſubrotundis, *C. B.* ſemine villoſo, ſeu incano, peregrinum primum Cluſii, *Mor. Umb.* Selinum ſive Apium peregrinum Cluſii, *Park.* Viſnaga minor quorundam, Selinum peregrinum Cluſii, ſemine hirſuto, *J. B.* Stone-Parſley. In hortis Botannicorum nonnunquam colitur. *Uſu.* Semen. *Vires.* Cum præcedenti viribus convenit.

XL. *De Caucalide.*

SEmine aculeato echinato aut hiſpido ab aliis umbelliferis abunde diſtinguitur. R. Synop. p. 114.

A. 1. Caucalis, *Offic.* lato Apii folio, *C. B.* Apii foliis, Flore rubro, *Ger.* arvenſis latifolia purpurea. *Park.* Lappula canaria latifolia ſive Caucalis, *J. B. Chab.* Baſtard-Parſley. In arvis reperitur. Junio & Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Crudum coctũ ve olerum modo eſtur, Urinam movet, *Dioſc.*

A. 2. Pſeudo-Selinum, *Offic.* Caucalis minor Floſculis rubentibus, *Ger. emac.* minor flore rubente, *Park.* Semine aſpero, Floſculis rubentibus, *C. B.* Anthriſcus quorundam ſemine aſpero hiſpido, *J. B. Chab.* Hedge-Parſley. Indumeris & ad ſepes. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Urinam movet.

Pag.

Pag. 215. lin. ult. ſubjunge,

XLIV. *De Bupleuro.*

Foliis integris oblongis à reliquis diſtinguitur.

BUpleurum, *Offic.* Folio ſubrotundo ſive vulgatiſſimum, *C. B.* Perenne anguſtifolium *Mor. Umb.* Perenne longis & anguſtis foliis incurvis, *H. Ox.* Auricula leporis umbella lutea *J. B. Chab.* Hares-Ear. In collibus provenit. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Inter herbas vulnerarias recenſetur.

XLV. *De Seſeli Æthiopico.*

PLanta eſt fruticoſa Umbellam in faſtigio geſtans foliis integris glabris.

Seſeli Æthiopicum, *Offic.* Æthiopicum frutex *Ger. Park. Mor. Umb. H. Ox.* Æthiopicum Salicis folio, *C. B.* Æthiopicum fruticoſum. Periclymeni folio, *J. B.* Bupleurum arboreſcens Salicis folio *El. Bot. T. Inſt.* Shrub-Hart-wort. In hortis curioſorum nonnunquam reperitur. Auguſto floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Semen Maſſilienſi Seſeli multò acrius eſt & odoratius, unde eximiarum virium eſſe creditur.

SECTIO

SECTIO DECIMA.

De Herbis Stellatis.

II. *De Rubia.*

Pag. 217. lin. ult. pro 2da Specie ſubjunge,

A. 2. Rubia ſylveſtris & Rubeola, *Offic.* ſylveſtris, *Ger. Park.* ſylveſtris aſpera, quæ ſylveſtris Dioſcoridis, *C. B.* ſylveſtris monſpeſulana major, *J. B.* Wild-Madder. In ſepibus reperitur. Æſtate florens. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum ſativo viribus convenit.

III. *De Mollugine.*

Flores huic albi, folia latiora. R. Meth. A. p. 54.

A. Mollugo, *Offic.* vulgatior, *Park.* montana anguſtifolia vel Gallium album latifolium, *C. B.* Rubia ſylveſtris lævis *ejuſd. P. B.* anguloſa aſpera, *J. B.* Gallium album vulgare, *El. Bot.* Alyſſum, *Plin. lib.* 24. *cap.* 11. Baſtard-Madder. In ſepibus & dumetis. Junio florer, *Uſu.* Radix. *Vires.* Rubiæ ſativæ viribus poller, ſed mitior eſt.

Alyſſum

Alyſſum foliis tantùm & ramis minoribus, ab Erythrodano diſtare ſcribit Plinius.

Pag. 219. lin. ult. ſubjunge,

VII. *De Synanchica.*

NOtæ ſunt, *folia ad ſingula genicula quaterna, flores velut in umbella.* R. Meth. A. p. 55.

A. Rubia Synanchica, *Offic.* Cynanchica, *C. B. J. B. Chab.* Rubeola vulgaris quadrifolia, lævis, Floribus purpuraſcentibus, *El. Bot. T. Inſt.* Synanchica Lugdunenſis, *Ger. emac.* Aſperula repens Geſneri, ſeu Saxifraga altera Cæſalpini, *Park.* Squinancy-wort. In ſterilibus & creraceis. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Ad Anginam tum ſumpta, tum admota, utiliſſima eſſe creditur.

SECTIO.

SECTIONIS DECIMÆ *APPENDIX.*

De Herbis quibus terna ſingulis floribus ſuccedunt ſemina.

De Naſturtio Indico.

NOtæ ſunt; *folia peltata, pediculo in medio inſerto; flores irregulares, pentapetaloides cum calcari retrorſum producto, ſemina nuda, ad ſingulum florem terna, rugoſa, majora.* R. Meth. A. Naſturtium Indicum, *Offic. Ger. Park.* Indicum majus, *C. B.* Indicum folio peltato ſcandens, *J. B. Chab.* Viola Indica ſcandens Naſturtii ſapore & odore, Flore flavo, *Herm. Cat.* Acris Americana ſive Acriviola folio peltato minor & vulgaris, *P. Al.* Violæ affinis umbilicato ſeu peltato folio ſcandens, ſapore Naſturtii, Americana minor, *Breyn. P.* 2. Acriviola. *Volck.* Cardamindum minus & vulgare, *El. Bot. T. Inſt.* Pelon Mexixquilitl ſeu Pelon Chili, *Hern.* Indian Creſs. Peruviæ Indigena eſt, apud nos autem in hortis frequens colitur. Per totam æſtatem floret. *Uſu.* Herba, Flores. *Vires.* Ventriculo ex frigida cauſa imbecilli aut ex Flatu dolenti ſubvenit. Flos Acetariis

&

& in oloribus adhibetur. Adverſus contumacem ac malignam ſcabiem, itemque vulnera recentia commendatur.

SECTIO UNDECIMA.

De Herbis Aſperifoliis.

Pag. 222. lin. 8. adde,

POPULUS medicorum uno ore vim ſoporiferam attribuit Cynogloſſo, nullam tamen ejuſmodi ejus virtutem adhuc obſervare potuit D. *Fuller*.

V. *De Anchuſa.*

Pag. 224. lin. 2. ſubjunge,

RAdix aſtringit, vulneraria, alexipharmaca, ac uterina eſt, partum extrahit, renum vitiis, lieni, & bile ſuffuſis datur, ad ambuſta, ulcera vetera, & ignem ſacrum commendatur; demorſis à ſerpentibus opitulatur.

2. Anchuſa lutea, *Offic. Ger. J. B.* lutea major, *Park.* lutea rarior & elegantior, *Chab.* major floribus luteis, *C. B.* Symphytum Echii folio ampliore, radice rubra, *El. Bot.* Echii folio ampliore, radice rubra, Flore luteo, *T. Inſt.* Yellow-

Alkanet

Alkanet. In Germania, & Gallia reperitur. Julio floret. *Uſu.* Radix; ſed in Officinis Anglicanis nunquam reperitur. *Vires.* Cum Hyſſopo & Naſturtio pota, latas ventris tineas excutit. *Dioſc.*

Tres ſpecies Anchuſæ à *Dioſcoride* deſcribuntur, quænam autem plantæ ſint inter Auctores non convenit, aliis eas aliò referentibus. *Cæſalpinus* & *Thalius* Echium vulgare eo nomine inſigniunt. *Turnerus*, *Dodonæus* & *Cordus* duas ſpecies Bugloſſi conſtituunt, quo argumento neſcio, cum nota illa characteriſtica nimirùm quòd *radix manus inficiat ſanguineo colore*, nulli eorum conveniat. Recentiores Botanici plures hujus plantæ ſpecies proponunt, à quibus binæ illæ quas hîc exhibeo 2da & 3a *Dioſcoridis* cum *C. Bauhino* rectè cenſeri poſſe exiſtimo, prima major duntaxat ſecundæ ſpecies eſſe videtur.

VI. *De Echio.*

Pag. eadem, lin. 12. adde,

LUmborum dolores ſedat. *Dioſc.*

2. Lycopſis, *Offic. Chab.* Ægyptiaca, *C. B. Park.* Dioſcoridis quibuſdam, *J. B.* Echium Orientale longioribus floribus, *H. Ox.* Wall-Bugloſs. Circa Alepum reperitur. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum oleo illita vulneribus medetur, & cum farina hordeacea ignibus ſacris: Sudores peructa movet. *Dioſc.*

De Lycopſi magna inter Botanicos lis eſt: aliis nomen illud uni, aliis alteri plantæ attribuentibus. *Matthiolus*, *Lacuna*, *Dalechampius* & *Caſtor*

Caſtor Durantes Cynogloſſum eſſe volunt, quorum primus *Ruellium* & *Fuchſium* ejuſdem opinionis eſſe ait. Verum *Ruellius* Linguam Canis eſſe non poſſe, ut multi ſui temporis Herbarii voluerunt, deſcriptionibus utriuſque collatis affirmat. *Cordus* Echium vulgare, *Dodonæus* (in editione Gallica) Bugloſſum majus, *Lonicerus* Bugloſſum ſylveſtre, veram *Dioſcoridis* Lycopſin eſſe autumant, quorum nullius opinioni conſentire poſſum; & plantam à *Rauwolfio* inventam genuinam potiùs Dioſcoridis Lycopſin eſſe exiſtimo, quàm præcedentium quamlibet, aut eam quæ à *C. Bauhino* ſub eo nomine exhibetur.

A. 4. Onoſma, *Offic. J. B. Chab.* Lycopſis, *C. B.* Anglica, *Ger. Park.* Echium alterum, *P. B.* alterum ſeu Lycopſis Anglica, *Mer. Pin.* latiſſimo folio Lycopſis dictum Flore dilute purpuraſcente, *Herm. Cat.* Ramoſius annuum Flore ſuave-rubente, *H. Ox.* Stone-Bugloſs. In Inſula Jerſeia obſervavit eruditiſſimus, D. *Sherardus*, LL. D. *Uſu.* Folia. *Vires.* In vino pota partus extrahit. *Dioſc.*

Onoſma inſuper planta eſt, quæ Botanicos Auctores in varias ſententias diſtraxit, & quo referenda ſit incertos reddidit. *Dioſcorides* enim *folia Anchuſæ ſimilia habere* ſcribens, *caule autem, flore & ſemine deſtitui*, magnum altercandi occaſionem præbuit. Error hic *Dioſcoridis* inde oriri videtur, quod primo poſt exortum anno eam invenerit, cum folia tantum promit, quemadmodum Cynogloſſum, Bugloſſum, Echium, aliæque id genus plantæ, ad quas & hanc refero, ni *Dioſcorides* ipſe diverſis in Capitibus de iis egiſſet. Eſt autem error vulgaris in quem & alii inciderunt; quomodo enim planta quævis produci poteſt, ſi fructu & ſemine careat? Ab

icone

one quam exhibet *J. Bauhinus* & foliorum cum nchula ſimilitudine, ad hanc plantam potius re- li.

VII. *De Heliotropio.*

Eminibus lævibus non ſplendentibus, floribus in ſpicis longis recurvis, foliis lanuginoſis à reliquis differt. R. Meth. p. 95.

1. Heliotropium majus, *Offic. Ger. Park.* Majus ioſcoridis, *C. B.* Majus Flore albo, *J. B.* Herba ancri, *Chab.* Turnſole. In hortis colitur. ſtate floret. *Uſu.* Herba, Semina triangula evia cinerea. *Vires.* Decoctum pituitam bimque per alvum extrahit, ictus à Scorpionibus odeſt. Semen carnis excreſcentias reprimit, rrucas penſiles tollit; menſes & fœtus ducit, . *Ox.*

2. Heliotropium minus, *Offic. Ger. Park.* Minus pinum & Supinum alterum, *C. B.* Minus quondam, *J. B. Chab.* Humi ſuſum Flore minimo, mine magno, *T. Coral.* Small Turnſole. In rtis etiam colitur. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum iore viribus convenit.

Pag. 225. pro Cap. X. adde,

X. *De Cerinthe.*

Emina in hoc genere unicuique flori bina ſuccedunt lævia, per maturitatem nigra, quo à liquis ominbus hujus generis differt. R. H. p. 6.

Cerinthe

Cerinthe, *Offic.* Major, *Ger.* Major flore lute & rubro, *Park.* quorundam major verſicolore flore *J. B.* Seu Cynogloſſum montanum majus, *C. B.* Cerynthe veteribus, Cerinthe quorundam, *Chab.* Honey-wort. In hortis curioſorum reperitur. Ve re floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* De viribus ni certi traditur.

SECTIO DUODECIMA.

De Herbis Verticillatis.

III. *De Stœchade.*

Pag. 232. poſt lin. 4. pro 2da. Specie adde

2. TRagium alterum, *Offic.* Alterum Dioſcoridis quibuſdam foliis Trichomanis, *J. B.* A terum Dioſcoridis, Secudas Arabum & Halepen um, *Chab.* Stœchadi ſerratæ affinis, *C. B.* B ſtard Dittany. Circa Halepum invenit *Ra wolfius.* *Uſu.* Herba, Radix. *Vires.* Ta crudam quam coctam Dyſentericis prodeſſe di *Dioſc.*

Tragium alterum à *Dioſcoride* in hunc m dum deſcribitur. *Folia Scolopendrii habet, & dicem ſylveſtris Raphani tenuem candidam. Fol autem Autumno hirci virus olent; exinde ſibi Tra nomen adoptavit. Provenit in montibus & pra pitii*

pitiis, unde non immerito à *Rauwolfio* pro vero ſupponitur.

VI. *De Satureia.*

Pag. 233. pro 2da, 3tia & 4ta Specie Satureiæ adde,

2. THymbra, *Offic.* Satureia hortenſis, *Ger.* Vulgaris, *Park.* Montana, *C. B.* Perennis hortenſis vulgaris, *H. Ox.* Durior, *J. B.* Durior ſive Thymbra, *Chab.* Hortenſis ſive Thymbra legitima Dioſcoridis, *Griſl. V. Luſit.* Calaminthi frutescens, Satureiæ folio, facie & odore, *T. Inſt.* Winter-Savory. In hortis colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

3. Thymbra vera, *Offic.* Græca, *J. B.* ſive Satureia Cretica legitima, *Park.* Satureia Cretica, *C. B. Ger. emac.* Cretica latiore folio, *H. Ox.* Fruteſcens Arabica folio fimbriato hirſuto, *Breyn. P. 2.* True Savory. In Inſula Creta reperitur. *Uſu.* Herba, ſed in Officinis noſtris advena eſt. *Vires.* Urinam & menſes provocat, tuſſientibus cum mella valet.

4. Satureia Spicata, *Offic. C. B.* Sti. Juliani, *Ger.* Spicata Sti. Juliani, *Park.* Foliis tenuibus ſive tenuifolia Sti. Juliani quorundam, *J. B.* tenuifolia Sti. Juliani quorundam: Thymbra vera ſive genuina aliis, *Chab.* Thymbra Sti. Juliani, ſive Satureia vera Lobelio, *El. Bot.* Rock-Savory. In collibus & muris. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum reliquis viribus convenit.

Saxifragram primam *Matthioli* pro hac planta *C. Bauhinus* habet, *Parkinſonus* autem diverſam facit, quem conſule.

VII. *De Thymo.*

Differt à Satureia, cui alias ſimilis eſt, odore fragrantiâ, & floribus in oblonga capitula congeſtis. R. H. p. 519.

Thymum verum, *Offic.* Creticum, *Ger.* Creticum ſive Antiquorum, *J. B.* Legitimum capitatum, *Park.* Thymus capitatus qui Dioſcoridis, *C. B.* Hyſſopus capitata minor, Thymi odore, *H. Ox.* True-Thyme. In Creta ſponte oritur, in hortis apud nos reperitur. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Attenuat, incidit, aperit, uſus præcipuè in vitiis Pulmonum anheloſis & orthopnoicis; Menſes & urinas ciet, partus & ſecundinas expellit, Vermes necat, pituitam per alvum trahit, tumores diſcutit, concretum Sanguinem diſſolvit. Iſchiadicis ſubvenit.

IX. *De Serpyllo.*

Pag. 234. lin. 11. pro 2, 3, & 4ta, Species Serpilli adde,

2. THymus ſylveſtris, *Offic.* Narbonenſis Zygis dictus, *H. Ox.* Serpyllum Creticum, *Ger.* Folio Thymi, *C. B.* Narbonenſe, *Park.* Sylveſtre, Zygis Cluſio, Thymo vulgari rigidiori ſimile, *J. B.* Thymbra Hiſpanica Coridis folio, *El Bot. T. Inſt.* Wild-Thyme. In hortis curioſorum

rioſorum colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum Thymo viribus convenit.

A. 3. Serpyllum verum, *Offic.* Vulgare flore mplo, *R. Synop.* Sativum, *C. B.* Majus, *Park.* Foliis Amaraci, *Ger.* Serpylli vulgaris ſecundum genus, *J. B.* Great Mother of Thyme. In hortis colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Menſes & Urinam cier; torminibus, ruptis, vulſis & ecorinis inflammationibus auxiliatur, capitis dolores mulcet, maximè vero Phreneticis & Lethargicis convenit, cruentos vomitus ſedat, adverſus Serpentes prodeſt. *Dioſc.*

4. Thymus citrinus, *Offic.* Serpyllum citratum, *Ger. Park.* Foliis citri odore, *C. B.* Citri odore, *J. B. Chab.* Lemon-Thyme. In montoſis Auguſto floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum reliquis viribus convenit.

Pag. eadem, poſt 16. pro 6ta ſpecie adde,

6. Saxifraga vera, *Matth.* Vera Dioſcoridis Matthioli, *Park.* The true Saxifrage of Dioſcorides according to Matthiolus. In petris & aſperis, *Uſu.* Herba. *Vires.* Coctus in Vino febricitantibus opitulatur. Stranguriæ prodeſt, ſingultum ſedat, calculos veſicæ frangit & urinam ciet. *Dioſc.*

Hæ ſunt vires Saxifragæ ſuæ à *Dioſcoride* attributæ, verum huic plantæ non rectè ex ſententia noſtra adſcribuntur, in eo *Matthiolum* tantùm ecutus. Quænam ſit vera Antiquorum Saxifraga in capite de *Lychnide* oſtendere conatus ſum, & plantæ illi vires haſce convenire exiſtimo: Quænam planta hæc ſit aliis multis præter illum Botanicis non apparet adeoque à nonnullis ſuſpecta eſt.

X. *De Tragorigano.*

Verticillis denſis à Thymo & Serpyllo differt.

1. TRagoriganum, *Offic. Chab.* Creticum *C. B. Park.* Cretenſe, *Ger.* Quibuſdam nigrus, folio duro, Flore purpureo, *J. B.* Folio Thymbræ majoribus duris nigricantibus punctatis Flore purpureo minore, *P. Al.* Goats Marjoram. In Creta Inſula invenitur. Martio florer. *Uſus.* Herba. *Vires.* Calfacit, Urinam ciet, menſes provocat, Stomachum imbecillum corroborat.

2. Tragoriganum alterum, *Offic.* Cluſii, *Ger.* Hiſpanicum, *Park.* Anguſtifolium, *C. B.* Tenuioribus foliis, Flore candido, *J. B. Chab.* Creticum minus & tenuius, *Alp. ex.* Spaniſh-Goats Marjoram. In regno Valentino reperitur. Martio florer. *Uſus.* Herba. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit.

XI. *De Polio.*

Pag. 235. poſt lin. 5. pro 3a. Specie Polii adde,

3. POlium alterum, *Offic.* Montanum, Lavendulæ folio, *C. B. Park.* Lavendulæ folio Flore albo, *Ger.* Poley-Mountain with Lavender Leaves. In hortis Botanicorum. Junio florer. *Uſus.* Herba. *Vires.* Cum præcedentibus viribus convenit.

XII.

XII. *De Teucrio.*

Staturâ ſuâ & magnitudine, foliis latioribus, à Chamædry differt, quacum floribus galeâ carentibus convenit. R. H. p. 526.

Teucrium, *Offic. C. B.* Multis, *J. B.* Latifolium. *Ger.* Magus vulgare, *Park.* ſive Teucris, *Bauh.* Chamædrys fruticoſior ſive Teucrium vulgare Flore ochroleuco, *H. Ox.* Fruteſcens Teucrium vulgò, *El. Bot. T. Inſt.* Tree Germander: In Italia & Sicilia provenit. Æſtate floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Calfacit & ſiccat. Epatica & ſplenica eſt, confert in Serpentium ictibus. Ut in externa facie Chamædryn refert, ita iiſdem viribus poller.

De Plantis Verticillatis herbaceis.

XIV. *De Mentha.*

Pag. 236. pro 4ta, 5ta & 6ta Specie Menthæ adde,

A. 4. Mentha Saxifragra, *Offic.* Saxifraga anguſtiore folio ſpicata ſapore acri fervido, *R. Mant.* Spicis brevibus & habitioribus, foliis Menthæ fuſcæ, ſapore fervido Piperis, *R. Synop.* 124. Pepper-Mint. In aquoſis & ad foſſas nonnunquam reperitur. Auguſto floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* In calculo renum & veſicæ remedium ſpecificum æſtimatur.

Hæc planta ab illiterato quodam medicaſtro *Londinenſi* pro magno adverſus calculum arcano habebatur: quæ ne detegi poſſet, adeò cautus erat, ut quoties ea uti occaſionem habuit, ſe in concla-ve quoddam ſeu cameram incluſit, uſquedum eam in particulas adeò minutus diſcidiſſet, ut quænam planta eſſet invenire ferè impoſſibile foret: Tan-dem minuto ejus fruſtulo ad D. D. *Watſon* allato, in horto ſuo illud depoſuit, quo germinante ſe-cretum revelatum eſt.

A. 5. Auricularia, *Offic.* Indorum ad ſurditatem efficax, *Malab.* Mentaſtrum minus, *Ger. emac.* Hirſutum, *Park.* Mentha paluſtris folio oblongo, *C. B.* Mentaſtri aquatici genus hirſutum ſpica latiore, *J. B. Chab.* Ceylonian Plant. In aquo-ſis & ad ripas fluviorum non infrequens, Auguſto & Septembri floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Effica-ciſſimam in ſurditate eſt remedium.

D. *Marlow* in obſervationibus ſuis cujuſdam plantæ meminit *Plantæ Zeylanicæ* nomine abſque ulla deſcriptione aut notâ, qua poſſit dignoſci, & beneficia ejus ad poſteros derivari; unde inter eruditos Botanicos dubium exortum eſt, quænam ſpecies plantæ eſſet quam hac appellatione in-telligit. Omnes quidem conſentiunt, Menthæ quandam ſpeciem fuiſſe, quænam vero, adhuc dubium manet. Ingenioſus vir D. *Pluckenet* Menthæ cujuſdam verticillatæ in *Marilandia* naſcentis, cujus nomen in *Mantiſſa pag.* 129. exhibet, eſſe opinatur. Digniſſimus Vir D. *Sloane* Menthæ aquaticæ ſpeciem quandam eſſe exiſti-mat, neque rejicienda eſt ejus conjectura, quo-niam in minutis quibuſdam ejus fragmentis, à D. *Finchio* Pharmacopœo Londinenſi, viro in-genioſo D. *Marlow* prædicti ſucceſſore apud quem

guem omnium ejus Arcanorum ſpecimina, varirum etiam præparationes inveniuntur, Menthæ quaticæ odorem exquiſitum obſervavi. Idēmque candidus vir D. *Finchius* hanc herbam, non obſtante exotico nomine ei à D. *Marlow* impoſito, Anglicanæ originis eſſe mihi affirmavit, quin & fragmenta à prædicto D. *Finchio* mihi donata cum planta ipſa cujus Synonyma è *C. B. Pin.* aliiſque dedi, conveniunt, ſententia confirmor, nimirùm eas rectè à me collatas eſſe.

6. Mentha criſpa, *Offic.* Rotundifolia criſpa ſpicata, *C. B.* Spicata rotundifolia criſpa, *J. B. Chab.* Cruciata, *Park.* Cruciata ſive criſpa, *Ger.* Criſp or curled Mint. In hortis reperitur. Auguſto floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* In imbecillitate ventriculi pulvis quotidie ſumptus commendatur, *Scockerus.* In vomitu laudat *Etmullerus.*

Pag. 237. lin. 6. ſubjunge,

Quænam planta ſit Polycnemon *Dioſcoridis* inter Botanicos etiamnùm controvertitur, aliis ad aliam eam referentibus. Nos cum *Lobelio* ad hanc potiùs quam ad Bugulam vel Prunellam reducendam cenſuimus, quod *Dioſcoridis boni odoris & acris* eſſe ſcribat, quod de earum neutra dici prodeſt.

XVI. *De Lycopſide.*

Foliis rugoſis ad baſin laciniatis & odore carentibus à Mentha differt. R. Synop. p. 125.

A. Lycopus, *Offic.* Paluſtris, glaber, *El. Bot. T. Inſt.* Marrubium aquaticum, *Ger.* Aquati-

cum vulgare, *Park.* Aquaticum quorundam, *J. B. Chab.* Paluſtre glabrum, *C. B.* Pſeudo-marrubium aquaticum vulgare, *H. Ox.* Paluſtre, *Rivin.* Water-Hore-hound. In aquoſis & ad rivulus. Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Refrigerandi atque adſtringendi facultatem habere videtur *J. B.*

XIX. *De Majorana.*

Pag. 238, pro 2da, 3tia & 4ta Specie Majoranæ adde,

2. MArum Syriacum, *Offic. Ger.* Syriacum vel Creticum, *Park. Herm. Cat.* Creticum, *Alp. ex.* Majorana Syriaca vel Cretica, *C. B.* Syrian Herb-Maſtick. In hortis colitur. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum præcedenti viribus convenit.

3. Origanum Heracleoticum, *Offic. Ger.* Heracleoticum verius, *Park.* Heracleoticum Matthioli, aliis fortè Creticum, *J. B. Chab.* Heracleoticum, Cunila gallinacea Plinii, *C. B.* Baſtard-Marjoram. Reperitur in hortis. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Excalfacit, demorſis à Serpente convenit, ruptis, convulſis & hydropicis datur. *Dioſc.*

4. Majorana oleracea, *Offic.* Major Anglica, *Ger.* Latifolia ſive major Anglica, *Park.* Hortenſis viridis tenuior, *H. Ox.* Sylveſtris perennis, *C. B.* Origanum onites, *ejuſd.* Heracleoticum Ruellii ſive Majorana major, *J. B.* Pot-Marjoram. In hortis inter olera ſeritur. Æſtate floret. *Uſu.* Herba in culinis pro olere. *Vires.* Iiſdem cum Origano vulgari viribus pollet.

XXI.

XXI. *De Hormino.*

Pag. 239. poſt. lin. 17. pro 1ma Specie Hormini adde,

1. HOrminum, *Chab.* Sativum, *Offic. C. B.* Sativum genuinum Dioſcoridis, *Park.* Sylveſtre foliis purpureis, *Ger.* Comâ purpuro-violaceâ, *J. B.* Purple-Spiked-Clary. In hortis curioſorum apud nos ſeritur. Julio floret. *Uſus.* Semen. *Vires.* Ad Venerem ſtimulandam cum vino bibi volunt. Purgat cum melle argemas, albugineſque: extrahuntur etiam aculei ex corpore. *Diſoc.*

Pag. eadem lin. 23. adde,

In pulverem redacta, & naribus indita ſternutamenta provocat, catarrhum tollit, & cerebrum purgat. Decocta in vino menſes movet, ſecundinas ejicit, Venerem ſtimulat.

2. Æthiopis, *Offic. Ger. Chab.* multis, *J. B.* Foliis ſinuoſis, *C. B.* Sclarea Æthiopica, ſive Æthiopis laciniatis & non laciniatis foliis, *Park.* Vulgaris lanugiuoſo ampliſſimo folio, *El. Bot. T. Inſt.* Horminum Æthiopicum incanum foliis ſinuoſis Æthiopis dictum, *Herm. Cat. Volck.* Æthiopicum foliis ſinuoſis, *H. Ox.* Æthiopian-Clary. In hortis colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Iſchiadicis, Pleuriticis, Arteriæ ſcabritiei auxiliatur. *Dioſc.*

4. Horminum ſyveſtre, *Offic.* Sylveſtre latifolium, *Ger.* Sylveſtre latifolium, verticillatum

C. B. Germanicum humile, *Park.* Gallitricho affinis planta, Horminum ſylveſtre latifolium Cluſio, *J. B. Chab.* Wild-Clary. In Germania frequens occurrit. Æſtate floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Viribus magis pollet quàm Sativum.

A. 5. Oculus Chriſti, *Offic.* Horminum ſylveſtre, *Ger.* &c.

Lin. ult. dele Folia ſed rarius, *& lege* Semen.

Vires. Oculis inditum utile eſt ad excutiendam eorum caliginem & educendum corpuſcula quæ in illos inciderunt.

XXII. *De Galeopſi.*

NOtæ ſunt, folia urticæ, odor fœtidus, ſemina parva, per maturitatem nigra: floris labium ſuperius in cochlearis formam excavatum, inferius tripartitum, medio ſegmento obtuſo, longo lato utrinque reflexo, lateralibus parvis brevibus. R. Meth. A. p. 62.

A. 1. Galeopſis, *Offic.* Vera, *Ger.* Legitima Dioſcoridis, *Park.* Procerior fœtida ſpicata, *El. Bot. T. Inſt.* ſive Urtica iners magna fœtidiſſima, *J. B.* Lamium maximum ſylvaticum fœtidum, *C. B.* Stachys ſylvatica, *Rivin.* Fœtida Sepium flagellis reptatricibus, *H. Ox.* Hedge-Nettle. Ad ſepes. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Folia, Semen, duritias & carcynomata diſſipant: Strumas, panos & parotides diſcutiunt: ad putreſcentia, gangrænas, & nomas commendatur. *Dioſc.*

A. 2. Panax coloni, *Offic.* Coloni, ſeu Marrubium aquaticum acutum, *Ger.* Galeopſis anguſtifolia fœtida, *J. B.* Paluſtris, Betonicæ folio, flore varie-

variegato, *T. Inſt.* Stachys paluſtris fœtida, *C. B.* Aquatica, *Rivin.* Sideritis Anglica ſtrumoſa radice, *Park.* Clown's All-heal. In aquoſis & ad fluvios. Julio floret. *Uſu.* Herba, *Vires.* Vulneraria herba eſt inſignis.

Pag. 241. lin. 10. pro Cap. 26. & 27. adde,

XXVI. *De Acino.*

NOtæ ſunt, folia Serpylli aut Ocymi minoris, florum cauliculi oblongi, ſtriati, collo anguſto, ventre turgidiore. Flores ſecundùm caules ex alis foliorum exeuntes non in capitula congeſti in ſummis caulibus, quo à Serpyllo differt. R. Meth. A. p. 64.

A. Acinos, *Offic.* multis, *J. B. Chab.* ſive Ocymum ſylveſtre, *H. Ox.* Ocymum ſylveſtre, *Ger.* Clynopodium arvenſe Ocymi facie, *C. B.* minus ſeu vulgare, *Park.* Wild-Baſil. In montoſis cretaceis. Junio floret. *Uſu.* Herba, *Vires.* Menſes & alvum ſiſtit. Illita panos ignemque ſacrum ſanat. *Dioſc.*

N. B. *Mulierculis Botanopolis* Londinenſibus *pro* Polio montano *hæc planta venditur.*

XXVII. *De Stachy.*

VErticillis denſis, foliorum canitie & lanugine à reliquis differt. Adde, floris labium ſuperius elatum, bifidum & cochlearis modo concavum, inferius tripartitum, lateralibus ſegmentis adeò parvis ut crenæ potiùs videantur. R. Meth. A. p. 63.

Sta-

Stachys, *Offic. Ger.* Dioſcoridis, *Park.* minor Italica, *C. B.* Folio candicante denſiore non ſerrato minor, *H. Ox.* Baſe-Hoze-Hound. In hortis colitur. Junio floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Vim habet excalfactoriam, & acrem, menſes & ſecundas pellit. *Dioſc.*

XXVIII. *De Marrubio.*

Pag. 241. lin. 17. ſub finem pro 2da Specie junge,

2. PSeudo-dictamnus, *Offic. Ger. Park.* Verticillatus inodorus, *C. B.* Dictamnum adulterinum quibuſdam verticillatum, vel potiùs Gnaphalium veterum, *J. B.* Dictamnus ſpurius inodorus acetabulis Moluccæ minoribus, *Herm. Cat.* Marrubium Pſeudo-dictamnum dictum, *R. H. p.* 557. Marrubio congener ſive Pſeudo-dictamnus major inodorus, *P. Al.* Gnaphalium veterum, Centunculus, Dictamnum adulterinum quibuſdam, *Chab.* Baſtard Dittany. In hortis colitur. Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum Marrubio ut in externâ facie ita & viribus convenit,

3. Alyſſum Galeni, *Offic. Ger.* Alyſſum Galeni Cluſio, *Park.* Alyſſon verticillatum foliis profundè inciſis, *C. B.* Marrubium Alyſſon dictum, *Raii Hiſt.* p. 557. Marrubium Alyſſon dictum, foliis profundè inciſis, *Herm. Cat.* Marrubium album foliis profundè inciſis, Flore cœruleo, *H. Ox.* Marrubium, Hiſpanicum, Supinum, calyce ſtellato & aculeato, *è Inſt.* Galen's Mad-wort. In hortis curioſorum colitur. Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum Marrubio albo viribus convenire creditur.

XXIX. *De Clinopodio.*

Folia fert Majoranæ ſylveſtris, flores in verticillis denſis circa caulium nodos, quorum tubi quàm in Marrubio longiores; labia ſuperiora rotundata, elata & plerumque bifida, inferiora tripartita, ſegmento medio latiſſimo. R. Meth. A. p. 64.

A. Clinopodium, *Offic.* Majus, *Park.* quorundam Origani facie, *J. B.* Origano ſimile. *C. B.* Acinos, *Ger.* Great-wild-Baſil. Ad ſepes paſſim. Junio & Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Bibitur ad convulſa, rupta, ſtrangurias, Serpentium ictus: Menſes & partus pellit. Alvum ſiſtit. *Dioſc.*

XXX.

XXX. *De Lamio.*

Pag. 242. lin. 19. pro 3a ſpecie Lamii adde,

A 3. Leucas montana, *Offic.* Lamium luteum. *Ger. Park.* Folio oblongo luteum, *C. B.* Spurium Flore luteo, *Volck.* Pſeudo-lamium Flore luteo, *Rivin.* Galeopſis, *Chab.* ſive Urtica iners Flore luteo, *J. B.* Yellow Archangel. In ſylvis & dumetis. Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Contra animalium venena, præcipuè marinorum opitulatur. *Dioſc.*

XXXI. *De Sideritide.*

Odore gravi & fœtido cum Lamio convenit, ſed foliorum figura differt. R. Meth. A.

Sideritis, *Offic.* Hirſuta procumbens, *C. B.* Cluſio Hiſpanica, hirſuta, *J. B.* Prima herba Judaica, *Park.* Herba Judaica, *Ger.* Iron-Wort. In petroſis Italiæ, Hiſpaniæ, *&c.* Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Illita folia ſuapte vi vulnera ſine inflammationis periculo jungunt. *Dioſc.*

De Sideritide agentes multùm inter ſe diſſentiunt Botanici, & plures plantæ ſunt quibus id nominis ab eis attribuitur. *Dioſcoridis* tres Sideritidis Species deſcribit; quarum primum ſtirpem à me hoc in loco exhibitam eſſe exiſtimo, ut quæ judicio noſtro meliùs conveniat cum brevi *Dioſcoridis* deſcriptione, *lib.* 4. *cap.* 29. quam quævis alia. *Sideritin* (inquit loco citato) *aliqui Heracleam vocant: folia habet Marrubi, ſed longiora, ſatis ad frondem Quercus, aut Salviæ accedentia, minora*

minora tamen & aſpera: Caules edit quadratos, dodrantem altos, aut etiam majores, non injucundi guſtus, aliquantumque ſubaſtringentis; in quibus per interſtitia orbiculatæ vertebræ, ut in Marrubio ſpectantur: & ſemen in iis nigrum: naſcitur in petroſis. Secundam Sideritidem Pimpinellam ſanguiſorbam, *Offic.* P. 190. *Pharmacolog. noſt.* eſſe, cum nuperis Botanicis conſentio. Tertium, Geranium Robertianum ſeu Gratiam Dei, *Offic.* p. 342. ejuſd. *Pharmacolog.*

XXXIII. *De Calamintha.*

NOtæ ſunt flores plures ſimul pediculis oblongis ramoſis è foliorum ſinubus egreſſis inſidentes, rari & ſparſi, è tubo oblongo in duo labia hiantes quorum ſuperius bifidum rotundatum, alatum, inferius tripartitum. R. Meth. A. p. 65.

Pag. 243. pro 2da Specie Calamintæ adde,

A. 2. Calamintha ſylveſtris, *Offic.* Odore Pulegii, *Ger.* Flore minore odore Pulegii, *J. B. Chab.* Altera odore Pulegii foliis maculoſis, *Park.* Pulegii odore ſeu Nepata, *C. B.* Field-Calamint. In aggeribus ſepium & agrorum marginibus. Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit, cui ſuccedaneum eſt, & pro ea *Mulierculis Botanopolis Londinenſibus* non infrequens venditur.

Pag.

Pag. 244. ad vires Ballot adde,

Vis ejus efficax adverſus canis morſus, foliis ex ſale illitis. Ferventi cinere flacceſcunt folia, & condylomata reprimunt, purgant & ſordida ulcera cum melle. *Dioſc.*

XXVI. *De Cardiaca.*

NOtæ ſunt, folia circumſcriptione ſubrotunda & profundè laciniata: floris labium ſuperius in canalem inflexum, & inferiore multò longius, inferius tripartitum; calix valdè brevis, & ſeminibus ad ſummitatem uſque repletus, R. Meth. A. p. 64.

Cardiaca, *Offic. J. B. Park. Ger.* ſeu Lycopus Ruellii, *Chab.* Marrubium Cardiaca dictum. *H. Ox.* Cardiaca dictum, fortè primum Theophraſti, *C. B.* Mother-wort. In hortis & in fimetis. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Urinam & menſes ciet, pectus à pituita detergit, lumbricos necat, palpitationem cordis, & cardialgiam in infantibus juvat, in lienis morbis, & affectibus hyſtericis utilis æſtimatur.

XXXVII. *De Chamæpity.*

Pag. 244. lin. ult. ad vires Chamæpityos adde,

VUlnera glutinat, nomas cohibet, menſes movet, fœtum pellit, abortum provocat. In urinæ difficultate, & in mictura ſanguinis multum commendatur, *H. Ox.* Ictero medetur ſi ſeptem diebus in vino poretur. *Dioſc.*

2. Chamæpitys altera, *Offic.* Moſchata foliis ſerratis, *C. B.* ſive Iva Moſchata Monſpelienſium flore purpuraſcente, *Chab.* Iva Moſchata Monſpeliaca, *Ger.* Anthyllis altera herbariorum, *Park.* French-Ground-Pine. In Gallia frequens reperitur. Junio floret. *Uſu.* Herba.

3. Chamæpitys tertia ſeu mas, *Offic.* Odoratior, *Park.* Incana exiguo folio, *C. B.* Folio non laciniato, *J. B.* Folio non laciniato ſeu tertia Dioſcoridis Matthiolo, *Chab.* Tertia Dodonæi, *Ger.* Italian Ground-Pine. In Italia non infrequens. Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Hæ duæ vim ſuperioris obtinent, ſed non uſque adeò efficacem. *Dioſc.*

Pag. 245. lin. 11. viribus Bugulæ ſubjunge,

Tam intrinſecus quàm extrinſecus adhibita: confert & ictero, hepatis obſtructioni, urinæ retentioni, herniis, *&c. Schrod.*

Pag.

Pag. ead. lin. ult. adde,

Geſnero in remediis Scordio præfertur. In ulceribus gangrænoſis claudendis celebravit *Hildanus*.

SECTIO XIII.

De Herbis Semine nudo Polyſpermis.

III. *De Ranunculo.*

Pag. 250. pro 2da, 3a, 4ta & 5ta Speciebus Ranunculi adde,

A. 2. Ranunculus paluſtris, *Offic.* Paluſtris rotundifolius, *Ger.* Paluſtris Apii folio lævis, *C. B.* Paluſtris Flore minimo, *J. B. Chab.* Paluſtris Sardonius lævis, *Park.* Round-leav'd Water Crowfoot. In aquoſis gaudet. Junio & Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Folia, Flores, & Cauliculi recentes illitu exulcerant, & cruſtas non ſine dolore gignunt: quare ungues ſcabros extricant ſcabiem eximunt, ſtigmata delent: formicantes verrucas, & penſiles, alopeciá que pauliſper illitu tollunt. *Dioſc.*

A. 3.

A. 3. Ranunculus flammeus, *Offic.* Flammeus major, *Ger.* Paluſtris flammeus major, *Park.* Longifolius paluſtris major, *C. B.* Folio longo maximus, Lingua Plinii, *J. B. Chab.* Great Spear-Wort. In foſſis paluſtribus. Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

A. 4. Flammula, *Offic.* Ranunculus flammeus minor, *Ger.* Paluſtris flammeus minor ſive anguſtifolius, *Park.* Longifolius paluſtris minor, *C. B.* Longifolius aliis Flammula, *J. B.* Longifolius Flammula dictus, *Chab.* Spear-wort. In pratis aquoſis, lociſque uliginoſis frequens. Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum reliquis vi cauſtica convenit. Foliis ludit nunc æqualibus nunc ſerratis, unde Ranunculus flammeus ſerratus, *Ger. Park.* Paluſtris ſerratus, *C. B.*

A. 5. Ranunculus montanus, *Offic.* Montanus maximus albus, *Park.* Montanus Aconiti folio albus Flore majore, *C. B.* Aconiti folio, *Ger.* Flore albo Alpinus major, *J. B. Chab.* Mountain-Crowfoot with a White Flower. In montium ſylvoſis locis. Maio & Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum reliquis Ranunculis viribus convenit.

A. 6. Ranunculus acris, *Offic.* Surrectis cauliculis, *Ger.* Pratenſis erectus acris, *C. B.* Pratenſis erectus acris vulgaris, *Park.* Rectus non repens, Flore ſimplici luteo, *J. B. Chab.* Upright Meadow-Crowfoot. In pratis & paſcuis. Maio & Junio floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Veſicat, exulcerat, apud ruſticanos noſtros in uſu eſt.

7. Thora, *Offic. Chab.* Valdenſis, *Ger.* Folio Cyclamini, *J. B.* Aconitum Pardalianches alterum, ſeu Thora minor, *C. B.* Pardalianches, ſeu

Thora

Thora minor, *Park.* Ranunculus Aſphodeli radice dictus Phthora minor, *H. Ox.* *Item* Thora montis Baldi ſive Sabaudica, *Ger.* Aconitum Pardalianches primum ſeu Thora major, *C. B.* Pardalianches ſeu Thora major, *Park.* Ranunculus Aſphodeli radice dictus Phthora major, *H. Ox.* Rotundifolius Alpinus Flore parvo, grumosâ radice Phthora major dictus, *P. Al.* Alpinus Cyclaminis folio, Ranunculus rotundifolius Alpinus Flore parvo, grumosâ radice Thora major dictus, *Volck.* Leopard-bane. In montibus Helveticis reperitur. *Uſu.* Herba. *Vires.* Vi cauſtica prædita eſt.

IV. *De Eranthemo.*

Foliis tenuiſſimè diſſectis, radice annua floribus polypetalis à reliquis differt.

A. Flos Adonis, *Offic. Park. Chab.* Adonis Flore rubro, *Ger.* Adonis vulgò aliis Eranthemum, *J. B.* Adonis hortenſis Flore minore atro-rubente, *C. B.* Æſtivalis Flore minore ruberrimo, *H. Ox.* Ranunculus arvenſis foliis Chamæmeli Flore phœniceo, *T. Inſt.* Red Maithes. In arvis naſcitur ſed rarius. Junio & Julio floret. *Uſu.* Flos. *Vires.* Ad dolores colicos & nephreticos leniendos utilem eſſe ſcribit *Parkinſonus.*

V. *De Myoſuro.*

Floſculi herbacei pentapetali, ſemina in ſpicam oblongam caudæ muris æmulam excurrunt. R. Synop. p. 282.

A.

A. Myoſuros, *Offic. J. B. Chab.* Cauda muris, *Ger.* Holoſteum Loniceri Cauda muris vocatum. *Park.* Holoſteo affinis Cauda muris, *C. B.* Adonia puſilla ſegetalis gramineis foliis ſpiſſis, Flore obſoleto, ſpicâ caudam murinam æmulante, *P. Al.* Mouſe-Tail. In arvis & ad vias. Maio florer. *Uſu.* Herba. *Vires.* Viribus plantaginis & Coronopi à quibuſdam convenire creditur.

Pag. 251. Ad vires Alceæ adde,

Ex emplaſticorum & emollientium medicamentorum numero eſt. Celebratur ab Empiricis ad caliginem oculorum. Aquâ decocta torminibus inteſtinorum remedio eſt, *R. H.* Totius corporis calidis doloribus apprimè conducit, *J. B.* Cum vino aut aqua pota, dyſentericis ruptiſque medetur. *Dioſc.*

P. 254. Ad Vires Plantaginis aquaticæ adde,

Procidentium ani curare, rubentem podagram, capitis dolorem è causâ calidâ mulcere, cruento ſputo urinæque mederi trahit, *Schwenckfeld.* Succus lac in mammillis conſumit. *Roſlin*

XV. *De Sagitta.*

Foliis eſt alatæ ſagittæ formam referentibus, floribus tripetalis, ſemina flori unicuique ſuccedunt in capitulum congeſta denſeque ſtipata. R. Meth. A. p. 67.

A. Sagitta, *Offic.* Major, *Ger. J. B.* Aquatica major, *C. B.* Major latifolia, *Park. Chab.* Ranunculus

nunculus paluſtris folio Sagittato, *El. Bot.* Paluſtris folio Sagittato maximo, *T. Inſt.* Arrowhead. In rivulis & aquis. Maio & Junio floret. *Uſu.* Herba, Semen. *Vires.* Temperamento eſt frigido humidóque & iiſdem cum Plantagine aquatica viribus pollet. *Matth.*

XVI. *De Clematide.*

NOtæ ſunt ſemina plumulis longis adnaſcentibus cincinnata, flos quadrifolius ſeu cruciatus, ſapor in pleriſque ſpeciebus fervidus. R. Meth. A. p. 69.

1. Clematis altera, *Offic.* Cœrulea vel purpurea repens, *C. B.* Peregrina cœrulea ſive rubra, *Ger.* Peregrina Flore rubro vel purpureo ſimplex, *Park.* ſive Flammula Flore purpureo & Cœruleo ſimplex, *J. B. Chab.* Virgins Bower. In ſepibus Italiæ & Hiſpaniæ reperitur. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Folia, Semen. *Vires.* Semen tritum pituitam bilémque detrahit. Folia illita Lepras purgant. *Dioſc.*

A. 2. Atragene, *Offic.* Viorna, *Ger.* Clematis ſylveſtris latifolia, *C. B.* Sylveſtris latifolia ſive Viorna, *Park.* Latifolia ſeu Atragene quibuſdam *J. B.* Athragene Theophraſti quibuſdam, *Chab.* Travellers-Joy. In ſepibus. Julio floret. *Uſu.* Tota planta. *Vires.* Flore, cortice, ſemine & radice vim urendi habet.

3. Flammula Jovis, *Offic.* Jovis ſurrecta, *Ger. Park.* Recta, *C. B.* Clematis ſive Flammula, ſurrecta alba, *J. B. Chab.* Upright Ladies-Bower. In hortis colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Herba cum floribus. *Vires.* Vim urendi cum reliquis habet.

Pag.

Pag. 255. lin. ult. ſubjunge,

XIX. *De Anemone.*

Notæ ſunt ſemina in capitulum oblongum congeſta, pappo ſeu lanugine copiosâ cincta. R. Meth. A. p. 69.

1. Anemone hortenſis, *Offic.* Geranii Ruperciani folio cœruleo: an Dioſcoridis? *C. B.* Geranifolia, *Ger. J. B. Chab.* Tenuifolia ſive Geranifolia cœrulea, *Park.* Garden-Anemone. In hortis colitur. *Uſu.* Herba, Radix. *Vires.* Acrem vim habet. Commanducata Radix pituitam trahit. *Dioſc.*

2. Anemone ſylveſtris, *Offic.* Matthioli, *Ger.* Sylveſtris alba major, *C. B.* Sylveſtris latifolia alba ſive tertia Matthioli, *Park.* Magna alba, plurimâ parte anni florens, *J. B.* Wild-Anemone. In hortis colitur. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

XX. *De Pulſatilla.*

Notæ ſunt ſemina cincinnata, plumulis longis adhærentibus flores hexapetali. R. Meth. A. p. 69.

Pulſatilla, *Offic. Chab.* Vulgaris, *Ger.* Danica; *Park. parad.* Folio craſſiore & majore Flore, *C. B.* Purpurea cœruleâve, *J. B.* Paſque-flower. In hortis colitur. Aprili floret. *Uſu* Herba. *Vires.* Cum Anemone viribus convenit.

SECTI-

SECTIO XIV.

De Herbis Pomiferis.

I. *De Granadilla ſeu Contrayerva.*

Pag. 257. lin. 5. ſubjunge,

IN priore meo Libro *Muntingium* ſecutus *Contrayervam, Offic.* pro radice cujuſdam *Granadillæ* Speciei exhibui. Verum plantam à *P. Camello* eo nomine deſcriptam cùm non ſit ramoſa (ſi modò vera *Contrayerva* ei cognita fuerit) ad hanc Tribum minimè pertinere conſtat. Nihilominùs Deſcriptio ejus adeò imperfecta eſt, ut ad quamnam referenda ſit indè expiſcari nequeam.

Pag. 261. pro Cap. IX. adde,

IX. *De Momordica.*

Notæ ſunt, fructus verrucoſis tuberculis exaſperatus minimus, carne pauca, unica intus cavitate, quæ ſponte aperitur, & ſemina continet calyptra ſeu pileolo quodam involuta, plerumque cre-

nata

ata; flores ad centrum uſque in quinque lacinias aduntur. R. Meth. A. p. 71.

Momordica & Balſamina, *Offic.* Momordica, *Schrod. Herm. Cat.* Officinarum, *Volck.* Vulgaris, *Bot. T. Inſt.* Momordica, Balſamina, Cucumeraria, Pomum mirabile, *Chab.* Balſamina mas, *Ger. Park.* Rotundifolia repens ſeu mas, *C. B.* Cucumerina Indica, folio integro, fructu variegato *Commel. in. not.* Cucumeraria, Momordica, & Charantia, Balſamina mas, *Munt.* Cucumeraria, *C. B.* Cucumis puniceus Cordi, *H. Ox.* Baliaducca-Piri, *H. M. T.* 8. **Male Balſam Apple.** In hortis colitur. Auguſto florer. *Uſu.* Fructus *Vires.* Refrigerat parùmque ſiccat, vulneraria eſt, dolores ac præſertim hæmorrhoidum mitigat. Exinſecùs ſauciatis confert nervis, Herniæ, ambuſtis, &c. *Schrod.* Balſamum ex fructu hujus plantæ oleo inſolatæ per longum tempus factum: valet optimè in vulneribus, ulceribus, maximè hæmorrhoidibus, matricis ulceribus, rupturis, &c. *Pharm. Bat.*

Antequàm *C. Bauhinus* pinacem ſuum ediderat duos tantùm novi Botanices ſcriptores qui *Momordicæ* nomen meminerunt: Poſt eum *Schroderus*, *Chabræus*, D. *Hermannus*, D. *Volckamerus* & D. *Tournefortius* ejus mentionem fecerunt, nemo tamen eorum eo nomine *Balſaminam fœminam* intelligit, ſed omnes hanc plantam; neque quiſquam Botanices Autor aut auditus mihi aut cogitus eam unquam ita appellat, neque vires ab ipſo D. *Bates* Balſamo Momordicæ attributæ hujus viribus diſconveniunt.

SECTIO XV.

De Herbis Bacciferis.

I. *De Chamæmoro.*

NOtæ hujus, flos pentapetalos, fructus è pluribus acinis arctè ſtipatis, mora rubi æmulantibus compoſitus. R. Meth. A. p. 72.

A. 1. Chamæmorus, *Offic. Ger.* Vaccinia nubis *ejuſd.* Anglica, *Park.* Cambro-Britannica ſive Lancaſtrenſe Vaccinium nubis, *ejuſd.* Chamærubus folio Ribes Anglica, *C. B.* Rubo Idæo minori affinis Chamæmorus, *J. B. Chab.* Rubus Alpinus humilis Anglicus, Vaccinia nubis (*i.e.*) Cloud-Berries vulgò dictus, *P. Al.* An Chamæmorus Norwagicus, *Park.* Norwagicus Cluſii *J. B.* Chamærubus folio Ribes, *C. B.* Cloud-Berries. In ſummis Angliæ Alpibus reperitur Julio & Auguſto fructum maturum edit. *Uſus* Fructus. *Vires.* In ſcorbuto multum laudat *Hoierus.*

A. 2. Chamærubus, *Offic.* Saxatilis, *C. B.* Rubus ſaxatilis, *Ger.* Alpinus ſaxatilis, *Park.* Tricoccos, *ejuſd.* Alpinus humilis, *J. B. Chab.* Alpinus humilis Geſneri, *El. Bot.* Strone-Bramble. Montium altiorum incola eſt. Junio floret. *Uſus* Baccæ. *Vires.* Cum Rubo Idæo viribus convenit.

I

II. *De Smilace aſpera.*

Pag. 265. pro 2da Specie adde,

2. SMilax aſpera, *Offic. Ger. J. B. Chab.* Aſpera fructu rubro, *Park.* Aſpera fructu rubente, *C. B.* Rough Bind-Weed. In hortis colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Folia, viticuli, baccæ. *Vires.* Noxios humores per ſudorem & tranſpirationem evacuat, cutis vitia expurgat, venena arcet, articulorum dolores ſedat. Succedaneum eſt Sarſaparillæ.

Pag. 268. lin. ult. adde,

IX. *De Monophyllo.*

Cujus notæ floſculi tetrapetali ſtellati, ſpicatim digeſti, folia è terra exorta (duo enim, vel tria in caule ſunt) ſingularia, baccæ rubræ, ut in Lilio convallium. R. Meth. A. p. 73.

Monophyllon, *Offic. Ger.* ſive Unifolium, *Park.* Unifolium, ſive Ophrys unifolia, *J. B. Chab.* Lilium convallium minus, *C. B.* Smilax unifolia humillima, *El. Bot.* One-Blade. In ſylvis & dumetis. Maio & Junio floret. *Uſu.* Flos. *Vires.* Cum Lilio convallium viribus convenit.

Pag. 270. lin. 2da. ſubjunge,

XII. *De Impecacuanha.*

Flos & baccæ ſunt racemoſæ, unde ab Herba Paris differt.

Ipecacuanha, *Offic. Pomet. Piſ. Act. Philoſ. Lond. N.* 238. Ipepocoanha, *Marl. ob.* Hypocacuanha, *Bagl. Prax.* Ipecacoanna Braſilienſibus, *Marg.* Igpecaya ſive Pygaya *Laet. Purch. Pilg. Vol.* 4. Herba Paris Braſiliana polycoccos, *R. H. p.* 669. Periclymenum parvum Braſilianum Alexipharmacum, *P. Al.* Periclymeno accedens planta Braſiliana, Floſculis congeſtis albis, *H. Ox.* Brazilian-Root. Ex Braſilia exportatur. *Uſu.* Radix parva, tenuis, nodoſa, foris fuſca, intùs ferè buxei coloris, ſapore amaricante. *Vires.* In Fluore albo multum valet. Specificum eſt, ac fermè infallibile remedium in Fluxibus Dyſentericis, aliis Hæmorrhagiis ſanguineis, colliquationibus humorum, &c. *Baglio.* Infuſa vel in pulvere ſumpta per vomitum & ſeceſſum purgat, & non ſolum in Dyſenteria, ſed etiam in affectibus ventriculi datur cum ſucceſſu.

XII. *De Solano.*

P. 270. pro 3a & 4ta Speciebus Solani ſubjunge,

3. AMomum Plinii, *Offic. Ger. Herm. Cat.* Solanum fructicoſum bacciferum, *C. B.* Fruticoſum Americanum, dictum Amomum

Amomum Plinii, *Park.* Strychnodendros, *J. B.* Apollinaris Solani ſpecies ex Apennino; Strychnodendros; Solanum arboreſcens, *Chab.* Tree-Night-Shade. In Inſula Madera ſponte oritur. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Cum Solano viribus convenit.

4. Battata Virginiana, *Offic. Ger. Park.* Papas Americanum, *J. B.* Americanum, Pycnocomum Opanank Inſulæ Virginiæ radix: Chunno, *Chab.* Solanum tuberoſum eſculentum, *C. B.* Virginia-Potatoes. In Virginia ſponte oritur, apud nos in hortis colitur. Junio & Julio floret. *Uſu.* Radix. In Culinis, in Officinis nunquam. *Vires.* Cum Battata Hiſpanica viribus convenire creditur.

XIV. *De Lycoperſico.*

A Solano fructu in plures cellulas diviſo differt. Floris figurâ convenit. R. Meth. A. p. 74.

Pag. ead. lin. ult. ſubjunge,

XV. *De Melongena.*

A Solano differt quod fructus ejus ſolidus ſit carnoſus & ſine cavitate, cum Solano, mollis ſit, cavus, ſuccolentus. R. Meth. A.

Mala inſana, *Offic. Ger.* Inſana Syriaca, *Park.* Malum inſanum folio non ſpinoſo, *Munt.* Solanum pomiferum fructu oblongo, *C. B.* Pomiferum fructu rotundo, *J. B.* Melongena fructu oblongo, *El. Bot.* Arabum, Melanzana: Sola-

num pomiferum, *Chab.* Belingela, *Piſ.* Luſitanis Melongela Latinis: Tongu Angolenſibus, Macumba Congenſibus, *Marck.* Mad-Apples. In hortis apud nos colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Cum cucumere viribus convenit, ut nociva ac prava alimenta æſtimatur.

Pag. 271. lin. 14. ſubjunge,

XVII. *De Bella Donna.*

Flores habet campaniformes, cancavos & tubuloſos, margine in quinque ſegmenta acuta diviſo; fructus major, duas cellas diviſus, malignus & venenatus. R. Meth. A. p. 74.

A. Solanum lethale, *Offic. Ger. Park.* Melanoceraſus, *C. B.* Manicum, *Chab.* Manicum multis ſeu Bella donna, *J. B.* Furioſum, luridè purpureo Flore calathoide, melanoceraſus, *P. Al.* Coſmeticum, *Hofman.* Solano congener Flore campanulato vulgatius, latioribus foliis, *H. Ox.* Bella donna Cluſii, *El. Bot.* Donna, majoribus foliis & floribus, *T. Inſt.* Deadly Night-Shade. In locis ruderatis & ad ſemitas. Junio & Julio florer. *Uſu.* Folia. *Vires.* Recentia mammis impoſita, earum duritias & tumores emolliunt, diſcutiunt & ſanant etiam cancroſus, *R. H.* Intùs ſumpta, maligna eſt & lethalis planta.

XVIII

XVIII. *De Halicacabo.*

Pag. ead. lin. ult. junge,

MOrbo articulari efficacius esse creditur.
2. Solanum somniferum, *Offic. Ger. Park.* Somniferum verticillatum, *C. B. Chab.* Somniferum antiquorum, *Alp. ex.* Verticillatum, *J. B.* Verticillatum anguſtiore folio Flore ochroleuco *Ban. Cat.* Veſicarium verticillatum fructu erecto minore, *H. Ox.* Alkekengi Mexicanum, *Herv.* Fructu parvo verticillato, *El. Bot.* Peevetti, *H. M.* Sleepy-Night-Shade. In hortis Botanicorum. Julio floret. *Uſu.* Radix, Fructus. *Vires.* Radix vim habet somniferam, Opio tamen mitiorem. Fructus, urinam vehementer ciet, unde Hydropicis exhibetur. Decoctus dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus cum melle Oculorum hebetudines tollit. *Dioſc.*

XIX. *De Aſparago.*

Pag. 272. lin. ult. ſubjunge,

ASparagus ſylveſtris, *Dioſc.* Sylveſtris molli & tenuiſſimo folio, *D. Jonſ.* Prænſis, *J. B.* Sylveſtris tenuiſſimo folio, *C. B.* Wild Sparrow-Grass. Circa Monſpelium obſervatur. Sola transplantatione à ſativo differt.
2. Aſparagus petræa, & Corruda, *Offic.* Petræa ſive Corruda, *Ger.* Foliis acutis, *C. B.* Acuto folio, petræus, *Jonſ. D.* Sylveſtris foliis acutis, *Park.*

Corrudo, *J. B.* ſive Aſparagus ſylveſtris, *Chab.* Rock-Sparrow-Grass. Ad ſepes & in dumetis Italiæ, &c. frequens. Auguſto floret. *Uſu.* Turiones, Radix. *Vires.* Cum Sativo viribus convenit, cujus vice eo utuntur Monſpelienſes *Pharmacopœi.*

XX. *De Oxycocco.*

NOtæ hujus folia Serpylli, viticulæ tenues ſupinæ, floſculi tetrapetaloides, baccæ ſublongæ, locus paluſtris. R. Meth. A. r. 75.

1. Oxycoccos, *Offic.* ſive Vaccinia paluſtria, *J. B. Chab.* Oxycoccum Cordi, *Volck.* Vaccinia paluſtria, *Ger. Park.* Vitis Idæa paluſtris, *C. B.* Mooz Berries. In paluſtris, lociſque putridis. Junio floret. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Fluxus alvi vomitúmqve ſiſtit, ſitim ſedat, ventriculum corroborat, æſtum febrilem compeſcit, peſti reſiſtit.

2. Uva Gruina, *Offic.* Vitis Idæa paluſtris Virginiana fructu major, *R. H. p.* 685. Idæa paluſtris Americana, oblongis ſplendentibus foliis fructu grandiore, rubro, pluribus intùs acinis referto, *P. P. Tab.* 320. *f.* 6. Crane-Berries. Ex Nova Anglia tranſportatur. *Uſu.* Baccæ. *Vires.* Ad Scorbutum præſtare creditur. In culinis noſtris etiam reperitur.

SECT.

SECTIO XVI.

De Herbis Multiſiliquis ſeu Corniculatis.

II. *De Telephio.*

Pag. 275. pro 2da Specie Telephii adde,

A. 2. Rhodia radix, *Offic. Ger Park. C. B. J. B. Chab.* Telephium radice Roſam ſpirante, majus, *Herm. Cat.* Luteum minus, radice Roſam redolente, *H. Ox.* Anacampſeros, radice Roſam ſpirante, *El. Bot.* Radice Roſam ſpirante major, *T. Inſt.* Roſe-Wort. In montoſis reperitur. Vere floret. *Uſu.* Radix tuberoſa fragilis foris fuſca, intùs albida, odore & ſapore roſeo. *Vires.* Calfacit & ſiccat, Cephalica eſt. *Uſu.* præcipuè in dolore capitis.

III. *De Capæa.*

Notæ ſunt, Folia ſucculenta Portulacæ ſimilia. Flores ſtellati in caulibus à medio ſummum tenus.

Cepæa, *Offic. Ger.* C. *B.* J. *B. Chab.* Matthioli, *Park.* Sedum Cepæa dictum, *Herm. Cat.* annuum album, oblongo Portulacæ minoris folio, *H. Ox.* Base-Pepine. In hortis seritur. Æstate floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Folia in vino pota Urinæ stillicidio, & vesicæ scabie laborantibus opitulantur. *Dioſc.*

Pag. 276. Ad vires Illecebræ adde,

Acris est planta ac vehementer excalefaciens. Intrinsecus succus aliquo liquore extractus vomitum movet, crassos, pituitososque ac biliosos humores potenter educit, unde in febribus quartanis mi è confert. Inter antiscorbutica recensetur. Extrinsecus rubificat, vesicas excitat, ac tandem exulcerat. *Dioſc.*

Pag. ead. Ad vires Umbil. Veneris adde,

Leviter astringere, refrigerare, repercutere & abstergere asserit *Gal.* Succus inflammationibus, ignibus sacris, strumis & pernionibus illitu auxiliatur; stomachi ardorem mitigat, &c. Folia cum radice comosa calculosis prosunt & Urinam cient. *Dioſc.*

VI. *De Pæonia.*

Pag. 277. pro 4ta Pæoniæ Specie adde,

4. PÆonia Flore albicante, *Offic.* Flore pleno albicante, *Park. Parad.* Flore ex albido pleno major & minor, C. *B.* Fœmina polyanthos Flore

Flore albo, *Ger.* fœmina polyanthos, *Chab.* albo Flore pleno, ſive polyanthos alba fœmina, *J. B.* White flowered Female Peſony. In hortis reperitur. Maio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

VII. *De Helleboro nigro.*

Pag. ead. lin. ult. ſubjunge,

IN paſſione Hyſterica & affectione Hypocondriaca remedium ſpecificum & efficaciſſimum æſtimatur. *Purcel.*

A. 2. Helleboraſtrum, *Offic. Ger.* Helleboraſter minor Flore viridante, *Park.* Helleborus niger hortenſis Flore viridi, *C. B.* niger ſylveſtris ramoſus, latiore folio deciduo, *H. Ox.* Elleborus niger vulgaris Flore viridi vel herbaceo radice diuturna, *J. B. Chab.* Bears-Foot. In locis montoſis. Martio & Aprili floret. *Uſu.* Radix, Folia. *Vires.* Folia adverſus variolas alioſque morbos contagioſos (in cereviſia pota) mirè commendat D *Johnſon.* Radix eaſdem facultates cum genuino habet. Purgat inferiorem ventrem, pituitam & flavam bilem ducens, *J. B.* Hippitriaci & Pecuarii in lue jumentorum huic plurimùm confidunt; ſcilicet boum palearia, equorum cutem infra cervicem, pecudum aures ſtylo pertundunt, dein fibras radicum hujus per vulnus tranſadigunt, unde Peg-Roots dicuntur.

A. 3. Conſiligo, *Offic.* Helleboraſtrum *Pharm. Bat.* Helleboraſter maximus, *Ger.* maximus ſive Conſiligo, *Park.* Helleborus niger fœtidus, *C. B.* niger ramoſus anguſtifolius ſemper virens elatior, *H. Ox.*

H. Ox. Elleborus niger ſylveſtris adulterinus etiam hyeme virens, *J. B. Chab.* Setter-wort. In ſylvoſis ſed rarius. Februario & Martio floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Pulvis foliorum exſiccatorum pauca quantitate verminantibus pueris exhibetur, optimumque & certiſſimum remedium vulgò æſtimatur. Adnotat autem bene *Tragus* internis corporis partibus adhiberi non debere, ſed ab illo cavendum tanquam à peſtilentiſſima herba.

VIII. *De Fraxinella.*

Pag. 278. lin. 14. ſubjunge,

DUas Tragii ſpecies *Dioſcorides* memorat; verùm adeò obſcurè de iis ſcripſit; ut non leves controverſiæ inter Botanicos de earum prima indè exortæ ſint, varias plantas eo nomine appellantes. *Geſnerus* Polygonum bacciferum pro eo habet, *Dodonæus* in *Hiſtoria Gallica*, Atriplicem olidam quam Tragium Germanicum vocat; *Pona* & *Bellus* Androſæmum fœtidum, Tragium Creticum Bellonio dictum, *Lobelius* Tragium *Dioſcoridis* Fraxinellam noſtram eſſe arbitratur, in cujus opinionem & ipſe propendeo, quod nulla alia ex prædictis planta, *Lentiſco ſemine folio & rami ſimilis, ſingulis tamen minoribus*, dici poteſt.

Alterum *Dioſcoridis* Tragium *Rauwolfius* Stœchadis ſpeciem fuiſſe credidit, ut ſuo loco oſtendi.

2. Aniſum Indicum, *Offic.* Indicum ſtellatum *Ger. emac.* peregrinum, *C. B.* exoticum Philippinarum Inſularum, *Park.* Zingi fructus ſtellatus ſive Aniſum Indicum, *J. B. Chab.* Fœniculum Sinenſe

nense *Fr. Redi Exper. Nat.* Cardamomum Siberiense Patavinorum *Hort. Bosian.* Euonymo adfinis Philippinarum Insularum, Anisum spirans, nuculas in capsulis stelliformiter congestis, proferens, *P. Al.* Indian Anise, à similitudine seminum Anisi quoad odorem, & Stellate Anise, à figura capsulæ seminum stellam referente. Ex India Orientali ad nos transportatur. *Usu.* Theculæ, quæ fusci coloris sunt, singulæ singula semina coloris fusci splendentis, Lenticulæ circiter magnitudine continent.

IX. *De Abutilo.*

Foliis mollibus Althææ, floribus è foliorum alis exeuntibus Alceæ theciis bivalvibus cum solitariis in singulis seminibus ab aliis hujus generis differt. R. Meth. A. p. 77.

Abutilon, *Offic.* Dodonæi, *El. Bot.* Althæa lutea, *Ger.* Theophrasti Flore luteo, *C. B.* Theophrasti Flore luteo quibusdam Abutilon, *J. B. Chab.* lutea sive Abutilon Avicennæ putatum, *Park.* Alcea Indica, Abutilon dicta major, pericarpio membranaceo, orbiculari, compresso, vertice corniculis extùs coronato, intùs in decem aut duodecim loculamenta diviso, *P. Al.* Yellow-Mallow. In hortis seritur. Julio floret. *Usu.* Folia, Semen. *Vires.* Folia externè ulcera mundant. Semen urinam provocat, calculum expellit.

X.

X. *De Caltha Paluſtri.*

NOtæ ſunt flos Ranunculi, ſed nudus abſque perianthio, ſiliquæ radiatim diſpoſitæ, folia integra ſubrotunda. R. Meth. A. p. 78.

A. Chamæleuce, *Offic.* Caltha paluſtris, *J. B. Chab.* paluſtris major, *Ger.* paluſtris vulgaris ſimplex, *Park.* paluſtris Flore ſimplici, *C. B.* Pſeudo-Helleborus ranunculoides pratenſis rotundifolius ſimplex, *H. Ox.* Populago, *El. Bot.* Marſh-Marygold. In aquoſis. Maio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Lumborum doloribus propitia eſt. *Dioſc.*

XIV. *De Aconito,*

Pag. 280. poſt lin. 4. pro 1. & 2. Speciebus Aconiti, adde,

1. NApellus, *Offic.* verus cœruleus, *Ger.* verus Flore cœruleo, *Park.* Aconitum cœruleum ſeu Napellus primus, *C. B.* magnum Napellus, *Chab.* magnum purpureo Flore, vulgò Napellus, *J. B.* Monk's-Hood. In hortis reperitur. Julio floret. *Vires.* Facultate eſt hominibus aliiſque animalibus exitiali & perniciosa.

2. Aconitum Ponticum, *Offic.* luteum Ponticum, *Ger.* lycoctonum, *Chab.* lycoctonum luteum, *C. B.* luteum Ponticum ſerotinum Flore albido, *Park.* folio Platani, Flore luteo palleſcente. *J. B.* Wolfs-bane. In hortis colitur. Julio floret. *Vires.* Maligna eſt planta.

Hoc

Hoc eſt Aconitum alterum *Dioſcoridis*, Lycoctonum & Cynoctonum dictum: cujus cùm tres faciat ſpecies, hoc ad tertium refertur quam Ponticum vocari ait, *Foliaque habere Platani, ſed longiora, nigriora, & crebriore diviſura: caulem filicis pediculo ſimilem, nudum, cubitali altitudine: Semen verò in ſiliquis oblongis recondere, ac radicibus tandem eſſe in Squillæ marinæ modum nigreſcentibus.* Chab.

SECTIO XVII.

De Herbis flore Monopetalo vaſculiferis.

II. *De Nicotiana.*

Pag. 283. pro 2da Specie Nicotianæ adde,

2. HYoſcyamus luteus, *Offic. Ger.* Petum Anglicanum, *Pharmacol. Bat* Tobacco. Anglicum, *Park.* Nicotiana minor, *C. B.* Priapeia, quibuſdam Nicotiana minor, *J. B. Chab.* English-Tobacco. In hortis ſeritur. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Cum Hyoſcyamo viribus convenit.

Hæc planta pro Mandragora & Nicotiana Mulierculis Botanopolis Londinenſibus non rarò venditur.

III.

III. *De Gentiana.*

Pag. 284. pro 2da, 3tia & 4ta Speciebus Gentian adde,

2. GEntianella verna, *Offic.* verna major, *Ger. emac.* Alpina verna major, *Park.* Alpina anguſtifolia magno Flore, *C. B.* Alpina magno Flore, *P. Al.* Gentiana Alpina magno Flore, *J. B.* Alpina Flore magno cœruleo, Violæ Marianæ, *Chab.* quinta ſive Gentianella verna major Cluſii, *H. Ox.* Alpina pumila anguſtifolia magno Flore, *El. Bot.* Gentianel. Summis Alpium jugis ſponte reperitur, in hortis autem frequens nutritur. Aprili & Maio florer. *Uſu.* Herba. *Vires.* Amariſſimus eſt totius plantæ ſapor, idcóque jecinoris vitiis, nempe regio morbo & obſtructionibus, auxiliatur. *J. B.*

A. 3. Pneumonanthe, *Offic. Ger.* Gentianella autumnalis Pneumonanthe dicta, *Park.* Gentiana paluſtris anguſtifolia, *C. B.* anguſtifolia autumnalis major, *ejuſd.* Gentianæ ſpecies, Calathiana quibuſdam, radice perpetua ſive paluſtris, *J. B.* ſpecies paluſtris, Calathiana viola quibuſdam, *Chab.* Marſh-Gentian. In ericetis humidioribus reperitur. Autumno floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Efficax à recentioribus adverſus peſtilentes morbos habetur, & ad virulentorum animalium morſus & ictus. Alii præclaras ei vires in ſanandis pulmonum affectionibus hepatis adſcribunt. *J. B.* Gentianæ viribus convenit, multò tamen imbecillior eſt.

A.

A. 4. Gentianella autumnalis, *Offic.* fugax minor, *Ger.* autumnalis Centaureæ minoris foliis, *Park.* fugax quarta Cluſii Flore dilute purpuraſcente & cœruleo elegantiſſimo, *J. B.* fugax Cluſii, *Chab.* Gentiana brevi folio, *C. B.* Baſtard-Gentian. In montoſis cretaceis & paſcuis ſicioribus. Septembri floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Iiſdem facultatibus cum majore Gentiana pollere creditur.

Hæc planta præſtantiſſimum eſt ſtomachicum, & è gratiſſimis herbis amaris, Centaurium minus longè ſuperans, cujus loco in frequenti nunc dierum uſu eſſe incipit apud ingenioſos Medicos & Pharmacopœos *Londinenſes*.

IV. *De Convolvulo.*

Pag. ead. pro 1a, & 2a Speciebus Convolvuli adde,

A. 1. Smilax lævis, *Offic.* lævis, Convolvulus major, *Chab.* lævis ſive lenis major, *Ger.* Convolvulus major, *J. B.* major albus, *C. B. Park.* vulgaris major albus, ſeu Flore majore albo, *H. Ox.* major Flore albo, *P. B.* Great Bind-weed. Ad ſepes & in hortis. Æſtate floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Expurgat humores bilioſos acres & ſeroſos.

A. 2. Helxine ciſſampelos, *Offic.* ciſſampelos multis ſive Convolvulus minor, *J. B.* Convolvulus minor arvenſis, *C. B.* minor albus vulgaris, *Park.* minor purpureus, *ejuſd.* vulgaris Flore minore purpureo, *H. Ox.* minor, Jaſione veterum, Helxine ciſſampelos, *Chab.* Smilax lævis minor, *Ger.* Small-Bind-weed. In arvis. Junio florer. *Uſu.* Herba. *Vires.* Foliorum ſuccus potu dejicit alvum. *Diſoc.* In-

Ingenioſus & eruditus vir D. *Tournefortius*, *El. Bot. p.* 109. Jalapam Convolvuli radicem non eſſe ait, ſed cujuſdam Mirabilis Peruvianæ ſpeciei quam *Jalapam Officinarum fructu rugoſo* vocat, cujus notitiam à *P. Plumier* habuit.

Pag. 286. pro 8va Specie Convolvuli adde,

8. BAtatas, *Offic. C. B. J. B.* planta peregrina Indica Camotes, Amotes & Aies etiam dicta Cluſii, *Chab.* Battatas Occidentalis Indiæ & Inhame Orientalis Luſitanorum, *Park.* Convolvulus Indicus Batatas dictus, *R. H.* Indicus radice tuberoſa eduli, cortice rubro Batatas dictus, *P. B. P.* Indicus Orientalis Inhamæ ſeu Batatas, Siſarum Peruvianorum ſeu Battata Hiſpanorum, *H. Ox.* radice tuberoſa eſculenta, Spinachiæ folio, Flore albo, fundo purpureo, ſemine poſt ſingulos Flores ſingulo, *Cat. Jamaic.* Siſarum Peruvianum ſive Battatas Hiſpanorum, *Ger. emac.* Jetica vulgò Batata, *Piſ.* Braſilienſibus *Marg.* Kappa-kelengu, *H. M.* Spaniſh Potatoes. Utriuſque Indiæ multis in locis ſponte oritur. *Uſu.* Radix. *Virt.* Temperata eſt, & cocta vel aſſa ventrem emollit. eſtur aut cruda, aut cocta in deliciis ob ſaporis gratiam æſtimatur.

V. *De Cneoro.*

Caule non ſcandente à Convolvulo differt.

Cneoron album & Dorycnium. *Offic.* album folio Oleæ argenteo molli, *C. B. Jonſ. D.* album foliis argenteis, *Ger. emac.* album Dalechampii

champii aliis Dorycnium, *Chab.* Dorycnium Imperati, *J. B.* Creticum Alpinum, *Park.* Convolvulus major rectus Creticus argenteus, *H. Ox.* argenteus umbellatus erectus, *El. Bot. T. Inſt.* Rock-Roſe. In Candia reperitur. Julio floret. De viribus & uſu nil invenio apud Authores.

VI. *De Campanula.*

Notæ ſunt, flos campanulatus in quinque plurimum lacinias ad margines ſectus ſummo fructui inſidens, vaſculum ſeminale in terna loculamenta diviſum, ſucco lacteo ſcatere. R. Meth. A. p. 82.

A. 1. Campanula, *Offic.* radice eſculenta Flore cæruleo, *Herm. Cat.* Rapunculus, *Chab.* eſculentus, *C. B.* eſculentus vulgaris, *Park.* vulgaris campanulatus, *J. B.* Rapuntium parvum, *Ger.* Rampions. In aggeribus foſſarum Julio floret. *Uſu.* Radix in culinis, Semina in Officinis. *Vires.* Semen oculorum Fluxiones cohibet. Succus aurium dolores ſedat. *Dioſc.*

A. 2. Trachelium, *Offic.* majus, *Ger.* majus flore purpureo, *Park.* majus ſive Cervicaria, *P. B.* Campanula, Cervicaria, *Chab.* vulgatior foliis Urticæ major & aſperior, *C. B.* major & aſperior folio Urticæ *J. B.* Throat-Wort. In ſylvoſis & ad ſepes. Julio floret. *Uſu.* Folia, *Vires.* Ad anginas commendatur, etiamque in tumoribus & inflammationibus oris, &c.

3. Medium, *Offic.* Dioſcoridis Rauwolfio, *J. B. Chab.* Viola *mariana* peregrina, *Park.* mariana laciniatis foliis peregrina, *C. B.* Campanula foliis profundè inciſis, fructu duro, *T. Corol.* Syrian-Bell-

Bell-Flower. In Syria & Græcia reperitur. *Uſu.* Radix, Semen. *Vires.* Radix menſes ſiſtit, Semen menſtrua pellit. *Dioſc.*

Hanc cum *Rauwolfio Dioſcoridis* potius Medium habendum eſſe exiſtimo, quàm violam Marianam quam *Matthiolus* pro eo exhibet, quod melius convenit cum brevi illius deſcriptione à *Dioſcoride* tradita, *lib.* 4. *cap.* 18. in his verbis: *Modion in ſaxis, & opacis naſcitur, folia habet Iridis: caulem tricubitalem, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum: ſemine Cnici minuto: radicem dodrantalem, craſſitudine baculi, guſtu acerbo.*

VII. *De Viola Mariana.*

A Campanula differt fructu in quinque cellas diviſo & floris marginibus minùs profundè ſectis. R. Meth. A.

Viola Mariana, *Offic. Ger.* Mariana Flore purpureo, *Park.* Mariana Dodonæi quibuſdam Medium, *J. B. Chab.* Campanula hortenſis Folio & Flore oblongo, *C. B.* Coventry-Bells. In ſylvis & montoſis, apud nos tantùm in hortis reperitur. Æſtate floret. *Uſu.* Radix in Officinis rarò, in culinis autem inter olera. *Vires.* Refrigerat, ſiccat, parùm aſtringit.

Pag. 287. poſt lin. 8. adde,

XI. *De Pinguicula.*

NOtæ ſunt cauliculi nudi, unicum in ſummitate florem violam referentem calcari donatum geſtantes, vaſculum ſeminale bivalva ſubrotundum, folia humi ſtrata, pallida, humore pingui madentia. R. Meth. A p. 90.

A. Pinguicula, *Offic.* Geſneri, *J. B.* Geſneri, Cuculata Hiſtoriæ Lugdunenſis, *Chab.* ſeu, Sanicula Eboracenſis, *Ger. Park.* Sanicula montana flore calcari donato, *C. B.* Viola paluſtris Pinguicula vel ἰόπυγρον, dodecatheon Plinii, *H. Ox.* Butter-wort. In montoſis humidis. Maio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Vulneraria eſt planta, & ad tamices puerorum eximia. Syrupum ex ea factum purgat pituitam ſatis ſtrenuè.

Pag. eadem lin. ult. ſubjunge,

Oculorum fluxionibus & inflammationibus auxiliatur, foliis cum polenta tritis & impoſitis. Eadem cocta ſorbitionis uſu dyſenteriam ſiſtit. *Dioſc.*

XI. *De Antirrhino.*

NOtæ ſunt flos rictum exprimens, clauſus nonnullis dictus, labio ſuperiore bifido, inferiore tripartito, calcari carens. Vaſculum ſeminale in tria loculamenta diviſum vituli caput & naves referens,

referens, è tribus foraminibus ſemina fundens. R. Meth. A. p. 90.

A. Antirrhinum, *Offic.* minus, *Ger.* ſylveſtre Medium, *Park.* arvenſe majus, *C. B.* arvenſe minus, *H. Ox.* anguſtifolium ſylveſtre, *J. B.* anguſtifolium Flore rubro, *Herm. Cat.* anguſtifolium quibuſdam minus aliis, *Chab.* Snap-Dragon & Calves-Snout. In arvis arenoſis. Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* In ſuffuſionibus oculorum, & in paſſione Hyſterica à quibuſdam commendatur.

XII. *De Ariſtolochia.*

Pag. 288. lin. ult. ſubjunge,

4. Piſtolochia, *Offic. Ger.* vulgatior, *Park.* Ariſtolochia Piſtolochia dicta, *C. B.* polyrrhizos, *J. B. Chab.* Bushy rooted Birth-wort. In Italia, Gallia & Hiſpania ſponte oritur. Æſtate floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum reliquis viribus convenit.

Pag. 290. lin. ult. ſubjunge,

XVI. *De Alectoroſophe.*

Notæ flores galeati & labiati, labello tripartito florum calices ampli, & veſicularum inſtar inflati, vaſcula ſeminalia occultantes bicapſulari compreſſa aut ſubrotunda, tum in ſummo, tum in lateribus in duo foliola ſe aperientia, ſeminibus fœtis oblongis vel compreſſis. R. Meth. A. p. 91.

A. 1

A. 1. Alectorolophus, Crista galli, *Ger. Chab.* alli fœmina, *J. B.* Pedicularis sive Crista galli utea, *Park.* pratensis lutea vel Crista galli, *C. B.* ellow-Rattle. In pascuis. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* In tussi & caligine oculorum comendatur. *Park.*

A. 2. Pedicularis, *Offic. Ger.* pratensis purpurea, *B.* purpurea palustris seu pratensis vulgaris umilior, *H. Ox.* pratensis rubra vulgaris, *Park.* uibusdam Crista galli Flore rubro, *J. B. Chab.* Red-Rattle. In pratis & pascuis humidioribus. Estate floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Frigida & cca est, undè ad fistulas & sinuosa ulcera utilis. anguinis profluvium & menses sistit. Virosam culitatem habet, unde internos ejus usus conemnat *J. B.*

Pag. 291. lin. ult. adde,

XVIII. *De Melampyro.*

Notæ floris labium superius arcuatum seu fornicatum & incisum, inferius integrum, bi mutuo conjuncta : folium breve laciniatum & naliculatum, pericarpium sinu suo excipiens bivalve, quod à cuspide ad basin in duas carinas apetur, &c. *Semina triticeis similia.* R. Meth. 91.

1. Triticum vaccinum, *Offic.* Melampyrum e Triticum vaccinum, *Chab.* multis sive Tritim vaccinum, *J. B.* purpureum *Ger.* purpurante coma, *C. B.* Cratæogonum purpureum, *rk.* Cow Wheat. Inter segetes passim. Juo floret. *Usu.* Semen. *Vires.* In medicina nondum

nondum quod ſciamus uſum obtinuit cum *J. Bauhino* conſentimus, gratus autem paſtus eſt bobus & vaccis ſaginandis.

A. 2. Cratæogonum, *Offic.* album, *Ger.* vulgare, *Park.* Melampyrum luteum latifolium, *C. B.* album, Triticum vaccinum quorundam, *P. B.* ſylvaticum Flore luteo, ſive Satureia lutea ſylveſtris, *J. B.* Wild-Cow-Wheat. In ſylvis & in dumetis. Junio & Julio floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Venerem ſtimulat. *Lob.*

XIX. *De Polygala.*

Notæ ſunt flos ima parte clauſus, ſumma expanſus & in duo labia diviſus, ſuperiore bifido, inferiore plerumque fimbriato; vaſcula ſeminalia Thlaſpeos compreſſa, didyma. Fructus floris calice obtegitur è quinque foliis compoſito, quorum tria parva, duo grandia, velut alæ fructum amplectentia. R. Meth. A.

A. Polygala, *Offic. Ger.* vulgaris, *C. B.* vulgaris Officinarum, *Volck.* minor, *Park.* tetrapetala, ſiliculoſa bicapſularis, longo & anguſto folio, minor *H. Ox.* Polygalon multis, *J. B. Chab.* Flos Ambarvalis vulgo, *Herm. Cat.* Milk-Wort. In paſcuis ſiccioribus frequentiſſima. Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Ex amarore calidam & ſiccam eſſe probant; folia in vino cocta bilem per alvum dejicit. *Geſn.*

Hæc eſt Polygala, *Officinarum Angliæ* & Botanicorum plerorumque modernorum; verùm plantam illam eſſe quam hoc nomine tradit *Dioſcorides* neque deſcriptio, neque vires, ut credamus, permittunt, cùm nec folia Lentis habeat, nec ſe

cultate

cultatem augendi lac, quorum utrumque Polygalæ attribuuntur.

SECTIO XVIII.

De Herbis floribus tetrapetalis.

De Plantis flore uniformi tetrapetalo siliquosis.

Pag. 296. pro Cap. I. adde post lin. 2.

I. *De Leucoio.*

Cujus notæ, siliquæ oblongæ, compressæ, bivalves, membranâ intergerinâ in duo loculamenta, duas seminum compressorum, aliâ foliaceâ cinctorum series continentia, divisæ, flores majusculi odorati. R. Meth. A. p. 94.

Leucoium album, *Offic Ger.* simplex sativum, *Park.* incanum majus, *C. B.* hyemale & diu durans alvum, *J. B. Chab.* Stock-Gilly-Flower. In hortis colitur. Æstate floret. *Usu.* Flores. *Vires.* Ulcera oris & rimas sedis sanant, contra valvæ inflammationes valent. *Dioſc.*

Pag. ead. lin. ult. adde,

IV. *De Viola Lunaria.*

Siliquâ latâ brevi à Leucoio distinguitur cum quo seminis figura compressâ convenit. R. Meth. A. p. 93.

1. Bulbonach, *Offic.* Bolbonac vulgatissimè, *P. B.* Viola lunaria sive Bulbonach, *Ger. Park.* lunaris vulgaris, *ejusd. Parad.* lunaria major siliqua rotunda, *C. B.* Lunaria major siliqua rotundiore, *J. B.* Leucoium lunatum seu lunarium latifolium majus annuum, siliquâ rotundâ, Flore violaceo seu subcœruleo, *H. Ox.* lunatum, &c. Flore purpureo, *Herm. Cat.* Sattin or Honesty.

In montanis sylvis crescit, apud nos autem in hortis colitur. Æstate floret. *Usu.* Radix, Folia, Semina. *Vires.* Radix abstergit, mediocriter calfacit & urinam ciet, ut Rapunculus, folia calido acrique & amaro gustu sunt: Pulvis seminis amarissimi cum aqua appropriata exhibetur in Epilepsia. *Cam. Schwenckfeld.*

2. Viola lunaria, *Offic.* lunaris longioribus siliquis, *Ger.* lunaris altera sive peregrina, *Park. Parad.* lunaria major siliquâ oblongâ, *C. B.* Lunaria major, *Chab.* major siliquâ longiore, *J. B.* Leucoium majus perenne siliquâ lunatâ longâ coronatâ, *H. Ox.* Sattin Flower with longer Pods. In montibus Saleva, &c. provenit. Maio floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Quidam in Helvetia chirurgus ex contusis foliis & Sanicula parabat unguentum vulnerarium non contemnendum. *Cam.*

V.

V. *De Heſperide.*

A Leucoio differt cum ſiliquis, quæ non ut in Leucoiis compreſſæ ſunt, ſed tumidæ & ſubrotundæ; tum ſeminibus, quæ teretiuſcula & oblonga. R. Meth. A. p. 95.

Heſperis, *Offic.* hortenſis, *C. B.* Flore purpureo albo & vario, *Chab.* ſive Viola matronalis, *Park. Theat. & Parad.* Heſperides Flore purpureo albo & vario, *J. B.* Viola matronalis purpurea, *Ger.* matronalis vulgò, *Herm. Cat.* Dame-Violets. In hortis colitur. Aprili, Maio & Junio floret. *Uſu.* Herba, Semina. *Vires.* Tuſſi convulſis & difficulter ſpirantibus mederi tradit *Cluſ.* Urinas inſuper & ſudores propellere, incidere, abſtergere & digerere, *J. B.* Erucæ ut ſapore, ita facultate proxima videtur. *Dod.*

VI. *De Alliaria.*

Seminibus oblongis teretiuſculis cum Heſperide convenit, floribus parvis, foliis ſubrotundis, odore Allii ab eadem differt. R. Meth. A. p. 95.

A. Alliaria, *Offic. Ger. C. B. J. B. Park.* Heſperis Allium redolens, *H. Ox. El. Bot. Herm. Cat.* Jack by the Hedge, Sawce alone. In ſepibus. Vere floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Aperit, incidit, tenuium eſt partium. Interne urinam ciet, venenum expellit, tuſſim veterem ſanat, dolores colicos ſedat. Externè putredinem reſiſtit, unde gangrænam ulceraque putrida atque maligna ſanat.

VII. *De Braſſica.*

Pag. 297. pro 2da, 3a, 4ta & 5ta Speciebus Braſſicæ, adde,

2. BRaſſica capitata rubra, *Offic. Ger. Park. parad. C. B. J. B.* Red-Cabbage. In hortis colitur. *Uſu.* Folia. *Vires.* Decoctum hujus ſaccharo tantillo temperatum, potum horis medicinalibus egregium eſt ad promovendum materiæ purulentæ in Empyema per urinas effluxum. *Etmullerus.*

3. Caulis rubra, *Offic.* Braſſica rubra, *Ger. C. B.* rubra vulgaris, *J. B. Chab.* ſativa rubra, aperta lævis, *H. Ox.* Red-Colewoits. In hortis colitur. *Uſu.* Folia. *Vires.* Decoctum cum Saccharo ſumptum in Aſthma celebratur à *Riverio.*

4. Braſſica Sabauda, *Offic. Ger. Park.* alba capite oblongo non penitus clauſa. *C. B.* Italica tenerrima glomeroſa, Flore albo, *J. B. Chab.* Savoy-Cabbage. In hortis noſtris colitur in culinarum uſu.

5. Braſſica florida, *Offic. Ger. Park.* cauliflora, *C. B.* multiflora. *J. B. Chab.* Caulis florida, *Park. parad.* The Colliflower. In hortis etiam colitur. Æſtate floret. *Uſu.* In culinis noſtris non rarò invenitur.

VIII.

VIII. *De Turritidi.*

Foliis imis hiſpidis, quæ caules veſtiunt glabris, glaucis; ſiliquis teretibus, erectis, cauli approximantibus & ferè parellelis ab aliis hujus generis diſtinguitur. R. Meth. A p. 95.

A. Turritis, *Offic. Ger.* vulgatior, *J. B. Chab. Park.* Lobelio, *El. Bot.* Braſſica ſylveſtris hiſpida, non ramoſa, *C. B.* ſylveſtris ſive Braſſicæ affinis Turritis dicta, *P. Al.* ſylveſtris foliis integris, per terram ſtratis, & in caulibus hiſpidis, *H. Ox.* Leucoium Flore albo, ſiliquis uno verſu diſpoſitis & reflexis, *ejuſd.* Tower-Muſtard. In aggeribus arenoſis. Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Succus in ulcera oris à quibuſdam commendatur, Lumbricos necat.

IX. *De Rapo.*

Pag. ead. lin. ult. pro 2da Specie Rapæ, adde,

A. 2. Rapa ſylveſtris, *Offic. C. B.* Rapum ſylveſtre, *Ger. Herm. Cat. Chab.* ſylveſtre non bulboſum, *Park.* ſylveſtre Matthioli, *J. B.* Wild-Turnep. In arvis. Æſtate floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Additur in medicamenta quibus ad detergendam cutem in facie, totóque corpore utimur. *Dioſc.*

X. *De Napo.*

Pag. 298. poſt lin. 11. ſubjunge,

A. 2. Napus ſylveſtris, *Offic. C. B. J. B. Chab.* Napus Bunias Fuchſio, *P. B.* Bunias ſylveſtris Lobelio, *Ger.emac.* ſive Napus ſylveſtris, *Park.* Rape. Inter ſegetes & in aggeribus foſſarum. Æſtate floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Cum priore viribus convenit, quibus acrior eſt.

Ex hujus ſemine tuſo & preſſo Oleum Rape-Oyl noſtratibus dictum cum eruditiſſimo amico & vicino noſtro elici cenſemus.

3. Pſeudo-bunium, *Offic.* Napus ſylveſtris Cretica, *C. B. Park.* Candy Wild-Navew. In Inſula Creta reperitur. *Uſu.* Herba. *Vires.* Tormina atque ſtranguriam laterúmque dolores ſanat: ſtrumas diſcutit cum ſale & vino illita. *Dioſc.*

Utrum Napi dulcis an ſylveſtris ſemina in compoſitione Theriacæ Venerianæ uſurpari debeant, inter eruditos magna eſt controverſia. In Officinis noſtris prioris ſemina præſcribuntur, Græcos ſcil. ſecutis, nam *Dioſcorides* ſylveſtris alicujus ſpeciei non meminit: Et *Andromachus* ſenior qui dulcis ſemen Napi præſcribit: *Matthiolus* etiam *Epiſt. lib.* quinto ad *Balthaſarum* domeſtici Napi ſemen præſtantius contra venena quam ſylveſtrem affirmat. *Andromachus* filius enumerans ſimplicia medicamentum hoc ingredientia, ſylveſtrem ſpeciem commendat, quod ſemina ejus acriora ſint, proinde & efficaciora eſſe creduntur. Verùm *Galenus lib.* 1. *de Antidotis* a

ab utroque diſſentit, & Pſeudo-bunii ſemina in Pharmaci illius compoſitione utenda præſcribit.

XI. *De Sinapi.*

Pag. 299. poſt lin. 2. adde,

A. 2. Rapiſtrum, *Offic. Chab.* arvorum, *Ger. Park.* Flore lureo, *C. B. J. B.* Sinapi arvenſe præcox, ſemine nigro, *H. Ox.* Charlock. Inter ſegetes frequens reperitur. Æſtate floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Reſiccantem autem ac extergentem, nonnihilque digerentem facultatem obtinet, urinam provocat. *J. B.*

XII. *De Raphano.*

Pag. ead. pro 2da Specie Raphani, adde,

A. 2. Armoracia, *Offic. Schrod.* Raphanus ſylveſtris, *Ger.* Rapiſtrum album articulatum, *Park.* Flore albo ſiliquâ articulatâ, *C. B.* Flore albo, *Mer. Pin.* Flore albo Erucæ foliis, *P. B.* Flore albo ſtriato, Sinapi album agreſte Trago, *J. B.* Flore albo ſtriato, *Chab.* Raphaniſtrum Flore albo ſtriato ſiliquâ articulatâ ſtriatâ minore, *H. Ox.* Wild-Radiſh. Inter ſegetes. Junio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Calfacit & ſiccat, mucilaginem tartaream incidit, attenuat, reſolvit, viſcera aperit, diuretica, lithontriptica, & antiſcorbutica eſt. *Schrod.*

XIII. *De Eruca.*

Pag. ead. lin. ult. pro 2da Specie Erucæ, ſubjunge,

A. 2. Eruca ſylveſtris, *Offic. Ger.* ſylveſtris vulgatior, *Park.* ſylveſtris major lutea, caule aſpero, *C. B.* ſylveſtris major vulgatior fœtens, *H. Ox.* tenuifolia perennis Flore luteo, *J. B. Chab.* Wild Rocket. In muris. Junio floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Urinam vehementius pellit & multò ſativa acrior eſt. *Dioſc.*

XIV. *De Sinapiſtro.*

Pag. 300. pro 2da Specie Sinapiſtri, adde,

A. 2. Barbarea, *Offic. Ger. J. B. Chab.* Flore ſimplici, *Park.* Eruca lutea latifolia, ſive Barbarea, *C. B.* latifolia lutea ſeu Barbarea major & minor, *H. Ox.* Naſturtium hybernum quorundam, *P. B.* Siſymbrium Erucæ folio, Flore luteo, *El. Bot.* Winter-Treſſes. In muris, aggeribus, & juxta rivulos. Maio & Junio floret. *Uſu.* Herba, Semen. *Vires.* Calida & acris eſt, urinam ciet, & cum Naſturtio viribus convenit; commendatur in Scorbuto, Succus in unguentis ſordida & impura ulcera ſiccat. Semen acre eſt, diureticum & lithontripticum.

XV.

XV. *De Eryſimo.*

Pag. ead. pro prima Specie Eryſimi, adde,

A. 1. Camelina, *Offic. Ger.* ſive Myagrum alterum amarum, *Park.* Myagrum ſiliquâ longâ, *C. B.* Myagro affinis planta ſiliquis longis, *J. B.* affinis planta ſiliquis longis & Floribus parvis luteis, *Chab.* Eryſimum Galeno & Theophraſto, *R. H.* p. 811. Eruca ſylveſtris latifolia, Folio integro, Flore luteo minore, *H. Ox.* Turritis Leucoii folio, *El. Bot.* Treacle-Worm-Seed. In locis putridis nonnunquam reperitur. Junio & Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Lumbricos necat & arcet, ventriculum roborat, venenum expellit, Paralyticos & Epilepticos juvat, ulcera oris ſanat.

XVII. *De Raphaniſtro.*

Pag. 302. poſt lin. 5. pro 2da Specie Raphaniſtri, adde,

A. 2. Raphanus aquaticus, *Offic. Ger. Park.* aquaticus foliis in profundas lacinias diviſis, *C. B.* aquaticus Tabernamontani, *J. B.* aquaticus Tabernamontani Flore luteo, *Chab.* Armoracia foliis laciniatis, *Volck.* Siſymbrium aquaticum foliis in profundas lacinias diviſis, ſiliquâ breviori, *El. Bot.* Water-Radiſh. In foſſis paluſtribus. Junio & Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum priore à quibuſdam viribus convenire creditur.

De Tetrapetalis ſiliculoſis ſeu capſulatis.

XVIII. *De Myagro.*

NOtæ ſunt capſulæ tumidiores, flores lutei, ſemina ſubrotunda. R. Meth. A. p. 97.

A. Myagrum, *Offic. Ger. Chab.* ſativum, *C. B. Park.* dictum Camelina, *J. B.* majus ſativum, *H. Ox.* Seſamum Tragi & Officinarum, *Volck.* Alyſſon ſegetum foliis auriculatis acutis, *El. Bot. T. Inſt.* Gold of Pleaſure. Inter ſegetes Lini invenitur frequens. *Uſu.* Semen. *Vires.* Contuſum igne torrent, perunctiſque virgis ad lucernarum lumina utuntur. Hoc pingui, ſcabritias corporis lævigari, atque expoliri conſtat. *Dioſc.* Emplaſticam vim obtinet. *Galen.*

XIX. *De Draba.*

NOtæ generica ſunt capſulæ tumidæ & ſubrotundæ, flores albi. R. H. p. 821.

Draba, *Offic.* Dioſcoridis, *Ger.* vulgaris, *Park.* umbellata, vel Draba major capitulis donata, *C. B.* ſive Arabis, *Chab.* multis Flore albo, *J. B.* ſiliculoſa repens major, foliis magis incanis ſpanoſpermis vulgaris, *H. Ox.* Lepidium humile incanum arvenſe, *El. Bot. T. Inſt.* Arabian-Muſtard or Turkey-Treſſes. In hortis colitur. Junio floret. *Uſu.* Herba, Semen. *Vires.* Cum Pu-

Ptiſana coquitur herba in Cappadocia maximè. Semen aridum pro Pipere obſoniis admiſcetur. *Dioſc.*

XXIV. *De Thlaſpi.*

Pag. 304. 1a & 3a Speciebus Thlaſpi adde,

1. ALyſſum, *Offic.* incanum Serpylli folio minus, *El. Bot. T. Inſt.* Thlaſpi Alyſſon dictum campeſtre minus, *C. B.* Græcum, *Ger.* arvenſe minus luteum, *Park.* minus quibuſdam, aliis Alyſſon minus, *J. B.* Small Mad-wort. In glareoſis. Aprili & Maio florer. *Uſu.* Semen. *Vires.* Decoctum ſingultus ſine Febri potu diſcutit, cum melle trita vitia cutis in facie & lentigines emendat. Contuſa in edulio rabiei canis mederi putatur. *Dioſc.*

Alyſſi nomine plurimæ donantur plantæ tum à veteribus tum à recentioribus. Deſcriptione *Dioſcoridis* plantam hîc propoſitam Alyſſum eſſe exiſtimo, ut ex deſcriptione ſubnexa perſuaſus ſum non ſpeciem illam Leucoii cui *Dodonæus* & *Lobelius* id nomen attribuunt.

Alyſſon *exiguus frutex eſt, unicaulis, ſubaſper, rotundis foliis: fructu duplicium ſcutorum effigie, in quo eſt ſemen latum. In montibus & aſperis locis emicat.*

Alyſſum *Galeni* in capite de Marrubio cujus ſpecies eſt, ſuperiùs exhibui. Alyſſon *Plinii* ab utroque differt, ut quod ad ſtellatarum tribum pertinet, & Mollugo appellamus, quantum ea deſcriptione ejus colligere licet.

A. 3. Thlaſpi, *Chab.* minus *Offic.* vulgatiſſimum, *Ger.* vulgatius, *J. B.* Vaccariæ folio, *Park.* arvenſe.

arvenſe, Vaccariæ incano folio majus, *C. B.* Mithridate-Muſtard. In arvis inter ſegetes. Junio floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit.

XXII. *De Burſa paſtoris.*

Cujus notæ, capſulæ Burſæ ſeu trianguli iſoſcelis (ut loquitur D. Tournefortius*) figurâ, ſapor fatuus.* R. Meth. A. p. 99.

Pag. 305. poſt lin. 5ta, adde,

XXVI. *De Braſſica marina.*

Foliis carnoſis cæſiis cum Braſſica convenit, floribus albis, capſulis ſubrotundis monſpermis in acumen exeuntibus ab eadem differt. R. Meth. A. p. 99.

A. Braſſica ſylveſtris, *Offic.* maritima, *C. B.* marina Anglica, *Ger.* marina monoſpermos, *Park.* monoſpermos Anglica, *J. B. Chab.* maritima major repens, multiflora alba monoſpermos, *H. Ox.* Crambe maritima, Braſſicæ folio, *El. Bot. T. Inſt.* Sea-Colewort. In arenoſis maris littoribus. Julio floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Vulnera illitu conglutinat, & inflammationes, tumoreſque diſcutit. *Dioſc.*

Tres Braſſicarum ſpecies à *Dioſcoride* memorantur, ſativa, ſylveſtris & marina. Quarum duæ à nobis jamjam editæ ſunt, nimirùm Braſſica ſativa p. 297. & marina in capite de Convolvulo p. 286. Braſſica ſylveſtris quid ſit reſtat ut inquiramus

quiramus. Deſcriptio ejus apud *Dioſcoridem* adeò brevis eſt & ſuccincta, ut diſſenſionem aliquam inter Botanicos, pepererit, varias plantas pro ea ſumentes, inter quas quam hîc exhibeo. *Dioſcorideanæ*, hirſutie excepta, quam *Dioſcorides* plantæ à ſe traditæ attribuit, in noſtra autem deſideratur, notis omnibus convenit.

Pag. ead. lin. 15. ſubjunge,

XXVIII. *De Ambroſia campeſtris.*

Foliis & odore Naſturtii cum ea convenit, quamvis ſiliquis hiſpidis ſeu verrucoſis ab eodem differat. Siliquæ compreſſæ in duas cellulas dividuntur, quarum ſingulæ ſingula ſemina continent. R. Meth. A. p. 98.

A. Ambroſia campeſtris, *Offic.* campeſtris repens. *C. B.* Coronopus Ruellii, *Ger.* recta vel repens Ruellii, *Park.* Ruellii ſeu Naſturtium verrucoſum, *J. B.* Naſturtium verrucoſum, *Chab.* verrucoſum capſulâ bivalvi aſperâ ſeu hirſutâ, *H. Ox.* ſylveſtre capſulis criſtatis, *El. Bot. T. Inſt.* ſupinum capſulis verrucoſis, *R. Meth. A.* Naſturtio affinis monoſpermos capſulâ verrucoſâ, *P. Al.* Swines-Creſſes. In uliginoſis. Junio florer. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum Naſturtio viribus ut facie convenire creditur.

De

De Herbis flore tetrapetalo anomalis.

II. *De Papavere.*

Pag. 308, pro 4ta, 5ta & 7ma Speciebus Papaveris adde,

A. 4. Argemone, *Offic.* capitulo longiore glabro, *H. Ox. Mor. Prælud. R. H. p.* 856. Papaver laciniato folio, capitulo longiore glabro *R. F.* & *Synop.* erraticum, capite longissimo glabro, *El. Bot. T. Inst.* Argemone dictum capitulo longiore glabro, *Herm. Catal.* Long-headed Poppy. In aggeribus fossarum. Junio floret. *Usu.* Folia. Succus. *Vires.* Folia illitu inflammationes compescunt. Succus Argema & nubeculas expurgat. *Dioscor.*

Planta quam hîc pro Argemone exhibeo, proximè accedit, si non prorsus eadem sit cum *Dioscoridea*, cujus descriptionem subjungo. *Argemone in totum sylvestri Papaveri similis est. Folia habet Anemones, divisa: Florem puniceum, caput in cauliculo Papaveris rhœadis, oblongius; & summis partibus latum: radicem rotundam: succum croci colore, acrem dimittit.*

A. 5. Papaver corniculatum, *Offic. Chab.* corniculatum luteum, *C. B.* corniculatum luteum maritimum, *J. B. Park.* cornutum Flore luteo, *Ger.* Glaucium Flore luteo, *El. Bot. T. Inst.* Yellow-horned-Poppy. In arenosis maritimis. Junio floret. *Usu.* Semen. *Vires.* Cum præcedentibus viribus convenit.

7. Glau-

7. Glaucium, *Offic.* Argemone *Mexicana*, *El. Bot. T. Inſt.* Papaver ſpinoſum. *Ger. emac. C. B. J. B.* ſpinoſum campeſtre, *Chab.* ſpinoſum Americanum, *Park.* ſpinoſum luteum, foliis venis albis notatis, *H. Ox.* Chicallotl, *Hern.* Purging-Thiſtle. In hortis Botanicorum colitur. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Succus Glaucium dictus. *Vires.* Ad oculorum medicamenta, utpote cum inter initia refrigeret. *Dioſc.*

Quinetiam Glaucium ſuccus eſt à *Dioſcoride* memoratus, verum è quanam planta emanat vel exprimitur, inter Botanicos controvertitur. Ego ad hanc plantam præ aliis cum *C. Bauhino* referendum puto, *Dioſcoridis* deſcriptione, quam hîc ſubjungo, ut ita opinor inductus. *Glaucium ſuccus eſt herbæ, quæ ad* Hierapolim Syriæ *naſcitur, foliis ferè corniculati Papaveris, pinguioribus tamen, in terram ſparſis, odoris tetri guſtus amari: tota croceo ſucco madet. Folia in olla fictili, ſemifrigidis clibanis calfaciunt indigenæ, uſque dum flacceſcant: deinde contuſis ſuccum exprimunt.*

III. *De Onagra.*

Notæ ſunt ſiliquæ flores antevertentes, quæ per maturitatem quadrifariam partitæ & dehiſcentes quatuor ſeminum ſeries oſtendunt. Flores ſummis ſiliquis inſident, & integri unà cum calicibus decidunt; ſiliquæ lanigeræ ſunt. R. Synop. 181.

A. Onagra, *Offic.* Chamænerion, *Ger.* latifolium vulgare, *El. Bot. T. Inſt.* flore Delphinii, *Park.* Lyſimachia Chamænerion dicta latifolia, *C. B.* ſpecioſa, quibuſdam Onagra dicta, *Chab.* ſpecioſa, quibuſdam

quibuſdam Onagra dicta ſiliquoſa, *J. B.* Roſea Bay Willow-Herb. In montibus. Julio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Feros mitigat, & cicares facit; illitu quoque maligna ulcera mulcet. *Dioſc.*

Onagra frutex eſt, ait Dioſcorides, *arborii ſpecie, admodum magnus; folia habens Amygdalæ ſimilia, ſed latiora & Lilii foliis magis accedentia: flores Roſarum ſpecie, magnos: radicem albam, longam, quæ ſiccata odorem vini reddit.*

IV. *De Tithymalo.*

Pag. 309. lin. 3. ad vires Eſulæ majoris, adde,

E Radicibus, herbis & lacteo ſucco, unguentum efficaciſſimum adverſus ſcabiem capitis contagioſam confici poteſt; eſtque hoc ſingulare quoddam unguentum. *H. Ox.*

Pag. ead. ad vires Cataputiæ minoris, adde,

Grana 12 vel 14 tuſa vinoque pota totum corpus commovent; alvum purgant; pituitam & bilem ducunt; vomitiones potenter provocant; phlegma, choleram & melancholiam adducunt. *Trag.*

Pag. 310. lin. 9. ſubjunge,

6. Tithymalus characias, *Offic.* characias Monſpelienſium. *Ger. Park.* characias rubens peregrinus, *C. B.* amygdaloides ſeu characias, *J. B. Chab.* Eſula characias rubens, *Rivin.* Blood-Spurge.

Spurge. In Saxoſis Galliæ & Italiæ naſcitur. Martio florer. *Uſu.* Radix, folia, ſemina & ſuccus. *Vires.* Radices, folia & ſemina acrem & urentem facultatem obtinent. Succus alvum purgat vehementius. *Dioſc.*

7. Tithymalus myrtites, *Offic.* myrſinites ſive myrtites, *Chab.* myrſinites, *J. B. Park.* myrſinites latifolius, *C. B. Ger.* Eſula foliis myrti, *Rivin.* Myrtle Spurge. In Calabria & Sicilia provenit. Æſtate florer. *Uſu.* Radix, folia, ſemen, ſuccus. *Vires.* Conſimilem antedicto ſortiuntur facultatem. *Dioſc.*

A. 8. Tithymalus paralius, *Offic. J. B. Ger. Chab.* paralius ſive maritimus, *Park.* maritimus, *C. B.* Eſula marina Linariæ folio, *Rivin.* Sea-Spurge. In arenoſis maritimis. Junio floret. *Uſu.* Tota planta. *Vires.* Similes ad uſus reconditur.

9. Tithymalus cypariſſias, *Offic. C. B. Ger. J. B.* cypariſſias vulgaris, *Park.* Eſula Officinarum, *Volck.* Cypreſs-Spurge. In hortis curioſorum nonnunquam reperitur. Æſtate floret. *Uſu.* Succus. *Vires.* Eædem cum ſuperioribus.

10. Tithymalus dendroides, *Offic. J. B.* arboreus, *Park.* myrtifolius arboreus, *C. B.* myrſinites arboreſcens, *Ger.* Eſula caule craſſo, *Rivin.* Tree-Spurge. In montoſis Neapolitanis, &c. *Uſu.* Folia, ſemina, ſuccus. *Vires.* Ejuſdem effectus cum ſuperioribus habent. *Dioſc.*

11. Tithymalus platyphyllos. *Offic. Ger.* latifolius Hiſpanicus, *C. B. Park.* Broad-leaved Spurge. In Hiſpania reperitur. Æſtate floret. *Uſu.* Radix, ſuccus, folia. *Vires.* Reliqua genera, quæ ſupraſcribuntur, idem efficiunt. Piſces necat, tuſus & aquæ inſperſus. *Dioſc.*

12. Pi-

12. Pityuſa, *Offic.* Tithymalus foliis brevibus aculeatis, *C. B.* cypariſſias vulgaris, *Park.* quoad icon. Pine-Spurge with ſharp pointed leaves. In Italia provenit. *Uſu.* Radix. *Vires.* Purgat per ſedem.

A. 13. Peplus, *Offic.* ſive Eſula rotunda, *C. B. Ger. J. B. Chab.* Eſula rotunda ſive Peplus, *Park.* folio rotundo, *Rivin.* Tithymalus parvus annuus foliis ſubrotundis non crenatis Peplus dictus, *R. Synop.* rotundis foliis non crenatis, *Herm. Cat.* annuus erectus foliis non crenatis, *H. Ox.* Petty-Spurge. In hortis. Junio floret. *Uſu.* Herba, fructus. *Vires.* Bilis, ac pituita detrahitur in hydromelite poto. Obſoniis inſperſa conturbat alvum. *Dioſc.*

A. 14. Peplis, *Offic. Ger. Park. J. B.* maritima folio obtuſo, *C. B.* Tithymalus maritimus ſupinus annuus Peplis dictus, *R. Synop.* maritimus purpurocolore, procumbens, Peplis dictus, *P. Al.* maritimus folio aurito obtuſo, *El. Bot.* maritimus, folio obtuſo, aurito, rubro perinde ac caule, *T. Inſt.* ſive Peplis maritima folio obtuſo, *H. Ox.* Purple-Sea-Spurge. In littoribus maris arenoſis. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Eaſdem cum reliquis habet.

15. Chamæſyce, *Offic. Ger. Park. C. B. J. B.* Dioſcoridis & Plinii, *Chab.* Tithymalus exiguus procumbens Chamæſyce dictus, *Herm. Cat.* minimus ruber rotundifolius procumbens, *H. Ox.* exiguus glaber, Nummulariæ folio, *El. Bot. T. Inſt.* Eſula minima Chamæſyce dicta, *Volck.* Time-Spurge. In agris & vineis Italiæ, &c. reperitur. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Alvum reſolvit, Succus ſimili effectu prodeſt. Illitus contra Scorpionis ictus auxiliatur. *Dioſc.*

16. Apios

16. Apios. *Offic. J. B.* vera, *Ger.* ſive Iſchas, *Chab.* ſive Tithymalus tuberoſus, *Park.* Tithymalus tuberoſus pyriformi radice, *C. B.* Round-knobbed-rooted Spurge. In Creta Inſula. *Uſu.* Radix. *Vires.* Purgationes movet, *Dioſc. N. B.* Tollunt humores & verrucas omnis generis.

17. Hippophaes & Hippophæſtum, *Offic. Park.* Anguillaræ & Dodonæi ſive Spina purgatrix, *J. B. Chab.* quibuſdam ἄκανθα καθαρτικὴ, *i. e.* Spina purgatrix. *C. B.* Rhamnus Catharticus Oleæ folio, *ejuſd.* Tithymalus maritimus ſpinoſus, *ejuſd.* ſpinoſus *Wheler. itin. p.* 307. maritimus Creticus ſpinoſus, *Park.* Purging-Thorn. In Morea oritur. *Uſu.* Succus. *Vires.* Purgat per deorſum pituitoſos humores.

Ἱπποφαὲς à *Dioſcoride* ſic deſcribitur, *Frutex eſt denſus, ſurculoſus, foliis longis oleaginis proximis, anguſtioribus, mollioribus, inter quæ ſpinæ candicantes, ſiccæ, anguloſæ, floribus hederæ corymbos referentibus, racematim cohærentibus, minoribus mollibuſque & ex albido partim rubentibus: radice craſſa, molli, lactei ſucci plena, amara.* Ἱππόφαεσον autem ab eodem autore his verbis: *Id quod Hippophæſtum appellant, naſcitur eiſdem locis quibus Hippophaes, eſtque Spinæ fulloniæ genus, humilis herba, ſine cauliculo, ſine flore, &c.* unde clarè apparet unam & eandem ſpecie plantam eſſe, poſteriorem duntaxat juvenem antequàm excauleſcat. Quænam autem planta ſit non levis eſt controverſia, nec facilè dirimenda. *Columna* Carduum ſtellatum eo nomine appellat, dubitat etiam annon *Rhamnus Salicis folio, &c. C. B.* ità denominari debeat. *C. Bauhinus* Hippophaes *Anguillarii* ab Hippophae *Dioſcoridis* ſeparat, priorem ad Rhamnum referendam cenſeus, quàm rectè nollem determinare,

nare, nec tamen earum quamlibet genuinam esse existimo, quia nullius radices lacteum succum præbent. Scribit *Matthiolus Heronymum Amatheum* Opitergensem medicum plantam ad se attulisse, Venetiis ad eum à *Joanne Baptista Zopisso* Papiensi medico missam, quæ non modò notis omnibus *Dioscoridis* Hippophæstum referebat: sed etiam viribus, ut se experimento comperisse testatus est. Quod *Matthiolum* de ea invenienda non prorsus desperare fecit. *Parkinsonus* Tithymali speciem esse opinatur, à quo cur dissentiam rationem non video, atque idcircò non tantùm in eo capite collocavi, sed & synonyma collegi & contuli.

Pag. 311. lin. 2. subjunge,

In Præludiis Botanicis viri ingeniosi D. *Caspari Commelini* pag. 17. me reprehensum invenio, quod in capite *de Euphorbio* tres specie distinctas plantas pro unius & ejusdem Synonymis posuerim, nimirùm Schadida Calli, *H. M.* Euphorbium, *Dod.* & Tithymalum Africanum spinosum, &c. *P. P. Tab.* 231. *Fig.* 1. Ut ergò me vindicem, & reprehensioni huic minimè obnoxium ostendam, Primò observandum est, Euphorbium *Dodonæi* inter reliqua synonyma à me non recensèri: nec enim in ea tum opinione fui, uti nec adhuc sum, eam veram Euphorbii plantam esse; aliter enim non omisissem reliqua *Dodonæana* plantæ synonyma, quæ apud utrumque *Bauhinum*, *Gerardum*, *Parkinsonum*, aliosque habentur. Veruntamen minimè dubitans, quin nuperus eruditus vir & insignis Botanicus *Paulus Hermannus*, qui diu in *India orientali* vixerat, & in multis simplicibus phar-

pharmacis inveniendis felix admodum fuerat, Euphorbii veri plantam probè perſpectam haberet non admodùm ſcrupuloſus fui, ſynonymum reliquis annumerare quod ille fidenter Euphorbio Officinarum attribuit, nulla interpoſita differentia inter Euphorbium Dodonæi *Lob.* & ſuum. Cur autem D. *Commelinus Hermanni* ſynonyma omitteret, quæ ego adhibui, Dodonæi afferet quod ego non dedi, capere nequeo, niſi ut communis Patriæ cauſa *Hermannum* non apertè, ſed per latera mea feriret. Quod ad D. *Plukenetii* nomen attinet dubitanter illud propoſui, unde quivis primo aſpectu facilè poſſet diſcernere, mihi de eo non ſatisfactum eſſe, *Plukenetium* duntaxat ſecutus ſum, qui annon Planta à ſe delineata cum *Hermanniano* Euphorbio eadem eſſet quæſivit.

VI. *De Ruta.*

Pag. eadem pro 2da Specie Rutæ, adde,

2. RUTA montana, *Offic. Ger.* ſylveſtris major, *C. B. Park. J. B.* ſylveſtris ſeu Ruta ſylveſtris major, *Chab.* Wild-Rue. In montoſis. Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum priori viribus convenire creditur, quâ acrior eſt.

VII.

VII. *De Plantagine.*

Pag. 312. ad vires Plantaginis anguſtifoliæ, adde;

PUlvis foliorum ad ℥i data in conſervo Roſarum rubrarum ad tertianas valdè commendatur. *Boyleus.*

Pag. ead. lin. ult. ſubjunge,

Hanc plantam pro Stella terræ *Act. Philoſoph. Londinen.* n. 187. p. 298. memorata ad Hydrophobiam canum curandam utile habeo; ob haſce rationes: 1. Quod Herba ipſa ſtellam magis refert quàm Seſamoides Salamanticum, quòd ibidem pro eâ accipitur. 2. Locis nonnullis, necnon à ſcriptoribus quibuſdam ità appellatur. 3. Plantagines in genere omnes & in ſpecie hæc herba à medicis contra morſum canis rabidi commendatur.

4. Holoſtium, *Offic.* vel Holeſtium, *Chab.* Salmanticum, *Ger. Park.* hirſutum albicans majus, *C. B.* Plantagini ſimile, *J. B.* Plantago mollis ſive Holoſtium hirſutum albicans majus, *H. Ox.* montana Holoſtium dicta tomentoſa, *P. Al.* anguſtifolia albida Dodonæi, *El. Bot.* Spaniſh Plantain. In arenoſis. Aprili & Maio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Vulneraria eſt planta. Uſus ejus præcipuè ad Hernias.

IX. *De Coride.*

Ujus notæ, flos monopetalos, perſonatus, poſterius tubulatus, anterius velut ſtabelliformis, fructus ferè globoſus, in multas partes dehiſcens, ſeminibus ratus ſubrotundis, & in ipſo calice reconditus. R. Meth. A. p. 90.

Symphytum petræum, *Offic.* petræum foliis Thymi, *C. B.* Coris cœrulea maritima, *ejuſd.* cœrulea Monſpeliaca, *Ger.* Monſpelienſium, *Park.* Monſpeſulana purpurea, *J. B. Chab.* Heath-Pine. in maritimis. Maio floret. *Uſu,* Herba. *Vires.* iccat, aſtringit, conglutinat. Vulneraria eſt lanta.

Symphyti petræi nomine permultæ donantur lantæ, *viz.* Prunella, Sanicula, Virga aurea, Coris Monſpeſſulana, Hyſſopum vulgare, Polium ulgare montanum, Trachelii & Conſolidæ ſpees aliquæ, &c. A *Dioſcoride* autem ſic deſcribitur: *Ranunculos habet Origano ſimiles, capitulis foliis veluti Thymus: totum verò lignoſum, odotum & guſtu dulce eſt, ſalivamque ciens. Radice titur longâ, ſubfulvâ, digitali craſſitudine.*

Prædicta deſcriptione diligenter perpenſa, Aures illos rectè ſentire mihimet perſuadere non oſſum, qui ſtirpem illam vel cum *Thalio* Caryhyllum ſaxatilem eſſe volunt, vel cum *Lobelio* unellæ ſpeciem, vel cum *Tabernamontano* Virgæ aureæ.

SECT.

SECTIO XIX.

De Herbis flore papilionaceo seu Leguminosis.

De Leguminosis scandentibus.

I. *De Phaseolo.*

Pag. 318. pro 2da Specie Phaseoli adde,

2. PHaseolus, *Offic.* vulgaris Italicus humilis, seu minor albus cum orbita nigricante, *J. B.* erectus, *Park.* peregrinus fructu minore albo, *Ger. emac.* minor, fructu albo, umbilico maculâ nigrâ notato, vel fructu renali parvo albo, umbilico circa hilum maculâ nigrâ insignito, *H. Ox.* minor siliquâ sursum rigente, *El. Bot.* minor siliquâ sursum rigente, fructu albo, *T. Inst.* Smilax siliquâ sursum rigente, vel Phaseolus parvus Italicus, *C. B.* Italian Kidney-Beans. In hortis seritur. Julio florer. *Usu.* Siliqua. *Vires.* Virides cibo alvum emolliunt, ad vomitiones idonei. *Dioscor.*

Hanc

Hanc *Dioſcoridis* Phaſeolum eſſe cum *Matthiolo* concludo.

2. Soia, *Offic.* Phaſeolos Japonicus ex quo Japonenſium Soia, qui intinctûs ſpecies eſt, conficitur, *Herm.* Species Phaſeoli parvi albi, è Japonia allata, è qua conficiunt condimentum Ketchup dictum, duum generum, liquidum nimirùm & ſolidum.

Hujus notitiam debemus Botanico erudito D. *Paulo Hermanno* nuper defuncto, qui eam doctiſſimo amico noſtro D. *Gulielmo Sherrard*, LL.D. communicavit, ſub titulo ſupraſcripto, unde nos habuimus.

II. *De Abro.*

Foliis alatis à Phaſeolo differt.

1. ABrus *Offic. Alp. Ægypt.* Aracus Indicus ſive Africanus, *Park.* Phaſeolus glycyrrhizites folio alato, Piſo coccineo, atrâ maculâ notato, *Cat. Jamaic.* altus major, fructu coccineo, maculâ nigrâ notato, *Comel. in not.* Indicus ruber Bontio, *R. H.* ſecundus ruber, qui Abrus Proſpero Alpino dicitur, *Bont.* ruber Abrus vocatus. *Alp.* Indicus minor ſemine coccineo nigrâ maculâ notato, *H. Ox.* arboreſcens alatus & volubilis major Orientalis fructu coccineo hilo nigro notato, *P. P. T.* 214. *F.* 5. Piſum Indicum minus coccineum *C. B.* Americanum coccineum aliis Abrus, *J. B.* Americanum coccineum vel nigrum Abrus quibuſdam, *Chab.* Glycyrrhiza Indica vulgò. *Herm. Cat.* Indica ſiliquis & ſeminibus Piſi coccineis, hilo nigro notatis, *P. B. P.*

Konni, *H. M. T.* 8. Orobus Americanus, fructu coccineo, nigrâ maculâ notato, *T. Inſt.* Angola Seeds. Ex utraque India ad nos adfertur. *Uſu.* Semina. In Officinis noſtris duæ ejus Species habentur, una magnitudine Piſi majoris ex cinereo nigricantis; altera Vicia vulgari paulò major; ambæ coloris ſunt coccinei, hilo nigro. *Vires.* Hæ valdè commendantur adverſus ophthalmium ſeu inflammationem oculorum, ad fluxos humorum à capite exſiccandos, ad nervos opticos roborandos, ſpiritus animales recreandos, cerebri caliginoſos vapores diſcutiendos, & viſum acuendum. Minores in frequenti nunc dierum uſu ſunt ad peritrachelia pro pueris.

Pag. ead. lin. ult. ſubjunge,

IV. *De Lathyro.*

Notæ, Caules membranulis ſecundum longitudinem extantibus aucti, compreſſi & anguloſi; folia ex unica tantum pinnarum mediæ coſtæ nexarum conjugatione compoſita; ſiliquis brevioribus, duabus averſa parte membranulis, ſecundum longitudinem excurrentibus alatis, ſeminibus anguloſis. R. Meth. A. p. 103.

A. Lathyrus, *Offic.* latifolius, *J. B.* Narbonenſis, *Rivin.* major latifolius, *Ger. emac.* major perennis, *Park.* major latifolia Flore majore purpureo ſpecioſior, *J. B.* major latifolia, Flore majore purpureo ſpecioſor Narbonenſis, *Chab.* Clymenum Dioſcoridis quibuſdam. Peaſe everlaſting. In ſylvis & dumetis. Æſtate floret. *Uſu.* Succus ex toto cum radice exprimitur. *Vires.* Ad Sanguinibus rejectiones, in potu efficax

eſt:

eſt: cœliacos, rubraque fœminarum profluvia, refrigerando infrænat: Sanguinem naribus erumpentem ſupprimit. Folia & ſiliquæ recentibus trita vulneribus impoſita ea ad cicatricem perducunt. *Dioſc.*

V. *De Aphaca.*

Foliis integris triangulis, ex adverſo binis, & capreolis à foliorum alis exeuntibus à Piſo & Lathyro plurimùm differt. R. Meth. A. p. 103.

A. Aphaca, *Offic. Ger. Park. El. Bot.* Lathyrus luteus annus foliis Convolvuli minoris, *H. Ox.* Vicia lutea foliis Convolvuli minoris, *C. B.* quæ Pitine Anguillaræ, latâ ſiliquâ Flore luteo, *J. B. Chab.* Yellow Vetchling. Inter ſegetes. Junio floret. *Uſu.* Semina. *Vires.* Aſtringendi vim habent: quare torrefacta ſtomachi alvique Fluxiones ſiſtunt. *Dioſc.*

VI. *De Vicia.*

Pag. 319. lin. 8va. ſubjunge,

MEdiocria, nigricantia, parum compreſſa. *Vires.* Excalfaciunt & ſiccant, mundant, abſtergunt & aſtringunt. Cum Aphaca viribus non differt herba. *Matth.*

A. 2. Aracus, & Vicia ſylveſtris, *Offic.* ſive Cracca major, *Park.* Vicia ſylveſtris, *Offic.* ſive Cracca major, *Ger.* ſemine rotundo nigro. *C. B.* ſepium folio rotundiore acuto, *ejuſd. item,* vulgaris acutiore folio, ſemine parvo nigro, *ejuſd.*

vulgaris ſylveſtris ſemine parvo & nigro frugum, *J. B.* vulgaris ſylveſtris frugum: ſemine parvo & nigro, Cracca quibuſdam, *Chab.* ſylveſtris ſemine nigro & variegato, folio acutiore, *H. Ox.* Strangle-Tare, or Wild-Vetch. In ſepibus & aggeribus, itemque inter ſegetes. Vere floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribus convenire creditur.

Pag. ead. lin. ult. ſubjunge,

Compreſſa, flavicantia. *Vires.* Oculorum aciem obtundit, ægrè concoquitur, ſtomacho incommoda eſt eumque & inteſtina inflat, alvum ſiſtit, ad nervoſa & pulmonem, & caput incommoda eſt. *Dioſc.*

De Herbis flore papilionaceo non ſcandentibus ſiliquis ſimplicibus erectis.

VIII. *De Lupino.*

Pag. 320. pro 2da Specie Lupini, adde,

2. LUpinus ſylveſtris, *Offic.* ſylveſtris Flore cœruleo, *C. B.* Flore cœruleo, *Ger.* cœruleus minor, *Park.* ſylveſtris, purpureo Flore, ſemine rotundo vario, *J. B. Chab.* ſylveſtris anguſtifolius, *H. Ox.* Wild-Luptnes. In hortis, apud nos ſeritur. Julio floret. *Uſu.* Semina, compreſſa, variegata, rotunda, plana. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

Pag.

Pag. 322. poſt lin. 13. inſere,

XII. *De Onobrychide.*

NOtæ ſunt, Flores ſpicati ſpicis denſis longiſſimis pediculis è foliorum ſinubus egreſſis, inſidentibus; ſiliquæ echinatæ ſive aculeatæ, monoſpermæ. R. Meth. A. p. 150.

A. Onobrychis, *Offic.* vulgaris, *Park.* foliis Viciæ fructu echinato major, *C. B.* major ſiliculis echinatis criſtatis in ſpicâ digeſtis, *H. Ox.* ſive Caput Gallinaceum, *Ger.* Polygalon Geſneri, *J. B.* Geſneri, Onobrychis quibuſdam, *Chab.* Cock's-head-Vetch, or Saint-Foin. In cretaceis & in pratis. Junio & Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Suapte vi, ſi trita illinatur, tubercula diſſipat: Cum vino pota ſtrangurias ſanat: illita ex oleo ſudores movet. *Dioſc.*

Quamvis planta quam hîc pro *Dioſcoridis* Onobrychide cum *Cluſio*, *Thalio*, *&c.* exhibeo, *Geſnero* Glaux dicatur, *Lobelio* Caput Gallinaceum, *Cæſalpino* Lupinus, *Dodonæo* Vicia, *Lugdunenſi*, Polygala, deſcriptio tamen ejus à *Dioſcoride* tradita his verbis; *Folia habet Lentis ferè longiora, caulem dodrantalem, florem puniceum, radicem parvam:* & à Plinio, *Folia lentis paulò longiora; florem rubentem; radicem exiguam & gracilem:* quamvis utraque brevis ſit, melius tamen convenit, huic plantæ, quam Campanulæ arvenſi ad quam eam refert *C. Bauhinus* in Pinace p. 215. Verùm non ſatis conſtat quæ herba ſit: quidam enim Rutæ ſylveſtri, alius Galegæ, alius Hedyſaro, alii aliis plantis Onobrychidis tribuunt nomen

men. Et prætereà Onobrychidem & Onopordon unam herbam esse putat *Cornarius*.

De Herbis flore papilionaceo, non scandentibus siliquis propendentibus.

Pag. eadem lin. ult. subjunge.

XV. *De Orobo.*

Cujus notæ, folia è pluribus pinnarum mediæ costæ in caudam quandam procurrenti adnexarum, conjugationibus compositæ; siliquæ tenues & teretiusculæ; semina ferè ovata. R. Meth. A. p. 104.

A. Astragalus sylvaticus, *Offic. Ger.* sylvaticus foliis oblongis glabris, *C. B.* Astragaloides sive Astragalus sylvaticus, *Chab.* sive Astragalus sylvaticus, Astragalo magno Fuchsii vel Chamæbalano leguminosæ affinis planta, *J. B.* Orobus sylvaticus nostras, siliquis propendentibus, tuberosa radice, *H. Ox.* sylvaticus foliis oblongis glabris, *El. Bot.* Lathyrus sylvestris lignosior, *Park.* Wood-Peast or Heath-Pease. In sylvosis & dumetis. Aprili floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Hujus tuberibus utuntur Scoti montani ad eosdem affectus quibus Glycyrrhiza convenit; ad quam sapore accedunt. *R. Synop.*

XVI.

XVI. *De Securidaca.*

Cujus notæ, Flores velut umbellatim diſpoſiti in ſummo pediculo; ſiliqua longa, anguſta, recta, compreſſa, oræ utrinque elatæ & internodiis quadratis compoſita, quorum unumquodque ſemen etiam quadratum includit. R. Meth. A. p. 105.

Securidaca, *Offic. Chab. Rivin:* lutea major, *C. B.* Flore luteo ſiliquâ latâ oblongâ, *J. B.* vera plurimis Floſculis lureis corymbi modo diſpoſitis, ſiliquis latis compreſſis inter granum & granum junctis, ſeminibus quadratis, *H. Ox.* Hedyſarum majus, *Ger.* majus ſive Securidaca major vera Hatchet-Vetch. Inter ſegetes calidarum regionum reperitur, apud nos in hortis colitur. Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Stomacho utile in potu. Additur in antidota. Ante coitum ſubditum, concipiendi ſpem adimit. *Dioſc.*

Securidaca à *Dioſcoride* ſic deſcribitur; *Frutex eſt foliis ciceris: ſemen ruffum in ſiliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem ſecurim æmulatur: amarum guſtu. Naſcitur in ſegetibus & hordeis.* Nullius plantæ ſemen ſcribit *Cluſius* aptius veterum Securim refert quam hujus, cujus opinioni ſubſcribo.

XVII. *De Anthyllide Leguminoſa.*

Notæ, ſiliculæ calicibus in veſiculas membranaceas intumeſcentibus occultatæ. R. Meth. A. p. 105.

A. 1. Anthyllis leguminoſa, *Offic. Ger.* leguminoſa vulgaris, *Park.* leguminoſa, Loto affinis, Vulneraria pratenſis. *H. Ox.* Loto affinis, Vulneraria pratenſis, *C. B.* Vulneraria ruſtica, *J. B.* ruſtica Anthyllis magna. Anthyllis leguminoſa, *Chab.* Kidney-Vetch, Ladies-Finger. In paſcuis cretaceis. Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Herba eſt Traumatica.

2. Anthyllis prior, *Offic.* leguminoſa marina, Bætica, vel Cretica, ſive Auricula muris Camerarii, *Park.* falcata Cretica, *ejuſd.* Loto affinis ſiliquis hirſutis circinatis, *C. B.* affinis ſiliquis hirſutis cricinatis *C. Bauhini*, *H. Ox.* affinis Anhtyllis falcata Cretica Parkinſono, *ejuſd.* Trifolium falcatum, *Alp. exot.* Auricula muris Camerarii, *J. B. Chab.* Medicago Cretica Vulnerariæ facie, *El. Bot.* Vulnerariæ facie Hiſpanica, *ejuſd.* Sea-Kidney-Vetch. In Creta, Sicilia, &c. ad maris littus. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Urinæ difficultati renibuſque plurimùm prodeſt, vulvæ pituitas emollit, cum roſaceo & lacte impoſita vulneribus medetur. *Dioſc.*

De

De Herbis flore papilionaceo non ſcandentibus, quarum ſiliquæ per maturitatem articulatim rumpuntur.

XVIII. *De Indico ſive Indigo.*

Pag. 324. lin. ult. adde,

Astragalus parvus eſt à terra frutex, foliis & ramis Ciceri ſimilis: flore purpureo, parvo; radice rotunda, Raphani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, veluti cornua inter ſe implicatas, guſtu adſtringentes. Naſcitur in ventoſis, opacis & in nivalibus.

2. Polygala vera, *Offic.* major Maſſiliotica, *C. B.* Valentina marina, *Park.* Colutea caule Geniſtæ fungoſo, *J. B. Chab.* Aſtragalus Matthioli, *Ger. emac.* Coronilla caule Geniſtæ fungoſa, *El. Bot.* Milk-Vetch. In hortis colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Pota lactis abundantiam facit. *Dioſc.*

Polygala Græcis tam vulgaris erat planta & probè cognita, ut *Dioſcorides* brevem admodùm ejus deſcriptionem dederit, undè inter Botanicos, multæ de eo exortæ ſunt controverſiæ quorum ſententias hîc non recenſebo. Quam hîc exhibeo, verum & genuinum *Dioſcoridis* Polygala eſſe videtur, quoniam ut *Matthiolus* rectè obſervat, cum deſcriptione iſtius plantæ convenit *Cacleolarius*, à quò eam accepit, lac nutri-

cibus augere ſe ſæpius expertum eſſe illum certiorem fecit, quæ hujus plantæ propria facultas eſt.

XIX. *De Ornithopodio.*

Siliquis articulatis recurvis, duabus tribuſve ſimul naſcentibus, & aviculæ pedes referentibus ab aliis differt. R. Meth. A. p. 106.

A. 1. Ornithopodium, *Offic.* radice nodoſa, *Park.* majus & minus, *ejuſd.* majus & minus, *Ger.* tuberculis nodoſa, *C. B.* majus & minus, *ejuſd.* tuberoſum Dalechampii, *J. B.* Flore flaveſcente, *ejuſd.* tuberoſum Dalechampii Flore ex albo rubeſcente, *Chab.* Avis pes, *ejuſd.* Birds-Foot. In arenoſis & glareoſis. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Calculos renum, ac veſicæ frangit & expellit. Herniæ auxiliatur.

4. Scorpioides, *Offic. Rivin.* Matthioli, *Ger.* Matthioli ſive Portulacæ folio, *Park.* Portulacæ folio, corniculis longioribus tenuioribus ac articulatis *H. Ox.* pinguifolium triphyllon corniculis articulatis intortis, *P. Al.* Portulacæ folio, *C. B.* Telephium Dioſcoridis ſeu Scorpioides ob ſiliquarum ſimilitudinem, *ejuſd.* Telephium Scorpiodes. *J. B. Chab.* Ornithopodium Portulacæ folio, *El. Bot. T. Inſt.* Scorpion-Wort. In hortis noſtris colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Excalfacit & ficcat, *Galen.* Illita Scorpionum ictibus præſentaneo eſt auxilio. *Dioſc.*

Herba

Herbæ flore Papilionaceo, ſiliquis geminatis, duplicem ſeminum ſeriem continentibus.

XX. *De Tragacantha.*

Pag. 325. lin. ult. ſubjunge,

2. POterium, *Offic.* Spina hirci minor, *Ger.* Tragacantha altera ſeu minor, Poterion fortè Dioſcoridis, *Park.* altera Poterium fortè Cluſio, *J. B. Chab.* Granatenſis foliis incanis deciduis Flore albo, *H. Ox.* Tragacanthæ affinis lanuginoſa ſive Poterium, *C. B.* Small Goats-Thorn. Granatenſi regno naſcitur. Æſtate floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Tuſæ præciſis nervis & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoque ejus nervorum affectibus prodeſt. *Dioſc.*

XXI. *De Aſtragalo.*

ATragacantha, quæ cum ſiliquâ duplici intus alveolo ſecundùm longitudinem diviſâ convenit, coſtâ mediâ cui foliola annectuntur in folium deſinente differt. Adde ſemina Seſamacea dicta quòd oſſicula ſeſamoidea referant. R. Meth. A p. 106.

1. Aſtra-

1. Astragalus, *Offic.* Dioscoridis quibusdam, *J. B. Chab.* Dioscoridis vulgò Christianæ radix, *Rauwolf.* An Astragalus Syriacus, *Ger. Park. J. B. Chab.* Syriacus hirsutus, *C. B.* argenteus, *Wheel. Itin.* The Milk-Vetch of Dioscorides. In Syria crescit. Æstate floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Alvum sistit in vino pota, urinam movet: vetustis ulceribus sicca efficaciter inspergitur: Sanguinem supprimit. *Dosc.*

Adeò brevis est & imperfecta quam tradit *Dioscorides* Astragali descriptio, ut quam plantam intelligat ad hunc usque diem dubium maneat; nonnullis uni, aliis alteri generi id nomen attribuentibus. Quicquid alii opinentur, ego ad plantam hanc *Rauwolfianam* potiùs quam ad aliam quamlibet referendam censeo, & ut Lector, judicet, *Dioscoridis* descriptionem subjungo;

Astragalus parvus est à terra frutex, foliis & ramis Ciceri similis: flore purpureo, parvo; radice rotunda, Raphani modo grandi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, veluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur in ventosis, opacis & in nivalibus.

2. Radix dulcis, *Offic.* Glycyrrhiza echinata, *Park.* echinata Dioscoridis, *Ger.* capite echinato, *C. B.* echinata Dioscoridis non repens, *J. B.* spuria echinata, *Volck.* Scythica, Glycyrrhiza, Liquiritia, *Chal.* Pseudo-glycyrrhiza, *Rivin.* Onobrychis Flore cœruleo, siliculis hirsutis seu asperis, ad imum Platani pilulæ modo junctis, *H. Ox.* Rough-headed Liquorice. In hortis colitur. Æstate floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Cum Glycyrrhiza viribus convenit. Pulvis pterygiis commodissime inspergitur. *Dosc.*

Hæc

Hæc eſt *Dioſcoridis* Glycyrrhiza, cujus loco ſi liquoſæ ſpecies in *Officinis* noſtris uſurpatur.

A. 3. Glaux, *Offic.* Dioſcoridis, *Ger.* Hiſpanica, *J. B. Chab. Rivin.* Hiſpanica Cluſii, *Park.* montana purpurea noſtras, *R. H.* & *Synop.* Aſtragalus montanus purpureus Anglicus, *T. Inſt.* ſupinus ſiliquis villoſis glomeratis, *El. Bot.* Hiſpanicus ſiliquâ epiglottidi ſimili Flore purpureo major Tornefortii, *Herm. Cat.* Ciceri ſylveſtri minori affinis ſi non idem, *C. B.* The Milk-wort of Dioſcorides. In montoſis & campeſtribus cretaceis. Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Coquitur cum hordeacea ad renovandum extincti lactis ubertatem. *Dioſc.*

Glaux *Dioſcoridis* quænam planta ſit à Botanicis etiam controvertitur; *Anguillarus, Parkinſonus* & *Alpinus* Lotum eſſe volunt. *Geſnerus* (ut antea dixi) Onobrichidem, *Turnerus* plantam ſequentem; *Dodonæus, Cordus* & *C. Bauhinus* Plantæ marinæ cujuſdam parvæ ſpeciem; *Lobelius, Gerardus* & *Cluſius* ſtirpem quam hîc exhibeo. A *Dioſcoride* ſic deſcribitur: *Glaux Cytiſo, aut lenticulæ foliis ſimilis, quæ ſuperne virent averſáque candidiora ſpectantur: ramuli à terra exiliunt quini ſenive tenues ab radice: dodrantem alti: flores violæ albæ, purpurei exeunt, minores tamen.*

A. 4. Glaux vulgaris, *Offic.* vulgaris leguminoſa ſeu Glycyrrhiza ſylveſtris, *Park.* Glycyrrhiza ſylveſtris floribus luteo-palleſcentibus, *C. B.* ſylveſtris quorundam, Fœnum Græcum ſylveſtre aliis, *Chab.* Aſtragalus luteus perennis procumbens vulgaris ſeu ſylveſtris, *H. Ox. El. Bot.* Aſtragalus Glaux leguminoſa dictus, *Volck.* Fœnum græcum ſylveſtre, ſeu Glycyrrhiza ſylveſtris quibuſdam,

J. B.

J. B. Hedyſarum Glycyrrhizatum, *Ger.* Liquorice-Vetch. In dumetis & agrorum marginibus. Julio floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit.

5. Cicer ſylveſtre, *Offic. Ger.* ſylveſtre majus, *Park.* ſylveſtre foliis oblongis hiſpidis majus, *C. B.* ſylveſtre multiflorum, *J. B.* ſylveſtre multiflorum, radice craſſa, & folliculis brevibus ventricoſis hirſutis, *Chab.* Aſtragalus luteus perennis ſiliquâ gemellâ rotundâ, veſicam referente, *H. Ox. El. bot.* Glaux altera perennis, folliculis turgidis, *R. H. p.* 935. Wild-Chiches. In agris & incultis Italiæ, &c. ſponte naſcitur. Æſtate floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Calfacit & ſiccat, abſtergit, aperit, cum Cicere viribus convenit.

Herbæ flore Papilionaceo non ſcandentes trifoliæ.

XXII. *De Trifolio.*

P. 326. poſt lin. 6. pro 1ma Specie Trifolii, adde,

1. TRifolium bituminoſum, *Offic. Ger. Rivin.* bitumen redolens, *C. B.* bituminoſum ſeu Trifolium cœruleum, aut violaceum bitumen redolens, *H. Ox.* Aſphaltites ſive bituminoſum, *Park.* Aſphaltites ſive bituminoſum odoratum & non odoratum, *J. B.* Aſphaltites ſive bituminoſum, Oxitryphyllum & Menianthes dictum, *Chab.* Stinking-Trefoil. In hortis colitur. Auguſto floret. *Uſu.* Radix, Folia, Semen. *Vires.* Semen

Semen & folia in aqua pota Pleuriticis, urinæ difficultati, Comitialibus, Hydropibus, fœminiſque affectibus auxiliantur, menſes cient. Serpentium ictus ſanant. Radix Alexipharmaca eſt. *Dioſc.*

A. 2. Trifolium purpureum, *Offic.* Phæum fuſcum luxurians quaternis, quinis & ſenis foliis, *H. Ox.* Trifoliis affine Quadrifolium phæum Lobelii, *J. B. Chab.* Lotus quadrifolia, *Ger.* Quadrifolium hortenſe album, *C. B.* fuſcum, *Park.* Purple Mort and Purple-Grass. In pratis reperitur, undè in hortis ſummo ſtudio colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Succus humores pituitoſos ex inteſtinis expellit. Oris & gutturis ulcera ſanat, morbillos & variolas arcet: pro præſentaneo remedio purpureæ puerorum febris æſtimatur.

XXIII. *De Meliloto.*

Pag. 327. pro 3a Specie Meliloti adde,

3. MElilotus verus, *Offic.* Italica, *Park.* Italica ſive Patavina, *Ger.* Italica folliculis rotundis, *C. B.* magno ſemine rotundo, rugoſo, *J. B.* magno ſemine rotundo, rugoſo, folliculis melini Meliloti vulgaris, *Chab.* lutea, ſeminis pericarpio magno rugoſo, rotundo, albo, *H. Ox.* Italian-Melilot. In Italia naſcitur apud nos tantùm in hortis ſeritur. Julio floret. *Uſu.* Herba, Flores. *Vires.* Cum Meliloto vulgari viribus convenit.

Pag.

Pag. 328. lin. ult. ſubjunge,

XXVI. *De Medica.*

Siliquâ in cochleæ formam contorta ab aliis Trifoliis diſtinguitur. R. Meth. A. p. 108.

Medica, *Offic. Chab.* ſativa, ſiliquâ contortâ magis tortili, *H. Ox.* major erectior, floribus purpuraſcentibus, *J. B.* Falcata ſativa floribus purpuraſcentibus, *Volck.* Trifolium Burgundicum, *Ger.* ſiliqua cornutâ ſive Medica, *C. B.* Fœnum Burgundiacum vulgò, *Herm. Cat.* Burgundiacum ſive Medica legitima, *Park.* Medick-Fodder. Seritur in agris. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Viride, quibus refrigeratione opus eſt, illitu ſuffragatur. *Dioſc.*

XXVII. *De Loto.*

A Reliquis leguminibus trifoliatis diſtinguitur, quòd præter folia terna in extremo pediculo, bina habeat ad ejus exortum cauli adnata, ut quodammodo pentaphyllos dici poſſit. R. Meth.

Trifolium Hæmorrhoidale, *Offic.* rectum album hirſutum valdè, *J. B. Chab.* Lotus hæmorrhoidalis major ſive Trifolium hæmorrhoidale majus, *Park.* pentaphyllos ſiliquoſus villoſus, *C. B.* incana ſive Oxytriphyllum Scribonii Largi *Ger.* πολυκάρπος & frutescens incana alba, ſiliquis curtis craſſioribus & brevioribus erectis, *H. Ox.* Pile-Treſoil. In Sicilia, Gallia, &c. ſponte reperitur. Æſtate floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* In hæmorrhoidibus commendat *Riverius.*

SEC-

SECTIO XX.

De Herbis Pentapetalis vaſculiferis.

Herbæ pentapetalæ foliis in caule ex adverſo binis.

I. *De Caryophyllo.*

Pag. 333. lin. ult. ſubjunge,

2. CAryophyllus Flore ſimplici, *Offic.* hortenſis ſimplex Flore majore, *C. B.* ſimplex major, *Ger.* Betonica coronaria ſive Caryophyllus Flore ſimplici ſativus, *J. B.* Single Pinks. In hortis à ſatione ſeminis oritur. Julio floret. *Uſu.* Flos. *Vires.* Cum priore viribus convenit, ſed mitior æſtimatur.

3. Caryophyllus ſylveſtris, *Offic.* ſylveſtris vulgaris latifolius, *C. B.* Betonica coronaria ſive Caryophyllus ſylveſtris vulgatiſſimus, *J. B.* coronaria vulgatiſſima, *Chab.* Armeria alba, *Ger.* an Armerius latifolius Flore rubro ſaturo holoſerico, *Park. parad.* Wild-Pinks. In paſcuis & incultis. Julio floret. *Uſu.* Succus. *Vires.* Cum aqua Ononidis & florem Lilii Convallii calculum atterit & comitialibus prodeſt, *J. B.*

4. Ca-

4. Caryophyllus barbatus, *Offic.* hortenſis barbatus latifolius, *C. B.* barbatus hortenſis ſimplex latifolius, *H. Ox.* Betonica coronaria latifolia petræa Flore punctulis albis notato, *J. B.* Armeria rubra latifolia, *Ger.* Armerius latifolius ſimplex, Flore rubro, *Park. parad.* Sweet Williams. In hortis colitur. Julio floret. *Uſu.* Hujus uſum introduximus Monbelgardi ad panni, *ſc.* lanei maculas tollendas ſi, (cujuſcunque generis is fuerit) hujus herba fricetur, deinde limpida aqua abluatur, *J. B.*

II. *De Lychnide.*

Pag. 335. lin. 3. ſubjunge,

3. LYchnis Coronaria, *Offic. Chab.* coronaria vulgo, *J. B.* coronaria Dioſcoridis ſativa, *C. B.* coronaria vulgaris, *Park.* coronaria rubra, *Ger.* coronaria ſativa Flore rubro, *H. Ox.* Roſe-Campion. In hortis colitur. Junio floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Bilem per alvum trahit; ictis à Scorpione ſubvenit. *Dioſc.*

A. 4. Lychnis ſylveſtris, *Offic.* ſylveſtris rubello Flore, *Ger.* ſylveſtris Flore rubro, *Park.* ſylveſtris ſive aquatica purpurea ſimplex, *C. B.* ſylveſtris minus hirſuta, Flore rubello ſimplici, *H. Ox.* Ocymoides purpureum multis, *J. B.* Red Wild-Campion. Ad ſepes. Æſtate floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

A. 5. Ocymoides, *Offic. Chab.* album multis, *J. B.* ſylveſtris, Flore albo, *Ger. Park. P. B.* ſylveſtris alba ſimplex, *C. B.* ſylveſtris hirſuta perennis alba ſimplex, *H. Ox.* Ocymaſtrum vulgò, *Herm. Cat.* Wild white-Campion. Inter ſegetes & ad ſepes. Æſtate

Æstate floret. *Usu.* Semen. *Vires.* Siccat tenuiumque est partium, *Galen.* Viperarum cæterorumque serpentium morsibus medetur. Ischiadicos juvat. *Dioſc.*

A. 6. Nigellastrum, *Offic.* Lychnis segetum major, *C. B.* hirsuta segetum major, *H. Ox.* Lychnoides segetum sive Nigellastrum, *Park.* Nigella Brunfelsii & Officinarum, *Volck.* Pseudomelanthium, *Ger. J. B. Chab.* Cockle. Inter segetes. Junio & Julio floret. *Usu.* Semen. *Vires.* Calidum & siccum est, in pesso cum melle subditum menses evocat. *Hippocrat.*

7. Vaccaria, *Offic. Ger. J. B. Chab.* Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatæ, *C. B.* segetum, Vaccaria rubra dicta, *Park.* segetum Vaccaria dicta, *H. Ox.* Cow-Basil. Inter segetes. Junio & Julio floret. *Usu.* Semen. *Vires.* Calidum est & siccum: urinam provocat.

8. Muscipula, *Offic.* viscaria sive Lychnidis species, *J. B Chab.* Lychnis viscaria sive Muscipula, *Ger.* viscosa rubra altera sylvestris, *C. B.* sylvestris rubra minor, *Park.* viscosa rubra multis foliis angustis parvis cingentibus genicula superiora, *H. Ox.* Catch-fly. Inter segetes sponte nascitur. Junio & Julio floret. *Usu.* Semen. *Vires.* Cum prioribus viribus convenire creditur.

9. Saxifraga antiquorum, *Offic.* antiquorum quibusdam, *J. B.* antiquorum quibusdam, Gypsophyton, & Symphytum petræum, *Chab.* magna Matthioli, *Ger.* major Italorum Matthioli, *Park.* Caryophyllus Saxifragus, *C. B* Lychnis minor Saxifraga, *P. Al.* The Great Saxifrage of Matthiolus. In summitate montis Lupi. Junio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Mirificè tota planta calculos comminuit & expellit. *Matth.*

Dioſ-

Dioſcorides de Saxifragra ſua tradit, *Quod frutex ſurculoſus ſit, in petræis & aſperis locis naſcens, Epithymo ſimilis.* Quæ deſcriptio adeò brevis eſt, ut multas inter Autores excitaverit controverſias, multæque ſtirpium diverſæ omninò ſpecies vel pro ea habeantur, vel eo nomine appellentur. In Officinis noſtris *Anglicanis* duo plantarum genera Saxifragæ nomine inſigniuntur próque ea uſurpantur, quarum utrumque priore volumine tradidi, *p.* 211. & 339. Verùm earum neutrum cum *Dioſcoridis* deſcriptione convenit, quamvis eædem vires illis ab Autoribus tribuantur. Hoc in loco inquirendum reſtat quænam planta Saxifraga Antiquorum fuerit. *Matthiolus* & *Lugdunenſis* Autor Satureiæ ſpeciem eſſe volunt; quæ à *C. Bauhino* eandem eſſe cenſetur cum Thymbra *S.* Juliani *Lobeliana*. *Parkinſonus* Saxifragam veram *Matthioli* & Thymbram S. Juliani *Lobelii* unam & eandem plantam nullatenùs probat, idcóque *C. Bauhinum* reprehendit quod utrumque Satureiæ ſuæ ſpicatæ Synonymam facit, & affirmat plantam illam quam ipſe vidit & guſtavit, minimè vel odore vel guſtu cum Satureia vel Thymo convenire; ſed Thymo ſuo inodore, Prod. p. 108. eandem eſſe imaginatur. *Dodonæus* & *Gerardus* Serpyllum vulgare *Dioſcoridis* Saxifragam eſſe judicant. At nec huic opinioni conſentire poteſt *Parkinſonus*, nec ſanè immeritò judicio noſtro prædictas opiniones rejeciſſet, ni ipſe interim plantæ *Matthiolanæ* nimis pertinaciter adhæſiſſet, cum potiori ratione aliam ejuſdem Autoris ad *Dioſcoridæam* potiùs accedit, quam nos idcircò pro ea habemus; de cujus admirandis viribus in calculo comminuendo & expellendo

non

non tantùm experientiâ propriâ comprobatis, ſed etiam *Calceolarii* Pharmacopœi *Veronenſis* (qui eam ſibi primò communicavit) teſtimonio confirmatis, ad *Matthiolum* ipſum Lectorem remitto.

III. *De Ciſto.*

Pag. eadem lin. ult. ſubjunge.

2. CIſtus mas, *Offic.* Ciſtus, *Chab.* mas folio rotundo hirſutiſſimo, *C. B. Jonſ. D.* mas major folio rotundiore, *J. B.* mas folio ſubrotundo, *Park.* Male Holy-Roſe or Ciſtus. In Italia & Hiſpania ſponte oritur, apud nos tantùm in hortis reperitur. Æſtate floret. *Uſu.* Folia, Flos. *Vires.* Vim habet adſtringentem, proſunt Dyſentericis & Diarrhœis, Ulceribus oris veteribus ambuſtiſque ſanant. Flores magis ſunt efficaces. *Galen.*

3. Ciſtus Hypociſtidem ferens, *Offic.* mas vulgaris, *Park.* mas cum Hypociſtide, *Ger.* mas folio oblongo incano, *C. B. Jonſ. D.* mas IV. folio oblongo albido, *J. B.* mas IV. Monſpeliacus folio oblongo albido, *Chab.* Ciſtus with the Hypociſtus. In ſaxoſis collibus & ſylvis reperitur. Æſtate floret. *Uſu.* Hypociſtis. Vide *Pharmacologiam noſt.* p. 370.

4. Ciſtus fœmina, *Offic. Ger.* fœmina vulgaris, *Park.* fœmina folio Salviæ, *C. B. Jonſ. D.* fœmina Monſpeliana Flore albo, *J. B. Chab.* Female Holy-Roſe. In hortis colitur. Æſtate floret. *Uſu.* Folia, Flos. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

Ciſtus

Ciſtus à *Dioſcoride* ſic deſcribitur: *Frutex eſt in petroſis locis naſcens, multis ramis præditus, folioſus, non altus. Folia rotunda, acerba, hirſuta. Flores velut Mali Punicæ ſed in fœmina albi.*

IV. *De Helianthemo.*

Hujus notæ, Calices ad modum floris expanſi triphylli capſulæ trigonæ, in tres carinas debiſcentes. R. Meth. A. p. 109.

A. Panax Chironium & Helianthemum, *Offic.* Chironium Matthioli, *Jonſ. D.* Chamæciſtus vulgaris Flore luteo, *ejuſd.* & *C. B. P. B.* Helianthemum vulgare, *Park.* Anglicum luteum, *Ger.* luteum Germanicum *ejuſd.* vulgare Flore luteo, *J. B. Chab.* Ciſtus humilis ſive Chamæciſtus vulgaris Flore luteo, *Herm. Cat.* humilis vulgaris Flore luteo. *P. Al. Volck.* Dwarf Sun-flower. In montibus ſiccioribus & cretaceis. Junio & Julio floret. *Uſu.* Radix, Herba. *Vires.* Pota radix Serpentum, venenis reſiſtit. Illita coma eadem præſtat. *Dioſc.*

V. *De Hyperico.*

Pag. 336. pro 2, 3 & 4 Speciebus Hyperici, adde,

A. 2. Aſcyrum, *Offic. Ger.* vulgare, *Park.* Hypericum Aſcyron dictum, *Chab.* Aſcyron dictum caule quadrangulo, *J. B.* ſeu Androſæmum, Aſcyrum dictum, caule quadrangulo, *H. Ox.* Androſæmum hirſutum, *C. B.* S. Peter's-wort. In locis aquoſis oritur. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Herba, Flos, Semen. *Vires.* Herba &

& Flores ejuſdem cum Hyperico uſus ſunt, *Lobel.* Semen ad Iſchiados efficax eſt, bilioſa per alvum purgat. *Dioſc.*

3. Coris, *Offic.* lutea, *C. B.* Matthioli, *Park. Ger.* legitima Cretica Belli, *ejuſd.* Hypericoides Coris quorundam & Coris legitima Cretica, *J. B. Chab.* Hypericum ſeu Coris legitima Ericæ ſimilis, *H. Ox.* ſaxatile tenuiſſimo & glauco folio, *El. Bot.* Ballard St. John-Wort. Inſulæ Cretæ indigena eſt. Maio floret. *Uſu.* Semen. *Vires.* Urinas menſeſque ciet: eſt & auxilio ex vino potum à Phalangio demorſis, Iſchiadicis & Ophiſthotonicis. *Dioſc.*

A. 4. Androſæmum, *Offic.* vulgare, *Park.* maximum fruteſcens, *C. B.* Hypericum maximum Androſæmum vulgare dictum, *R. Synop.* ſeu Androſæmum maximum (quaſi fruteſcens) bacciferum, *H. Ox.* Siciliana aliis Ciciliana vel Androſæmum, *J. B.* aliis Ciciliana, vel Androſæmum, tota bona quibuſdam, *Chab.* Clymenum Italorum, *Ger.* Tutſan or Park-leaves. In dumetis & ſepibus. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Folia, Flos, Semen. *Vires.* Cum Hyperico viribus convenit.

VIII. *De Alſine.*

Pag. 338. pro 2, 3, & 4. Speciebus Alſines, adde,

A. 2. Gramen Leucanthemon, *Offic. Ger. Park.* Fuchſii ſive leucanthemon, *J. B. Chab.* Caryophyllus arvenſis glaber Flore majore, *C. B.* Lychnis arvenſis glabra, Flore majore, *H. Ox.* Alſine pratenſis gramineo folio ampliore, *El. Bot.* *Inſt.* holoſtea glabra folio gramineo Flore majori

jori, *Volck.* Stitch-wort. In ſylvis, dumetis & ſepibus paſſim. Vere floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Refrigerandi & ſiccandi vi pollet. In inflammationes oculorum prodeſt.

3. Paronychia, *Offic.* Alſine-folia incana, *J. B. Chab.* Anthyllis maritima Alſines folio, *C. B.* maritima incana, *Park.* marina incana alſine-folia, *Ger.* Polygonum maritimum folio Alſines, *H. Ox.* Alſine maritima Centumgrana Cæſalpino dicta, *P. Al.* Sea-Chickweed. In maritimis & vineis. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Illita Paronychiis atque favis remedio eſt. *Dioſc.*

Herbæ flore Pentapetalo, foliis in caule, alterno aut nullo ordine poſitis.

IX. *De Portulaca.*

Pag. ead. lin. ult. ſubjunge,

2. POrtulaca ſylveſtris, *Offic. Ger. Park.* anguſtifolia ſive ſylveſtris, *C. B.* ſylveſtris minor ſive ſpontanea, *J. B. Chab.* Wild Purſlane. In vervactis & ad vias frequens. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

X. *De*

X. *De Sedo.*

Pag. 339. pro 2da Specie Sedi, adde,

A. 2. Paronychia rutaceo folio, *Offic. Ger.* foliis inciſis, *Park.* Tridactylus, *Chab.* Tridactylites tectorum Flore albo, *J. B.* Sedum tridactylites tectorum, *C. B.* ſpurium tridactylites tectorum, *Volck.* Alſine tridactylites, *Herm. Cat.* Saxifraga verna annua humilior, *El. Bot.* Rue-Whittloe-Graſs. In muris & tectis. Maio florer. *Uſu.* Herba. *Vires.* Ad Scrophulas valdè commendatur.

XI. *De Cotyledone.*

Pag. ead. lin. ult. adde,

2. UMbilicus Veneris alter, *Offic.* Veneris minor, *Ger. emac.* Cotyledon altera Matthioli, *Park. parad.* altera verſicoloribus floribus, *ejuſd. Theat.* media foliis oblongis ſerratis, *C. B.* Sanicula aizoides foliis oblongis ſerratis, *Herm. Cat.* Sedum ſerratum, *J. B. Chab.* Saxifraga Sedi folio anguſtiore ſerrato, *El. Bot.* Small-Navel-wort. In montibus Germaniæ. Æſtate florer. *Uſu.* Herba, *Vires.* Cum Sempervivo, viribus convenit.

Pag. 340. lin. 17. adde,

XIII. *De Gramine Parnaſſi.*

Notæ ſunt, Pericarpium conoides è tribus carinis compoſitum; flos in uno cauliculo unicus, ſpecioſus, albus, duum generum ſtaminibus; folia parva hederacea. R. Meth. A. p. III.

A. Gramen Parnaſſi, *Offic. Ger.* Parnaſſi vulgare, *Park.* Parnaſſi, Flore albo ſimplici, *C. B.* Parnaſſi Dodonæo, quibuſdam Hepaticus Flos, *J. B. Chab.* Ciſtus humilis, *Herm. Cat.* Humilis paluſtris, Hederæ folio, Perfoliata noſtras, *P. Al.* Pyrola rotundifolia paluſtris noſtras, Flore unico ampliore, *H. Ox.* Parnaſſia paluſtris & vulgaris, *El. Bot.* Grass of Parnassus. In paluſtribus putridis gaudet. Auguſto floret. *Uſu.* Radix, Herba, Semen. *Vires.* Succus foliorum & decoctum radicis probatiſſimum ſunt oculorum medicamentum. Semen vehementius urinam impellit: alvum vomitioneſque ſiſtit, *Dioſc.* Hepar roborat & obſtructionibus liberat, *Chab.*

Pag. 341. poſt lin. 8. adde,

XV. *De Reſeda.*

Notæ ſunt, flos hexapetalos, è foliis valdè irregularibus compoſitus; ſiliqua oblonga triangula perpetuò hians, ſex ſeminum ordines continens. R. Meth. A. p. 112.

A. 1. Reſeda, *Offic.* Plinii, *Ger.* vulgaris, *C. B.* lutea, *J. B.* Plinii quibuſdam, *Chab.* minor ſeu vulgaris, *Park.* Baſe-Rocket. In arvis cretaceis reperitur. Junio & Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Sedat dolores, inflammationes diſcutit.

2. Phyteuma, *Offic. J. B.* Monoſpelienſium, *Chab.* Reſeda Phyteuma dicta, *Herm. Cat.* minor vulgaris, *El. Bot. T. Inſt.* Reſedæ affinis Phyteuma dicta, *C. B.* affinis Phyteuma Monſpelienſium dicta, *Park.* Valeriana ſeptima, *Ger.* Small Baſe-Rocket. Circa Monſpelium provenit. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Quam ad amatoria convenire, nonnulli ſcriptum reliquerunt. *Dioſc.*

Quamvis *Dioſcorides*, ut adnotavi, plantæ ſequentis nullam deſcriptionem dederit, ideóque inter Botanicos non leves diſſenſiones de ea cauſavit: in deſcriptione tamen hujus plantæ folia Struthio ſimilia ei attribuit, unde etiam non leviorem in diverſas ſententias abeundi Autoribus occaſionem dedit. *Matthiolus* Campanulam hanc eſſe vult, *Cæſalpinus* Ranunculum; *Columna* vel Scabioſam vel Valerianam; *Honorius Bellus* Antirrhini ſpeciem, Alii Luteolam, nos verò cum *J. Bauhino* ad hanc plantam potiùs referendam cenſemus.

XVI. *De Luteola.*

A Reſeda differt capſulâ brevi, in tres carinas antequam ſemen matureſcat dehiſcente, quarum unaquæque duos ſeminum ordines continet, ut in Viola. Hæ carinæ initio conjunguntur, & vaſculum efficiunt clauſum, R. Meth. A.

A. Struthium, *Offic.* Luteola, *Ger.* herba Salicis folio, *C. B.* Cretica, *ejuſd.* vulgaris, *Park.* vulgaris Cretica, *ejuſd.* Lutea Plinii quibuſdam, *J. B. Chab.* Reſeda tinctorum Salicis folio, Luteola dicta *Herm. Cat.* Dyers-Weed. In muris & locis ruderatis. Æſtate floret. *Uſu.* Herba. Ad uſum Tinctorum feritur, colore luteo tingit. *Vires.* Nonnulli contuſum vulneribus imponunt, *R. H.* quidam ad Morbum Regium commendant. Pro Glaſto à Mulierculis Botanopolis Londinenſibus frequens venditur.

Quamvis Struthium veteribus Græcis adeò probè cognitum fuerit, ut *Dioſcorides* deſcriptione non indigere putaverit, Poſteris tamen temporibus cruditorum ingenia non parum torſit. *Cordus* pro Imperatoria eam habuit, Nonnulli, ut obſervavit *C. Bauhinus*, pro Valeriana rubra; *Fuchſius*, *Lonicerus* & *Thalius* pro Saponaria. Quorum omnium opiniones rejicit idem *C. Bauhinus*, ut & quandam Lychnidis ſpeciem pro ea ad ſe miſſam. *Lacuna*, & *Geſnerus* Luteolam vulgarem Struthium eſſe exiſtimant: quibus adverſatur *Matthiolus* Pſeudoſtruthium eam herbam appellans. *Honorius Bellus* in 2da ſua ad *Cluſium* Epiſtola Luteolam Struthium eſſe ſtatuit, cum quo & ego conſentio, atque exiſtimo à vulgari Luteola ſeparandum non eſſe, ideóque utrumque conjunxi.

XVIII.

XVIII. *De Geranio.*

Pag. 342. pro 4, 5 & 6. Speciebus Geranii, adde,

4. GEranium tuberoſum, *Offic. Ger. J. B. Chab.* tuberoſum majus, *C. B.* tuberoſum vel bulboſum, *Park.* Knotted rooted Cranes-Bill. In curioſorum hortis colitur. Junio & Julio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* In vino pota vulvæ inflammatione diſcutit. *Dioſc.*

A. 5. Geranium ſanguineum, *Offic. Ger.* ſanguineum magno Flore, *C. B.* ſanguineum ſive Hæmatodes, craſſa radice, *J. B.* ſanguineum ſive Hæmatodes, craſſa radice, Flore purpureo, *Chab.* Hæmatodes, *Park.* Bloody-Cranes-Bill. In ericetis & dumetis præſertim montoſis. Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Quocumque modo ferè exhibita, ſanguinem undecunque manantem mirum in modum compeſcit. *Trag.*

A. 6. Geranium batrachoides, *Offic. Ger.* batrachoides Flore cœruleo, *Park.* batrachoides album, & ex albo cum cœruleo colore varium, *J. B. Chab.* batrachoides, Gratia Dei Germanorum Lobelio, *C. B.* Crow foot Cranes-bill. In pratis & paſcuis humidioribus. Junio & Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Pulvis ſiccat vulneri impoſitus, non modò Sanguinis Fluxum ſtatim ſiſtit, ſed mirè & ſubitò conſolidat. *Stockerus.*

XX. *De Nigella.*

Pag. 344. pro 2da Specie Nigellæ, adde,

2. MElanthium, *Offic.* ſylveſtre, *Ger.* ſylveſtre ſive arvenſe, *J. B. Chab.* Nigella arvenſis, *Park.* arvenſis cornuta, *C. B.* Fennel-Flower. Inter ſegetes reperitur. Junio floret. Semina. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

XXI. *De Lino.*

Pag. ead. pro 2da Specie Lini, adde,

A 2. Linum catharticum, *Offic.* ſylveſtre catharticum, *Ger. emac.* pratenſe floſculis exiguis, *C. B.* minimum floſculis albis, Alſine verna glabra quorundam, *Chab.* Chamælium Cluſii Flore albo, ſive Linum ſylveſtre catharticum, *Park.* Alſine verna glabra floſculis albis, vel potiùs Linum minimum, *J. B.* Purging-Flax, or Mill-Mountain. In paſcuis ſiccioribus, montoſis & cretaceis. Junio & Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cathartica vi prædita eſt. Tertianas curat. In Arthriticis vagis commendatur.

Pag. 345. lin. 3. poſt verbum *cenſetur*, adde,

Nullibi niſi in *China* ſponte provenire *Garcias*, *Acoſta*, & *Linſchotianus* rectè conſentiunt; undè vel in navibus ad nos adfertur, vel per *Tartariam* camelis ad *Alepum*, vel aliâ viâ ad *Moſcoviam*.

Pag.

Pag. ead. lin. 10. junge,

Radix hæc *Dioſcoridi* & *Galeno* ignota fuit, undè malè quidam *Rhaponticum* eorum cum noſtro *Rhabarbaro* confundunt : Nam Rhæum *Dioſcoridis* non habet vim purgatricem, & notis veri Rhabarbari caret. *Rhabarbarum* enim ſubſtantiâ compactum eſt, ponderoſum & aridum, ſapore amarum, odore acri, colore exterius ruſeſcente, intus ex ruſſo flaveſcente [cum venis aliquot intenſioribus] ac maceratum vel manducatum tingens croceo colore. *Rhaponticum* non eſt compactum ſed rarum, non ponderoſum ſed leve, non odoratum ſimiliter Rhabarbaro. *J. le Brun.*

Ab *Abrahamo Muntingio* accuratè deſcribitur, ergo non bene affirmat *Ammanus* Rhabarbarum verum nemini deſcriptum unquam eſſe.

Herbæ Pentapetaloides vaſculiferæ.

XXIII. *De Paralyſi.*

Pag. 346. poſt lin. 13. adde,

A. 3. Herba Petri, *Offic.* Primula pratenſis inodora lutea, *Ger.* veris caulifera pallido Flore inodoro aut vix odoro, *J. B.* veris caulifera, Flore ſimplici pallido vel luteo inodoro, *Chab.* veris ſive Verbaſculum pratenſe vel ſylvaticum inodorum, *Herm. Cat. Volck.* Paralyſis altera odo-

rata Flore pallido polyanthos, *Park. parad.* Verbasculum pratense aut sylvaticum inodorum, *C. B.* Great Cowslips or Oxlips. In sylvis & dumetis. Vere floret. *Usu.* Folia. *Vires.* In Anasarca in Vino albo per noctem infusum commendat *Stockerus.*

XXIV. *De Auricula Ursi.*

A Primula differt foliis levioribus & densioribus, floris calice breviore ut florum tubi ferè nudi appareant, foliorum quorundam rudimentis in caulis vertice, è quibus florum pediculi exeunt. R. Meth. A. p. 83.

Auricula Ursi, *Offic.* Flore purpureo, *Ger. El. Bot.* Flore carneo, *Park.* Flore rubente, *Chab.* sive Primula veris Alpina Flore rubente, *J. B.* Sanicula Alpina purpurea, *C. B.* Purple-Bears Ears. In Alpibus & montosis oritur. Vere floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Herba Traumatica æstimatur. Cum Sanicula viribus convenire creditur.

XXV. *De Androsace.*

Notæ sunt vascula rotunda; calices magni, quinquifidos, expansos, flosculis in umbellam sparsos, parvos pentapetaloides; folia parva, nervosa, Plantaginea, crenata. R. Meth. A. p. 84.

Androsaces, *Offic. Chab.* annua spuria, *Ger.* Androsace Matthioli altera, *J. B.* altera major Matthioli, *Park.* vulgaris latifolia annua, *El. Bot. T. Inst.* Auriculæ ursi affinis, Androsace dicta major, *Herm. Cat.* Saniculæ affinis planta, Androsace dicta.

dicta major, *H. Ox.* Alsine affinis, Androsace dicta major, *C. B.* Summer Mabel-wort. In arenosis nascitur. Aprili floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Copiosam hydropicis urinam ciet, in vino pota; podagricis utiliter illinitur, *Dioſc.*

XXVI. *De Apocyno.*

Cujus notæ siliquæ æd singulos flores geminæ, unicapsulares, univalves, ab interiori latere per longitudinem dehiscentes, & in his semina cum propendente lanugine imbricum modo stylo nutritivo incumbentia; Succum lacteum fundere; folia in caulibus bina adversa. R. Meth. A. p. 78.

Apocynon, *Offic.* folio subrotundo, *C. B.* latifolium non repens, *Park.* folio rotundiore Flore ex albo pallescente, *J. B. Chab.* erectum fruticosum folio subrotundo glauco, *Parad. Bat.* Periploca latifolia, *Ger.* Dogs-Bane. In hortis curiosorum nonnunquam reperitur. Autumno floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Cum adipe in panis cocta; canes, lupos, vulpes, &c. enecat in cibo data. *Dioſc.*

XXX. *De Verbasco.*

Pag. 348. pro 2. & 3. Speciebus Verbasci, adde,

A. 2. Verbascum nigrum, *Offic. Ger.* nigrum vulgare, *Park.* nigrum Flore ex luteo purpurascente, *C. B.* nigrum Flore parvo apicibus purpureis, *J. B. Chab.* Black-Mullein. In aggeribus sossarum. Julio & Augusto floret. *Usu.*

Radix, Folia Flores. *Vires.* Radix aſtringit, in alvi profluvio prodeſt. [Folia & Flores] cum priore viribus convenit. *Dioſc.*

A. 3. Verbaſcum album, *Offic.* mas foliis longioribus, *Park.* Flore albo parvo, *J. B. Chab.* lychnitis Matthioli, *Ger.* lychnitis Flore albo parvo, *C. B.* Mullein with white Flowers. Secus vias variis in locis reperitur. Auguſto florer. *Uſu.* Folia. *Vires.* Cum reliquis viribus convenit.

XXXI. *De Blattaria.*

FLorum ſitus in ſpicis rarior, & foliorum color viridior, capſulæ figurâ Sphærcâ à Verbaſco differt. R. Meth. A. p. 85.

Blattaria, *Offic.* lutea, *J. B.* vulgaris lutea, *Chab.* Flore luteo, *Ger.* lutea folio oblongo laciniato, *C. B.* lutea minor ſeu vulgaris, *Park.* annua ramoſa, floribus luteis ſtaminibus purpureis, *H. Ox.* Moth-Mullein. In lutoſis aggeribus. Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum Verbaſco viribus convenire creditur.

Pag. 350. lin. 17. adde,

XXXVI. *De Valeriana Græca.*

FOliis longis pinnatis Viciæ ferè in modum, floribus amplis, deorſum nutantibus, vaſculis ſeminalibus, turbinatis, in tria loculamenta diviſis, per maturitatem in ſummitate dehiſcentibus, ſemina parva, oblonga, nigricantia continentibus, ab aliis hujus generis differt. R. Meth. A. p. 86.

A. Pole-

A. Polemonium, *Offic.* vulgare cœruleum, *El. Bot. T. Inſt.* Valeriana Græca, *Ger. Park.* Græca vilocea, *Mor. Umb.* Græca quorundam, *Chab.* Græca quorundam Flore cœruleo & albo, *J. B.* cœrulea, *C. B.* Spuria Violaceo Flore, *Volck.* Vulneraria alata Blattariæ Flore cœruleo, *H. Ox.* Greek-Valerian, Jacobs-Ladder. In ſylvis. Æſtate floret. *Uſu.* Radix, Herba. *Vires.* Radix ex vino bibitur contra venenatas beſtias ac dyſenteriam: ac ex aqua adverſus urinæ difficultatem & iſchiadem: ex aceto drachmæ pondere lienoſis. Dentium quoque dolores mitigat commanducata, *Dioſc.* Herba Vulneraria eſt inſignis.

Hæc etiam planta ab antiquis ita imperfectè deſcribitur, ut quænam ſit adhuc in tenebris lateat; nonnulli enim Valerianæ, alii Lychnidis ſpeciem ea facient. Ego peritiſſimum illum Botanicum D. *Joſephum Pitton-Tournefort*, M.D. præ aliis ſequi prætulerim, qui huic plantæ hoc nomen attribuit: & *Dioſcoridis* deſcriptionem ſubnectere:

Polemonia ramis exilibus, utrinque pinnatis: foliis paulò quàm Rutæ majoribus, ac longioribus, Calaminthæ aut Sanguinariæ proximis quibus in ſummis velut corymbi dependent nigro ſemine, &c.

XXXVII. *De Nymphæa.*

Pag. 351. lin. ult. adde,

A. 3. Morſus Ranæ, *Offic. Ger.* Nymphæa alba minima, *C. B.* alba minima ſive Morſus Ranæ, *J. B.* Frog-Bit. In aquis pigrioribus

&c.

& cœnosis. Julio floret. *Usu.* Herba. *Vires.* Cum Nymphæa alba viribus pollet.

XXXVIII. *De Faba Ægyptiaca.*

Hujus notæ, Folia & flores Nymphææ, fructus fungosus & rugosus globum dimidium cui summa pars præcisa est referens, pluribus ad viginti quatuor usque loculis distinctus, quorum unusquisque fructum glandi similem continet. R. Meth. A. p. 128.

Faba Ægyptia, *Offic. Bod. & Stapel.* Ægyptia Dioscoridis & Theophrasti cujus radix Colocassia dicebatur, *Park.* Ægyptia legitima Dioscoridis *Camel. Syllab.* sive Cyamus Ægyptia, *J. B.* Fructus valdè elegans, Faba fortè Ægyptia Dioscoridis, *ejusd.* & *Chab.* Faba Ægyptia Colocassia, *ejusd.* Fabæ Ægyptiæ affinis, *Ger.* Ægyptiacæ Dioscoridis affinis, *C. B.* Colocassia sive Faba Ægyptia veterum, *ejusd.* Nymphæa Indica Flore purpureo, *Bont.* Indica maxima, *P. B. P.* Indica Faba Ægyptia dicta Flore incarnato Nelumbo Zeilonensium, *Parad. Bat.* glandifera Indiæ paludibus gaudens, foliis umbilicatis amplis, pediculis spinosis, Flore roseo purpureo & Flore albo, *P. Al.* Madaraspatana Nasturtii Indici scutato folio solidiori venis atris, pediculo spinulis asperato, *P. P. Tab.* 207. *Fig.* 5. *Tab.* 322. *Fig.* 1. Flore suave purpurascente Japonica, *Breyn. P.* 2. Nymphææ affinis glandifera Ægyptiaca Flore pleno pulchro purpureo, *H. Ox.* affinis Malabarica, Flore amplo rosaceo, albicante colore, *Commel. in not.* affinis Malabarica, Folio & Flore amplo, colore candido, *ejusd.* Tamara, *H. M.* Bem-Tamara, *ejusd.* Nelumbo, *T. Inst.* Lien Sinarum *Ogilo Chin.*

Ægyp-

Egyptian-Bean. In Ægypto creſcit. *Uſu.* Radix. *Vires.* Adſtringendi facultatem obtinet, & Stomacho utilem: Dyſentericis cœliaciſque prodeſt. *Dioſc.*

SECTIO XXI.

De Herbis Radicibus bulboſis.

I. *De Lilio.*

Pag. 354. pro 2da Specie Lilii, adde,

2. HEmerocallis, *Offic.* Lilium aureum, *Ger. Park.* purpuro-croceum majus, *C. B.* rubens croceum majus, *J. B.* rubens vel croceum majus, Hemerocallis, *Chab.* Red-Lily. In hortis colitur. Junio & Julio floret. *Uſu.* Radix, Folia. *Vires.* Radix pota aut cum melle & lana in peſſo appoſita, aquam educit & ſanguinem. Folia trita mammarum inflammationes à partu contractas, oculorumque collectiones mitigant. Radix & Folia igne ambuſtis utiliſſimè illinuntur. *Dioſc.*

Pag. ead. poſt lin. 17. adde,

III. *De Cepaſtro.*

FOliis fiſtuloſis graveolentibus cum Cepa convenit, radicibus proliferis & caulibus non ventricoſis ab ea differt.

A. 1. Allium ſylveſtre, *Offic. Ger. emac. Park.* ſylveſtre tenuifolium Dodonæi, *Volck.* campeſtre juncifolium capitatum purpuraſcens majus, *C. B.* Sphærocephalum purpureum ſylveſtre, *J. B. Chab.* Cepa juncifolia minor, purpuraſcens, *T. Inſt.* Crow-Garlick. In arvis. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum Allio ſativo viribus convenit.

2. Cepa aſcalonica, *Offic.* aſcalonica Matthioli, *El. Bot. T. Inſt. H. Ox.* aſcalonica ſive fiſſilis, *J. B. Chab.* ſterilis, *C. B.* aſcalonica ſive aſcalonitides, *Park.* aſcalonitides, *Ger. emac.* Barren-Onions, Eſchalots. In hortis culinarum uſui colitur. *Uſu.* Radix. *Vires.* Excalfacit & ſiccat, incidit, aperit, provocat, dejicit, cibi appetentiam facit, vermes inteſtinorum necat. *Matth.*

3. Schœnopraſſum, *Offic. Ger. Park.* Porrum ſectivum juncifolium, *C. B.* ſectivum & Schœnopraſſum quorundam, *J. B. Chab.* Cepa ſectilis juncifolia perennis, *H. Ox. El. Bot.* Tibes or Chibes. In hortis etiam reperitur. *Uſu.* Folia. *Vires.* Cum Cepis viribus convenit. In culinis pro olere crudo uſurpantur.

IV.

IV. *De Allio.*

Pag. ead. lin. ult. ſubjunge,

2. Ophioſcorodon, *Offic. Ger.* Scorodopraſſum alterum bulboſo & convoluto capite, *Park.* Allii genus Ophioſcorodon, *Chab.* genus Ophioſcorodon dictum quibuſdam, *J. B.* Allium ſativum alterum ſive Alliopraſſum caulis ſummo circumvoluto, *C. B* Viper-Garlick, *Rockumbol.* In hortis colitur. Julio floret. *Uſu.* Radix, Nuclei. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit, mitior tamen eſt.

V. *De Moly.*

2. Moly, *Offic.* Dioſcorideum, *Ger. Park.* Dioſcoridis parvum quibuſdam, *J. B.* Dioſcoridis parvum quibuſdam flore candido, *Chab.* anguſtifolium umbellatum, *C. B.* Moly of Dioſcorides. In hortis colitur. Aprili floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Ad vulvæ apertiones, ſi trita cum lilio unguento in peſſo ſubjiciatur. *Dioſc.*

3. Moly Theophraſti, *Offic.* Theophraſti ſive Homeri, *Park.* Theophraſti magnum, *J. B.* Theophraſti magnum, floribus albis ſtellatis, *Chab.* Homericum, *Ger.* latifolium liliflorum *C. B.* Ornithogalum Indicum latifolium floriferum Sphæricum colore coloſſino aut albo, *H. Ox.* Moly of Theophraſtus. In hortis curioſorum non infrequens naſcitur. Junio & Julio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum præcedente viribus convenire creditur.

VI.

VI. *De Porro.*

Pag. 355. pro 2, & 3, Speciebus Porri, adde,

A. 2. Ampelopraſſum, *Offic.* Porrum vitigineum, *Ger. El. Bot.* ſylveſtre vinearum, *C. B.* Allium ſylveſtre amphicarpon, foliis porraceis, Floribus & nucleis purpureis, *R. Synop. Edit.* 2. *p.* 230. Vine-Leeks. In montibus *Weſtmorlandicis* obſervavit D. *Lawſon.* Junio floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Stamacho magis quam Porrum adverſatur; plus autem excalfacit, urinam & menſes vehementius ciet. Idem contra ſerpentium morſus convenit. *Dioſc.*

Ampelopraſſi nomine quam plantam intelligant Rei Botanicæ Autores, ab optimis & nuperrimis ſcriptioribus plurimùm dubitatur, aliis alio illud referentibus, in quam incertitudinem inducti ſunt ex eo quod *Dioſcorides* illud non deſcripſerit. Quatuor apud *C. Bauhinum* Herbarum Species invenio, quibus hoc nomen ab aliis & aliis Botanicis tribuitur, è quibus hanc quæ plura habet ſuffragia elegi.

A. 3. Scorodopraſſum, *Offic. Chab. Park.* primum Cluſii, *Ger. emac.* dictum, *J. B.* Allium Sphæriceo capite folio latiore ſive Scorodopraſſum alterum, *C. B.* maximum multis Porraceis foliis latioribus ſphæriceo capite ex Floribus albis conflato, *H. Ox.* montanum majus Anglicum Newtoni, *R. H. p.* 1125. Holmenſe ſphæriceo capite, *R. Synop. Edit.* 2. *p.* 229. Wild Leeks. In Inſula Holms. dicta copiosè provenit. Junio floret. *Uſu.* Folia. *Vires.* Allii & Porri qualitatum

ratum particeps: Unde promiſcuas ſibi vires ex utroque vendicavit.

VII. *De Narciſſo.*

Cujus notæ, Flos è vaginâ membranaceâ oritur ſummo fructui inſidens, in ſex lacinias totidem petala imitantes diviſus, callice medium occupante; nunc longiore, nunc breviore. R. Meth. A. p. 116.

A. 1. Narciſſus, *Offic.* medio-luteus, *Ger.* medio-luteus vulgaris, *Park.* pallidus circulo luteo, *C. B.* medio-luteus cum aliquot Floribus, *J. B. Chab.* Common Pale Daffadil, or Primroſe Peerleſs. In paſcuis & aggeribus, Aprili floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cocta ſive eſtur ſive bibitur vomitoria eſt: ambuſtis igni prodeſt, præciſos nervos glutinat: luxatis malleolis, diuturniſque articulorum doloribus ſubvenit. Vitia cutis in facie, vitiligineſque emaculat. Ulcerum ſordes expurgat: abſceſſus rumpit: infixa corpori trahit. *Dioſc.*

A. 2. Pſeudonarciſſus, *Offic.* Anglicus, *Ger.* Anglicus vulgaris, *Park.* Narciſſus ſylveſtris pallidus calice luteo, *C. B.* Bulbocodium, *Chab.* vulgare, *J. B.* Wild Daffadil. Circa margines agrorum Martio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

VIII.

VIII. *De Tulipa.*

Cujus notæ, Radix bulbosa tunicata; flores ampli hexapetali, nudi, in singulis caulibus naturâ singuli, erecti; caules foliis aliquot cincti. Stylus in fructum abit oblongum triangulum, in tria loculamenta binis singula seminum Liliaceorum sibi invicem superincumbentium ordinibus repleta; quo cum Lilio convenit. R. Meth. A. p. 119.

Tulipa, *Offic.* præcox lutea, *C. B.* tota lutea, *Ger.* præcox flava, *J. B. Chab.* The Tulip. In hortis reperitur. Vere floret. *Usu.* Radix. *Vires.* Eisdem viribus cum Battatis & Pastinacis latifoliis à quibusdam prædita affirmatur.

IX. *De Ornithogalo.*

Notæ, staminula florum lata spicata, quorum tria acuminata, tria bifida seu sinuata sunt. Stamina hæc capitulum seu stylum includunt arctè coeuntia, etiam explicatis foliis exterioribus. Florum petala aversâ parte lineis virentibus plerumque notata. R. Meth. A. p. 119.

A, Ornithogalon, *Offic. Chab.* vulgare, *Ger. Park.* vulgare & verius, *J. B.* umbellatum medium anguſtifolium, *C. B.* umbellatum minus candidum vulgare, *H. Ox.* Star of Bethlehem. In hortis colitur. Maio floret. *Usu.* Radix, Semen. *Vires.* Radix cruda, & cocta manditur. [Semen] coquitur cum pane ut Melanthium. *Dioſc.*

X.

X. *De Hyacintho.*

Pag. ead. pro 2da Specie Hyacinthi, adde,

2. BUlbus Vomitorius, *Offic.* Muſcari Cluſii, *Ger.* obſoletiore Flore Cluſio, *T. Inſt.* majus obſoleto Flore, *El. Bot.* Hyacinthus racemoſus moſchatus, *C. B.* racemoſus ſeu botryoides major, ſeu Muſcari majus obſoleto albo Flore *H. Ox.* botryoides major moſchatus ſive Muſcari Flore cinericeo, *Park. parad.* odoratiſſimus dictus Tibcadi & Muſcari, *J. B.* odoratiſſimus Dipcadi & Muſcari dictus, *Chab.* Musk-Grape Flower. In vicinis *Conſtantinopoli* hortis. Aprili floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Ea manſa vel decoctum potum Veſicæ malis medetur. Vomitiones movet. *Dioſc.*

Pag. 356. poſt lin. 7. adde,

XII. *De Siſyrhinchio.*

NOS à flore diſtinximus, cujus folia illa quæ ſurſum reflectuntur in Iride [bulboſa] *bifida ſunt, in Siſyrinchio integra,* R. Meth. A. p. 117.

Siſyrhinchium, *Offic.* Tiocophraſti Columnæ, *R. H. p.* 1167. minus anguſtifolium, *C. B. H. Ox.* Crocus Italicus parvo Flore radice roſtrata, *El. Bot.* Bulbocodium Crocifolium Flore parvo violaceo,

T.

T. Coroll. Spaniſh-Nut. In Cirinola ſuccrevit. *Uſu.* Radix.

XIII. *De Gladiolo.*

FOlia Gladii laminam referunt. Floris ſtructura peculiaris eſt; inferius enim tubuloſus, ſupernè in duo velut labia expanditur, quorum ſuperius ſimplex eſt & in alveum inflexum, inferius in quinque partes diviſum. Radix duplici tubere conſtat, altero alteri ſuperincumbente. R. Meth. A.

Gladiolus, *Offic.* Narbonenſis, *Park.* Italicus, *Ger.* Floribus ex uno verſu diſpoſitis major, *C. B. H. Ox.* ſive Xiphion, *J. B. Chab.* Corn-Flag. In hortis noſtris colitur. Junio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Attrahendi, diſcutiendi, & nimirùm ſiccandi vim habet. *Galen.*

XIV. *De Colchico.*

FOliis latis vaſculis ſeminalibus majoribus à Croco differt; Flores nudi, à radice ſtatim orti, abſque pediculis herbaceis, Liliaceis ſimiles. R. Meth. A. p. 116.

A. 1. Colchicum, *Offic. Chab. J. B.* commune; *C. B.* purpureum & Anglicum album, *Ger. Park.* Meadow-Saffron. In pratis ſolo pingui occurrit. Autumno floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Comeſa fungorum more, ſtrangulando enecat. *Dioſc.*

2. Ephe-

2. Ephemerum, *Offic.* Deadly-Saffron. In ſylvis & opacis, & à *Dioſcoride* ſic breviter deſcribitur: *Folia habet, Lilii, ſed tenuiora: caulem parvum: florem candidum, amarum ſemen molle: radicem unam, digitali craſſitudine, longam adſtringentem, odoratam.* Vires. *Hujus radix dentibus præcipua, ſi decocto ejus colluantur. Folia in vino cocta diſcutiunt tumores & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.* Dioſc.

Per Ephemerum plantam deleteriam tantùm intellexiſſe videtur *Theophraſtus*, ut rectè obſervat *Chabræus*. *Dioſcorides* autem nullam Ephemero vim lethalem aſſignat. *Plinius* non tantùm non exitioſam ſed ſalutiferam eſſe affirmat, unde ab eruditis valde ambigitur de hac planta, nec adhuc quo referenda ſit inter eos convenit. *C. Bauhinus* ſub hoc nomine duas proponit plantas; & *Columna* Digitalis quandam ſpeciem pro ea habet: Mauritani & eos ſecuti, ſuperioris ætatis Medici Ephemerum cum Hermodactylis confuderunt.

Pag. eadem lin. 24. ſubjunge,

XVI. *De Dente Canino.*

NOtæ, flos in uno caule unicus, hexapetalos, deorſum natans, petalis reflexis; fructus in terna loculamenta diviſus, quorum ſingula ſeminibus oblongis repleta. Adde radicem carnoſam dentis canini quodammodo figurâ. R. Meth. A. p. 119.

Dens caninus, *Offic. Ger.* caninus Flore purpuraſcente & Flore rubro, *Park. Parad.* Dens Canis latiore

latiore rotundioreque folio, *C. B.* Flore purpurascente, *H. Ox.* Satyrion, quorundam Erythronium bifolium, Flore unico radiato purpureo, *J. B.* Satyrium Erythronium quorundam, Dentalis ſpecies aliis, *Chab.* Dogs-Tooth Violet. Ad quorundam montium radices reperitur. Aprili floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Dolores colicos mitigat, epilepticos pueros juvat, ventris tineas juvat, Venerem ſtimulat, Corpus nutrit.

A nonnullis Satyrium erythronium *Dioſcoridis* creditur, ſed erronè *Parkinſoni* judicio, qui Tulipam pro ea habet.

SECTIO

SECTIO XXII.

De Herbis bulboſis affinibus.

I. *De Iride.*

Pag. 360. pro 5. Specie Iridis, adde,

5. CHamæiris, *Offic.* tenuifolia, *Ger.* Tabernamontani, *H. Ox.* anguſtifolia major & minor, *Park. parad.* Iris humilis, ſeu Chamæiris anguſtifolia graminea, *Herm. Cat.* anguſtifolia prunum redolens major & minor, *C. B.* graminea, cui quotannis pereunt folia, *J. B.* graminea, cui quotannis pereunt folia, Flore variegato, *Chab.* Grass-leaved Flower-de-lure. In hortis colitur. Maio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum primo viribus convenire dicitur.

Pag. 361. poſt lin. 4. adde,

III. *De Liliaſtro.*

Ujus notæ, Flos exactè Liliaceus; fructus oblongus, ab apice in tres partes dehiſcens, & in tria loculamenta, ſeminibus anguloſis repleta diviſus;

diviſus; *radices parvis Napis ſimiles, aliquot adnatis.* R. Meth. A. p. 118.

Phalangium, *Offic.* Antiquorum, *Ger. emac.* magno Flore, *C. B.* Flore Lilii, *J. B.* Allobrogicum, *Park.* Allobrogicum magno Flore Lilii, *H. Ox.* Aſphodelus Allobrogicus magno Flore Lilii, *Herm. Cat.* Liliaſtrum Alpinum minus, *El. Bot. T. Inſt.* Spider-wort. In hortis apud nos colitur. Junio floret. *Uſu.* Folia, Flos, Semen. *Vires.* Cum vino pota auxiliantur contra Scorpionum Phalangiorumque ictus: Tormina quoque diſcutiunt. *Dioſc.*

IV. *De Aloe.*

Pag. ead lin. 8. dele Aloe vulgaris & quæ ſequuntur ad verbum *Vires.* in lin. 24. cujus in loco adde,

1. ALoe, *Offic. J. B. Chab.* vulgaris *C. B. H. Ox.* vera vulgaris, *Munt.* vulgaris ſive Sempervivum marinum, *Ger. Park.* Caraguata Braſilienſibus, *Marg.* tertia, *Piſon.* Kadanaku vel Catevala, *H. M.* Common-Aloes. Utriuſque Indiæ incola eſt. *Uſu.* Folia. Succus inſpiſſatus Aloe Barbadenſis, *Offic.* vocatur, aliquando niger lucidus, aliquando hepatis ferè colore, odore gravi, ſapore amaricantiſſimo. Ex Inſula Barbados in Cucurbitis magnis adfertur. *Vires.* Folia ad ambuſta commendantur. Succus inſpiſſatus cum Aloe Succotrina viribus convenit.

2. Aloe Guineenſis Caballina vulgari ſimilis, ſed tota maculata, *Commel. Prælud. Bot.* Horſe-Aloes. *Uſu.* Succus inſpiſſatus quibus pars impurio

purior arenoſa, ſordibus conſpurcata, & idcircò nigricans *Aloe Caballina* dicitur. Pars purior colorem hepatis referens *Aloe Hepatica* vocatur.

Caballinam hanc vocat prædictus Autor, quia fractis foliis Succus Aloen Caballinam redolet.

3. Aloe Succotrina, *Offic.* Succotrina anguſtifolia ſpinoſa, Flore purpureo, *Breyn. P.* 2. Indiæ Orientalis ſerrata, ſive Succotrina vera, Floribus Phœniceis, *Hort. Beaum.* Americana ſerrata, Floribus coccineis, *P. B. P.* An Aloe Americana Anonæ foliis, floribus ſuaverubentibus, ex codice Bentingiano, *P. P. Tab.* 240. *Fig.* 4? Succotrina Aloes. In Inſula Succotora in India Orientali reperitur. *Uſu.* Succus inſpiſſatus ex nigro ſplendentis colore, ſed quando teritur croceus; odoris non ingrati: cujus colligendi modum hodiernum D. *Raio* communicavit D. *Joſua Palmer*, M. D. è dictatis D. *P. Hermanni* his verbis:

Ex foliis à radice avulſis manu vel inſtrumento leviter compreſſis ſuccus deſtillat in vas recipiens. Subſidere debent partes craſſæ per noctem, aliæ verò ſupernatant. Poſtero die in aliud vas infundunt & inſolant, ut concreſcat & exſiccetur, in quo tempore fulvum acquirit colorem.

Ex Inſula Succotora in coriis beſtiarum ad nos tranſportatur; & à Caballina puritate ſola differre à quibuſdam creditur.

Pag. eadem, lin ult. ſubjunge,

De variis Aloes ſpeciebus & plantis è quibus omnes effluunt aut eliciuntur, liceat mihi hoc in loco dubia mea aperire. Cùm Pharmacologiam meam conſcriberem, quanta eſſet differentia, odo-

ris reſpectu, inter *Succotrinam*, *Caballinam*, & *Barbadenſem* Aloen, obſervans, ſuſpicionem mihi injecit, non ex puritate tantùm inter ſe differre, ut vulgò opinantur; quamvis quòd ab eodem loco adveherentur, priores duas præcipuè puritate tantùm differre, ut dixi, quemvis facilè perſuadere poſſet; ingens tamen differentia, quam, odoris reſpectu, inter *Barbadenſem* & *Succotrinam* intercedere animadverti, ſuſpicionem mihi movit, *Barbadenſem* ab eadem cum *Succotrina* planta non elici, ideóque de ea in ſpecie quæſivi, an ab eadem planta eſſet necne? Unde ab eruditiſſimo & ingenioſiſſimo Viro D. *Hans Sloane*, M. D. ex propria obſervatione cùm in Inſula illa eſſet, certior factus ſum, *Barbadenſem Aloen* Aloes vulgaris, *C. B.* ſuccum eſſe, non Aloes Americanæ, *Dod.* ut antèà ſuſpicabar. Ab aliis etiam admonitus *Succotrinam Aloen* ejuſdem originis eſſe, ut videre poſſis in Hiſtoria Plantarum D. *Raii*, (ex dictatis D. *Hermanni*) p. 1196. unde eas hoc modo diſpoſui in *Pharmacologia*.

At neque ſolus ſum in hac ſuſpicione, cùm ingenioſiſſimus Botanicus D. *Commelinus* in *Præludiis* ſuis *Botanicis*, p. 46. conciliare non poteſt differentiam odoris inter *Aloen Caballinam* & *Succotrinam*, quæ tanta eſt ut frequentibus lotionibus aliiſve modis *Caballina* à vehementi ingrato ſuo odore liberari nequeat, cum identitate ſpeciei. Unde rectè affirmat, ex diverſis Aloes ſpeciebus ſucco amaro præditis, elici poſſe ſuccum vulgari ſimilem, & earundem virium: cujus verba hîc tranſcribo. *Etiamſi variæ* Aloes *ſpecies exiſtunt, quæ ſuccum fundunt amarum, harum tamen unica eſt, quæ* Aloes vulgaris *à* C. Bauhino

Bauhino, *Dioſcoridis à* Fabio Colomna, *Arabica Socotrina Officinarum à* Moriſono *vocatur, & ab omnibus Botanicis veram* Aloem *fundens planta exiſtimatur, cujus ſuccus concretus in Officinis* Pharmaceuticis *Græco Latinoque* Aloes *nomine innoteſcit. Hic ſuccus triplex eſt, vel* Aloe Succotrina (*quæ &* Lucida *dicitur*) Hepatica *vel* Caballina *vocatur, quæ ſola duntaxat puritate impuritateve, ut plurimorum eſt opinio, differunt ; omnium puriſſima eſt* Succotrina, *quod nec ego inficior, ſed aliquam tamen dubitandi anſam geminæ aliæ* Aloes *ſpecies ſtatim indigitatæ exhibent, ut* Aloe Succotrina anguſtifolia ſpinoſa flore purpureo *Breynii*, & Aloe Guineenſis Caballinæ vulgari ſimilis, ſed tota maculata ; *dum prioris ſuccus recens ſapori odorique* Aloes Succotrinæ, *alterius autem* Aloes Caballinæ *reſpondet ; adde denique* Aloem Caballinam Officinarum *à fœtore illo ingrato, quem ſpirat, nullo artificio aut lotione liberari poſſe, quod factu, meo judicio, non eſſet difficile, ſi ſola impuritate à* Succotrina *differret : nullus tamen etiam dubito, quin ex variis* Aloes *ſpeciebus, ſuccum amarum continentibus, ſuccus* Aloes vulgaris *ſucco ſimilis, & quoad vires reſpondens, colligi poſſit.*

Cumque veriſimile ſit, Succotrinam Aloen à D. *Breynii* planta profluere ; *Caballinam* & *Hepaticam* à *Commeliniana*, & *Barbadenſem* à *Vulgari Aloe*, ut anteà dixi ; omnes de novo inſerui.

V. *De Yucca.*

AB aliis differt, foliis quodammodo gramineis, acutis & pungentibus, floribus deorsum nutantibus plurimis in eodem Caule; pediculis longis. R. Meth. A. p. 193.

Yucca, *Offic.* sive Yucca Peruviana, *Ger.* foliis Aloes, *C. B. H. Ox.* sive Jucca, *Park. parad.* Indian Bread. In Americana ponte oritur, apud nos autem in hortis. *Usu.* Radix. *Vires.* De usu ejus in Medicina nihil invenio.

VI. *De Cannacoro.*

CUI flores oblongi, in spicam congesti, è sex vel septem petalis linguæformibus, & trifoliato quasi Calice constructi, insidentes pericarpio trigono echinato, in tres Cellulas semina rotunda continentes distincto; folia lata, radix tuberosa, nodosa. R. Meth. A. p. 117.

Sagittaria alexipharmaca, *Offic.* Canna Indica radice alba alexipharmaca, *Cat. Jamaic.* Indica angustifolia, pediculis longis ad imum folium, nodo singulari geniculatis, *P. Al.* Arundo Indica angustifolia, Flore rutilo, pediculis donata, *H. Ox.* Agutiguepo-obi Brasilienſibus, *Marg.* Acutiguepo-obi, *Pison.* Radix quædam in Malaca, quæ adversus vulnera Sagittis toxico illitis facta, præsentaneum remedium est Garcies, *C. B.* Malaca quædam toxicis Sagittis resistens, *J. B.* Arrow-Root, Dart-wort. In hortis Jamaicæ seritur. *Usu.* Radix superius rotunda, subrussa,

ſubruffa, inferius fibrata. *Vires.* Alexipharmaca eſt inſignis; adverſus vulnera toxicis Sagittis facta laudatur.

VIII. *De Galanga.*

Pag. 368. poſt lin. 19. adde,

13 CAſſummuniar, *Offic.* aliàs Ryſagon, *Peach. Obſ.* Caſmunar, *Marl.* Riſagon, *Muſ. Reg. Soc.* An Zerumbeth, ſeu Zingiber rubrum, ſylveſtre, Ternatenſe, *Camell. Syllab.* ? Caſumunar. Ex India Orientali ad nos tranſportatur. *Uſu.* Radix, quæ tuberoſa eſt, ad pollicem aut amplius craſſa, in taleolas tranſverſas ſecta ſuperficie circulis (ut in Galanga) quaſi geniculis notata, fuſca, intùs flaveſcens, ſaporis amaricantis aromatici, odoris fragrantis. *Vires.* Moderatè calfacit & aſtringit: Partium eſt tenuium: Nervos roborat: Spiritus animales & vitales reficit, ventriculum confortat, flatus expellit. In Apoplexia, motibus convulſivis, Paralyſi Tremore, Hyſterica paſſione, Hypochondriacis affectibus, Vertigine, & inteſtinorum Torminibus curandis Medicamentum eſt præſtantiſſimum. D. *Peachy*, M. D. pro Corticis Peruviani correctorio eam commendat. Qui de viribus ejus plura ſcire deſiderant, D. *Peachy* & D. *Marlow* Obſervationes conſulant.

Caſſummuniar Zedoariæ ſpeciem eſſe affirmat D. *Tancred Robinſon*, M. D.

IX. *De Aro.*

Pag. 369. poſt lin. 11. adde,

2. DRacunculus major, *Offic.* biſtorto folio, *C. B.* major Matthioli, *Ger.* Arum cauleſcens Rumicis agreſtis foliis ſibi invicem implicatis Virginianum, *P. P. Tab.* 271. *fig.* 1. major cauleſcens Lapathi foliis, *H. Ox.* Great Dragons. In Virginia ſponte oritur. *Uſu.* Radix. *Vires.* Calfacit & ſiccat, prodeſt contra Orthopnœas, rupta, convulſa, tuſſim & deſtillationes. *Dioſc.*

X. *De Ariſaro.*

AB Aro differt floris formâ, qui tubus eſt imâ parte clauſus, ſummâ apertus, & in caputii modum incurvatus. R. Meth. A. p. 75.

Ariſarum, *Offic.* anguſtifolium Dioſcoridis fortè, *C. B.* anguſtifolium, *Ger. J. B. Chab.* longifolium, *Park.* Arum humile anguſtifolium piſtillo longiſſimo, tenui, inflexo, mucronato, *Herm. Cat.* Scorzoneræ folio, *El. Bot.* Friars Coul. In Italia ac Dalmatia reperitur. *Uſu.* Radix. *Vires.* Illitu nomas ſiſtit, *Dioſc.* Calfacit, ſiccat, incidit, aperit, abſtergit, digerit. *Galen.*

XI. *De*

XI. *De Satyrio.*

Pag. ead. lin. ult. ſubjunge,

DUÆ Satyrii ſpecies à Dioſcoride memorantur, quarum priorem his verbis deſcribit: *Satyrium aliqui Trifolium vocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, Rumici aut Lilio ſimilia, minora tamen, ac rubra: Caulem cubitalem nudum: Florem Lilii effigie, candidum: Radicem bulboſam, mali magnitudine, fulvam, intùs ut ovum candidam, guſtanti dulcem, & ori non ingratam.* Alteram in hunc modum: *Eſt & alterum Satyrium Erythronium, ſive Erythraicon,* i. e. *rubrum, ſemine lini, majore, duro, lævi, ſplendente: quod fertur non ſecus atq; ſcincus libidinem excitare. Cortice radicis gracili, rufo, intùs autem albo, includitur, ſapore dulci, non ingrato ori.* Ab ejus temporibus non levis controverſia de hac ſtirpe, inter erudicos Medicos & Botanicos, exorta eſt; alii uni, aliis alteri plantæ id nomen accommodantibus; verùm plerique ex Orchidum familia eas eſſe volunt, cui opinioni Officinæ noſtræ conſentiunt; atque idcircò in priore meo libro radices haſce, quæ nunc pro Satyrio uſurpantur, eodem nomine inſignivi; quamvis eodem tempore non eram neſcius nonnullos Authores id nominis Orchidi palmatæ, alios Cynoſorchidi attribuere. Nunc ergo mutatâ ſententiâ, quænam Dioſcoridis *Satyria* ſint, mihi optimè demonſtratum videtur à *Parkinſono*, aliiſque; qui pro Tulipis ea habuere, ut quæ ſuperiùs recitatis deſcriptionibus omnium optimè conveniret.

3. Cynoſorchis, *Offic.* major, *Ger.* prior, *J. B.* latifolia hiante cuculo major, *C. B.* prior Dodonæi Flore copioſo, dilutè purpureo, *Chab.* Orchis major latifolia, *Park.* latifolia hiante cuculo major, *El. Bot. T. Inſt.* Dog-ſtones. In locis herbidis circa Baſileam. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum præcedentibus viribus convenit.

4. Serapias, *Offic.* ſive Salep, *Marl. Obſ.* Salep. In Turcia reperitur. *Uſu.* Radix oblonga, alba pellucida, paulùm compreſſa, & nonnihil corrugata. Sapore gummi Tragacanthæ referens, odoris nullius. Ex Turcia ad nos importatur. *Vires.* Analepticum inſigne habetur, Sterilitati opitulatur, Venerem ſtimulat, abortivum impedit, partum facilitat, Chocolatæ modo præparata eſt.

Quamvis formam externam, ſi ſpectes, ex Orchidum tribu meritò cenſeri poſſet, cujuſnam tamen plantæ radix ſit inter eruditos adhuc ambigitur.

A. 5. Tragorchis, *Offic.* maximus, *Ger.* maxima, *Park.* Orchis ſive Tragorchis maxima, *Mer. Pin.* Saurodes ſive Tragorchis maximus, *P. B.* barbata, odore hirci, breviore longioreque folio, *C. B.* barbata fœtida, *J. B.* Orchis, Cynoſorchis, Satyrium, *Chab.* Goats Stones. Solo pinguiſſimo naſcitur. Maio & Junio floret. *Uſu.* Radix, *Vires.* Cum Satyrio viribus convenit.

A. 5. Triorchis, *Offic. Ger.* alba, odorata major & minor, *Park.* vel Tetrorchis alba, odorata major, *C. B.* alba odorata minor, *ejuſd.* Orchis ſpiralis alba odorata, *J. B. Chab.* ſeu Teſticulus odoratus, *Mer. P.* ſpiralis autumnalis, *P. B.* Flore albo odorato, *ejuſd.* Triple Ladies-Traces. In paſcuis ſiccioribus. Autumno floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum prioribus viribus convenit.

A. 7.

A. 7. Orchis palmata, *Offic.* palmata pratenſis latifolia longis calcaribus, *C. B.* palmata major mas ſive Palma Chriſti mas, *Park.* palmata pratenſis major, ſive Palma Chriſti mas Gerardi, *P. B.* ſive Palma Chriſti mas, *Mer. Pin.* Palma Chriſti mas, *Ger.* Palmata non maculata, *J. B.* Satyrium Regium palmata, *Chab.* Male Satyrion Royal. In pratis humidis & paluſtribus. Maio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum reliquis viribus convenire videtur.

XII. *De Orobanche.*

Cujus flores figurâ ad Orchin accedunt, ut & diſpoſitione in ſpicam, verum ab Orchidis floribus in eo differunt, quòd unico petalo conſtant. Fructus etiam, ſemina minutiſſima continens, bivalvis eſt. Folia è radice nulla exeunt, quæque in caule ſunt rudimenta tantum foliorum eſſe videntur. R. Meth. A. p. 92.

A. Orobanche, *Offic. Chab.* Flore majore, *J. B.* major garyophyllum olens, *C. B.* ſive Rapum Geniſtæ, *Ger. Park.* Broom-Rape. In glareoſis & aridis locis, Junio & Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Herba ſiccata & in pulverem trita præſens eſt ad Coli dolores remedium. Condita aut ejus Syrupus ad Splenicos & Hypochondriacos affectus uſus eſt eximii. Extrinſecus ad tumores duros & ſchirroſos molliendos exhibetur. D. *Bowle.*

XIII. *De Squamata.*

CUjus notæ, Radices ſquamoſæ, flores in perianthio quadrifido maximam partem latitantes, galeâ rubrâ, barbâ tripartitâ lacteâ: ſemen rotundum, ſatis magnum, & per maturitatem nigrum. R. Meth. A. p. 92.

A. Squamaria & Squamata, *Offic. Volck.* Orobanche radice dentata major, *C. B.* radice dentata, ſive Dentaria major Matthioli, *Park.* Dentaria major Matthioli, *Ger.* Anablatum Cordi ſive Aphyllon, *J. B.* Cordi ſive Aphyllum ad Orobanchen accedens, *Chab.* Tooth-wort. In umbroſis ſepium aggeribus. Aprili floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Conſolidat, glutinat, in Herniis & vulneribus, variiſque affectibus à fluxionibus ortis prodeſt.

Pag. 170. poſt lin. 12. adde,

XV. *De Bifolio.*

CUjus notæ, Radices fibroſæ, folia nervoſa & ferè Plantaginea, bina in caule oppoſita, flores Orchidis, calcari rarentes. R. Meth. A. p. 131.

A. Bifolium, *Offic.* ſylveſtre vulgare, *Park.* majus vulgare, *H. Ox.* majus ſeu Ophrys major quibuſdam, *J. B.* Ophrys, *Chab.* bifolia, *C. B. Ger.* Orchis bifolia herbaceo flore major, *Herm. Cat.* Twayblade. In ſylvis & dumetis. Maio & Junio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Adſtringit & glutinat,

glutinat, præcipuè ad hernias & vulnera conglutinanda commendatur.

XVI. *De Helleborine.*

CUjus notæ, Folia nervoſa, radices fibroſæ, flores hexapetali Orchidis ſimiles, calcari carentes, R. Meth. A. p. 121.

A. Helleborine, *Offic. Ger.* latifolia montana, *C. B.* Elleborine Dodonæi, *J. B. Chab.* Flore viridante, *Park.* Baſtard-Helleboze. In ſylvis cæduis, lucis & opacis. Maio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum Helleboro albo à quibuſdam viribus convenire creditur, ſed in Officinis noſtris rarò aut nunquam reperitur.

SECTIO

SECTIO XXIII.

De Herbis graminifoliis, non culmiferis, flore ſtamineo.

I. *De Cypero.*

Pag. 372. pro 3, & 4ta Specie Cyperi, adde,

3. TRaſi, *Offic. J. B.* Malinathalle Theophraſti, *Chab.* Cyperus eſculentus, *R. H. p.* 1301. rotundus eſculentus anguſtifolius, *C. B.* eſculentus ſive Traſi Italorum, *Ger. emac.* dulcis rotundus eſculentus Traſi dulce vocatus, *Park.* Sweet Cyperus or Rush-nut. In Italia & alibi naſcitur. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum prioribus viribus convenit.

4. Papyrus, *Offic.* Nilotica, *J. B. Ger.* Nilotica Alpina, *Berd* Ægyptiis dicta: *Biblos* Syriaca quorundam, *Chab.* Nilotica ſive Ægyptiaca, *C. B.* Antiquorum Nilotica, *Park.* Cyperus Niloticus vel Syriacus maximus papyraceus, *H. Ox.* The Paper-Reed. In Ægypto & Syria naſcitur. *Uſu.* Caules. *Vires.* Ad laxandas fiſtulas utilis eſt. Aqua ex ſcapis recentibus deſtillata ad oculorum ſuffuſiones, caligines atque obſcuritates proficua eſt.

Ex

Ex Papyro olim chartæ fiebant ad ſcribendi uſum, conficiendi modum vide apud *Plinium, l.* 13 *cap.* 11, 12. Chartæ ex Papyro in deſuetudinem obierunt; novo chartarum artificio, Anno 1470, invento, conficiendi cujus modum videſis apud clariſſimum *Raium, p.* 1302. Ante chartarum uſum in Palmarum foliis primò ſcriptitarum, ut rectè obſervat *Plinius*, deinde in quorundam arborum libris. Et adhuc hodie ex Palma *Lantor* dicta Indos ſuam chartam parare ad ſcriptionem ſcribit *Linſchotanus*. *Lerius* in Provincia Mangi arborem eſſe ſcribit *Cal* nomine, folio grandi quod chartæ uſum præbeat in tota India. *Petrus Martyr* Chaldæos, literarum primos repertores; in arboris *Copeiæ* dictæ foliis primò ſcriptitaſſe refert. *M. Fumée* præter arborem *Copei*, eſſe aliam Guajabara dictam, in cujus foliis ſtylo vel aciculâ ſcriptitant Indi. Præter ſupradictas, varias arbores meminit *C. Bauhinus* in *Pinace, p.* 19. quæ pro papyro uſurpantur. *Attalus* (uti creditur) *Pergamenus*, animalium coria arefacta huic uſui adaptanda invenit.

II. *De Junco.*

Pag. 373. lin. ult. ſubjunge,

A. 2. Oxyſchœnos. *Offic.* Juncus acutus capitulis Sorgi, *C. B.* pungens ſive Juncus acutus capitulis Sorgi, *J. B. Chab* maritimus capitulis Sorgi, *Park.* Prickling large Sea-Rush. In maritimis. *Uſu.* Integra Herba, Semen.

A. 3. Holoſchœnos, *Offic.* Juncus aquaticus maximus, *Ger.* lævis maximus, *Park.* maximus ſive Scirpus, *C. B.* maximus holoſchœnos, *J. B. Chab.* Scirpus altiſſimus, *El. Bot.* Bull-Rush, In fluminibus & piſcinis majoribus. *Uſu.* Integra planta. *Vires.* Semen utriuſque toſtum ſiſtit alvum, rubra fœminarumque profluvia: Urinam ciet: Somnum conciliat. Planta tenera, convenienter illinitur adverſus Phalangiorum morſus. *Dioſc.*

Pag. 374. poſt lin. 17. adde,

IV. *De Sparganio.*

Pilulis ſuis echinatis ſphericis Platani pilulas æmulantibus, à reliquis ſuis generis abundè diſtinguitur. R. Synop. p. 277.

A. Sparganium, *Offic. Chab.* ramoſum, *Ger. C. B. Park.* quibuſdam, *J. B.* Butomos diſſectâ paniculâ vulgò Platanaria, quia pilulas habet Platani pilulis ſimiles, *Bob. in Theoph.* Branched Bur-Reed. Ad Fluviorum ripas, inque paluſtribus frequens. Julio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Contra Serpentis venena cum vino datur. *Dioſc.*

V. *De Typha.*

Nota eſt florum effigies turbinata & in clavem compoſita. R. Synop. p. 278.

A. Typha, *Offic. Ger.* paluſtris major, *C. B. J. B.* paluſtris ſeu major, *Chab.* paluſtris maximus, *Park.*

Park. Cats-Tail or Reed-Mace. In ſtagnis & ad rivulorum ripas. *Uſu.* Flos. *Vires.* Hujus herbæ flos ſuillo adipe eloto exceptus ambuſtis medetur.

VI. *De Acoro.*

Pag. 375. lin. ult. ſubjunge,

2. ACorus Aſiaticus, *Offic.* verus ſive Calamus aromaticus, Aſiaticus, radice tenuiore, *Herm. Cat.* Aſiaticus radice tenuiore Hermanni, *H. Ox.* Braſilienſis aromaticus minor, Capitainga, aliis Jacarecatinga Piſonis, *ejuſd.* verus Aſiaticus radice tenuiore, vel Calamus aromaticus Garziæ, *P. Al.* Calamus aromaticus, *Garz.* Aromaticus orientalis folio & radice tenuiore, *Act. Philoſ. Lond. n.* 274. *p.* 943. Capicatinga, aliis Jacarecatinga Acori ſpecies, *Piſ.* Va-embu, *H.M.* Aſiatick Sweet Flag. Utriuſque Indiæ incola eſt. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

SECTIO

SECTIO XXIV.

De Herbis Culmiferis.

III. *De Zea.*

Pag. 378. poſt lin. 2. adde,

AD præparationes hujus grani referendi videntur *Vermicelli* Genoæ facti, ita dicti à ſimilitudine cum parvis Vermicellis filamentoſis: Duum ſunt generum, albi & lutei, inque Nobilium & Generoſorum eulinis in juſculis & brodiis uſurpantur, & analeptici habentur.

Pag. ead. poſt lin. 13. adde,

Tritici ſpecies eſt glumis adeò arctè granis adhærentibus, ut eas triturando non deponat. R. Meth. A. p. 125.

Pag. ead. lin. 17. verbo [rarius] junge,

Vires. Plus quàm Hordeum alit, ori grata. Panis recens ſuavis eſt, & concoctu facilis. Halica, ex Zea præparata, in aceto cocta lepras tollit; unguium ſcabrities extricat; incipientibus Ægilopiis medetur. Decoctum Dyſentericis prodeſt. *Dioſc.*

2. Briza

2. Briza, *Offic.* monococcos, *Ger.* Zea Briza dicta, ſeu Monococcos Germanica, *C. B.* monococcos, ſive ſimplex ſive Briza, *Park.* monococcos Briza quibuſdam, *J. B.* ſimplex & monococcos Briza, *Chab.* St. Peter's Corn. In Germania ſeritur. *Uſu.* Semen. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

Ex Zeæ & Brizæ farina fit puls quem Crimnon Græci vocitant. Abundè alit, ſed ægrè conficitur: alvum vehementius adſtringit. *Dioſc.*

3. Olyra, *Offic. Park.* Triticum Amylæum, *Ger.* Zea Amylea ſive Olyra, *C. B. Theat.* verna, *J. B.* Spelt-Corn. In Germania ſeritur. Tardè metitur. *Uſu.* Semen in culinis Germanicis. *Vires.* Cum Zea viribus pollet, ſed minùs aliquantò nutrit.

Fit quoque ex Olyra Crimnon.

IV. *De Hordeo.*

Pag. 379. pro 2da Specie Hordei, adde,

2. Zeopyrum, *Offic.* ſeu Tritico-ſpeltum, *C. B. Theat.* ſive Tritico-ſpeltum Lobelii, *Park.* Hordeum nudum, *Ger.* nudum ſive Gymnocrithon, *J. B.* nudum ſive Gymnocrithon Zeæ ſpecies & Zeopyrum quorundam, *Chab.* Triticum æſtivum ſpicâ Hordei polyſtichii, *H. Ox.* Naked-Barley. In Germania ſeritur. *Uſu.* Semen. *Vires.* Refrigerat, ut Hordeum, ſitim ſedat.

Pag.

Pag. 380. lin. 9. ſubjunge,

VII. *De Phalaride.*

Spica habitiore & è ſquamis compactili ab aliis dignoſcitur. R. Meth. A. p. 126.

Phalaris, *Offic. Ger. J. B. Chab.* vulgaris, *Park.* major ſemine albo, *C. B.* Canary-Grass. In Hiſpania & Gallia Narbonenſi ſponte oritur. *Uſu.* Herba, Semen. *Vires.* Semen & Herbæ ſuccum pota ad veſicæ dolores & cruciatus commendant veteres. *R. H. p.* 1248.

Pag. 381. poſt lin. 7. adde,

X. *De Sorgo.*

Culmi altitudine & craſſitie grani figurâ ad Milium accedentis, magnitudine, jubâ erectâ à Milio aliiſque frumentis paniculatis differt. R. Meth. A.

Sorghum, *Offic. Ger.* Sorghi, *J. B.* Milium Indicum, *Chab.* Milium Arundinaceum ſive Indicum ſemine ſubrotundo, *C. B. Theat.* Arundinaceum ſubrotundo ſemine, Sorgho nominatum, *ejuſd. Pin.* Melica ſive Sorghum, *Park.* Indian-Millet. In Italia ſeritur. *Uſu.* Culmorum medulla, Flos. *Vires.* Medulla contra Strumas, Flores ad Dyſenteriam & Fluorem muliebrem commendat *Matth.*

XI.

XI. *De Lacryma Jobi.*

Paniculâ è glumis aceroſis, nullum poſt ſe granum relinquentibus, compoſitâ ſeminibus perforatis, maximis, politi lævoris, & invictæ duritiei, à glumis ſeparatis ſeu remotis, culmis arundinaceis, ad alia culmiferis facilè diſtinguitur. R. Meth. A. p. 126.

Lacryma Jobi, *Offic. Ger. Park.* Job Cluſii, *El. Bot.* Jobi vel Mariæ *Chab.* Jobi multis, ſive Milium Arundinaceum, *J. B.* Milium arundinaceum, ſemine Lithoſpermi facie, maximo, duriſſimo, *Herm. Cat.* Lithoſpermum arundinaceum fortè Dioſcoridis & Plinii, *C. B.* Job's-Tears. In hortis colitur. *Uſu.* Semen. *Vires.* Ad Calculum renum & veſicæ commendat *Lob.*

XII. *De Avena.*

Pag. ead. poſt lin. 17. ſubjunge,

AMylum ex hujus ſemine paratum apud *Wallos* in cibis æſtimatur, & *Llummery* dicitur.

A. 2. Ægilops, *Offic.* bromoides, *Ger.* bromoides Belgarum, *Park.* quibuſdam ariſtis recurvis ſive Avena piloſa, *J. B.* Feſtuca utriculis lanugine flaveſcentibus, *C. B.* Avena piloſa: Ægilops ariſtis recurvis quorundam, *Chab.* ſylveſtris piloſa ariſtis recurvis, *H. Ox.* Wild-Oats. Inter ſegetes frequens. *Uſu.* Semen. *Vires.* Cum priore convenit viribus.

XIII.

XIII. *De Feſtuca.*

GRamen eſt paniculatum locuſtis ſquamoſis & ariſtatis.

A. 1. Bromus, *Offic.* ſterilis, *Ger.* herba ſive Avena ſterilis, *Park.* Ægilops, *Chab.* Matthiolo fortè *J. B.* Feſtuca avenacea ſterilis elatior, *C. B.* Drank, or wild Oat-Graſs. Ad ſepes & in agrorum marginibus. Maio menſe. *Uſu.* Herba. *Vires.* Exſiccatoriam vim habet, gravem oris halitum emendat. *Dioſc.*

2. Feſtuca, *Offic.* Italica, *Ger.* altera capitulis duris, *C. B.* ſive Ægilops Narbonenſis, *Park.* ſive Ægilops altera capitulis duris, *C. B. Theat.* Gramen ſive Feſtuca altera capitulis duris *Bot. Monſp.* Italian Drank. In Italia, Gallia Narbonenſi, &c. vulgatiſſima. *Uſu* Semen. *Vires.* Exſiccat adſtringendo citra calefactionem multam.

XIV. *De Lolio.*

Pag. ead. lin. ult. ſubjunge,

A. 2. Phœnix, *Offic.* Lolio ſimilis, *J. B.* Lolium rubrum, *Ger.* rubrum ſive Phœnix, *Park.* Gramen loliaceum anguſtiore folio & ſpica, *C. B.* Rap-Graſs, Darnel-Graſs. Ad vias & in paſcuis. *Uſu.* Herba. *Vires.* Siccat & adſtringit, alvum menſeſque ſiſtit, urinam infrænat. Locis nonnullis pro jumentorum pabulo ſeritur.

XV.

XV. *De Alopecuro.*

A Spica molli ſericeâ, caudam vulpinam referente, dicta ſunt hæc gramina. R. Meth. Gram. p. 173.

Alopecuros, *Offic. Ger.* genuina, *Park.* Gramen Alopecuros ſpica brevis, *J. B Chab.* Alopecuroides ſpica rotundiore, *C. B.* Alopecuros ſpica rotundiore, *ejuſd. Theat.* Fox-Tail. In Gallia & Italia reperitur. *Uſu.* Herba.

Pag. 382. poſt lin. 11. adde,

XVII. *De Gramine Dactyloide.*

A Spicis velut in digitos explicatis, non tantùm nomen accipit, ſed à reliquis diſtinguitur.

1. Gramen Mannæ, *Offic.* mannæ eſculentum, *Ger.* dactylon eſculentum, *C. B.* Iſchæmon ſativum ſive Gramen Mannæ eſculentum, *Park.* Graminis genus, dens caninus tertius, Gramen mannæ, *Chab.* genus Dens caninus tertius, ſive Gramen primum vel Galli crus, *J. B.* Manna-Grass, Ruſſia-Seed. In Germania, Polonia, &c. ſeritur. *Uſu.* Semina, quæ parva ſunt, oblonga, pellucida, coloris albi, ſaporis exigui, decorticata eſſe videntur inſtar Oryzæ. *Vires.* Oryzæ qualitates habet, mediocriter ventrem adſtringit, mammarum durities ſolvit; in cibis mediocriter alit. *Matth.* Admirandarum virium eſſe dicuntur ad Rachitidem puerorum perſanandam. Vide D. *Marlow* obſervationes de ſeminibus Rufficis.

Cujuſ-

Cujuſnam autem plantæ ſemina ſunt inter eru-
ditos hujus ſeculi non convenit, nonnullis Palmæ
cujuſdam *Sago* cognatæ picem granulatam eſſe
exiſtimantibus, aliis Graminis Mannæ ſemina ;
cum quibus & ego conſentio, atque idcircò ea
ſic collocavi & denominavi : qua in ſententia
valdè confirmatus non ita pridem fui ab ingenio-
ſiſſimo viro D. *Joanne Philippo Breynio* M.D. cui
in peregrinatione ſua *Anglicana* cùm *Brantriæ* me
benevolè inviſeret, ea oſtendi.

A. 2. Gramen dactylon, *Offic.* dactylon folio
arundinaceo majus : aculeatum fortè Plinio, *C. B.*
dactylon folio arundinaceo majus, *Ejuſd. Theat.*
dactylon radice repente ſive Officinarum, *T. Inſt.*
dactyloides radice repente, *Ger.* repens cum pa-
niculis graminis Mannæ, *J. B.* repens cum pani-
culis graminis Mannæ ; Gramen dactyloides
multis, *Chab.* canarium Iſchæmi paniculis, *Park.*
Cock-foot-Graſs. In arvis & vinetis, lociſque
arenoſis. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum Gramine
Canino viribus pollet.

XVIII. *De Arundine.*

Pag. eadem pro 2, 3, 4, & 5ta ſpeciebus
Arundinis, adde,

2. ARundo ſcriptoria, *Offic. Ger. J. B.* ſcripto-
ria atro-rubens, *C. B.* Harundo minor
ſive Elegia, *Park.* Writting-Reed. In locis
humidis Græciæ, Italiæ, &c. *Uſu.* Calamus.

3. Arundo donax, *Offic. Park.* Cypria, *Ger.*
ſativa, *C. B.* maxima & hortenſis, *J. B. Chab.*
The Great Reed. In Italia, Hiſpania, &c. *Uſus*
Radix

Radix. *Vires.* Cum Arundine vallatoria viribus convenit. *Dioſc.*

4. Arundo Tabaxifera, *Offic.* Mambu, *Piſon.* Indica maxima arborea cortice ſpinoſo Hermanni, *Syen. in not.* arboreſcens Tabaxifera, *C. B. Theat.* arbor in qua humor lacteus gignitur, qui Tabaxir Avicennæ & Arabibus dicitur, *Ejuſd. Pin.* arborea Mambu vel Bambu dicta, *P. Al.* Canna ingens Mambu vel Bambu dicta, *Park.* Tabaxir ſive Mambu arbor, *J. B.* Mambu arbor, Tabaxir Garciæ & Acoſtæ, *Chab.* Bambu & Bamboes, *Nienhov. Leg.* Ily, *H. M.* The Bamu-Cane. In Malabar creſcit. *Uſu.* Tabax-. *Vires.* Propter vim inſignem medicamenoſam magni fit, & ab Arabibus, &c. avidè emitur.

A. 5. Gramen Arundinaceum, *Offic.* arundiaceum paniculâ ſpadiceâ molli majus, *C. B.* mentoſum arundinaceum, *Ger.* ſpicâ candidâ ſerici modo lucens, *J. B.* plumoſum Lobelii, icâ candidâ & ſerici modo lucens, *Chab.* Camogroſtis ſive Gramen tomentoſum, *Park.* Ando ſylvatica elatior paniculâ molli & ſerici odo lucenti, *H. Ox.* Reed-Grass. In ſylvoſis midis. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum Arundine nvenit.

XIX. *De Calamo Sacchariferâ.*

Pag. 383. adde,

ARundo farcta atro-rubens, *Offic.* farcta maxima atro-rubens, *C. B.* naſtos ſive rcta craſſa & major, *J. B.* naſtos ſive farcta, craſſa

craſſa & major: calamus Toxicus Theophraſti, *Chab.* farcta decima, *Park. icon.* The Walking-Cane. Ex India & Syria adfertur.

3. Arundo farcta flava, *Offic. C. B.* farcta, *Ger.* farcta nona, *Park. icon.* naſtos ſive farcta, ſeu toxica, & gracilis & plicatilis, *J. B.* naſtos, ſeu farcta, ſive toxica gracilis & plicatilis Indica, *Chab.* The Dart-Reed. Ex Syria adfertur.

4. Arundo farcta Indica, *Offic.* farcta Indica Orientalis Sanguinem Draconis manans, *H. Ox.* The Dragons-Blood Cane. In India Orientali creſcit. *Uſu.* Succus è fructu Dragons Blood in Drops dicta.

Modus rubram materiam colligendi eſt, fructum in aqua calida macerare, donec materia illa rubra in fundo vaſis ſubſidat: undè aqua aut evaporatâ aut effusâ concretis ex fundo vaſis colligitur. Hæcce rubra materia ea eſt ex qua fit *Vernix* qua Ciſtæ & Pyxides *Chinenſes* obduci ſolent, *H. Ox.*

5. Calamus odoratus, *Offic.* aromaticus, *Chab.* aromaticus Syriacus *C. B.* aromaticus verus quibuſdam, *J. B.* aromaticus Matthioli, *Park.* Arundo Syriaca aromatica foliis ex adverſo ſitis, *H. Ox.* Calamus odoratus, *Camel. Syllab.* Aromatick-Reed. In India oritur. In Officinis noſtris Anglicanis nunquam occurrit.

SECTI

SECTIO XXV,

De Herbis Anomalis ſeu incertæ Sedis;

I. *De Tribulo aquatico.*

Pag. 384. lin. 6. verbo *Nuces* adde,

HErba. *Vires.* Nuces dum recentes calculis juvant. Herba refrigerat & inſpiſſat, inflammationes ſedat, ulcera oris & gingivas ſanat.

II. *De Stratiote.*

Nilo innatat Aizoi arboreſcentis foliis, pro radice tenuiſſima fibrarum filamenta in aquas demittens; Flores nulli vel nondum obſervati. R. Meth. A. p. 129.

Stratiotes, *Offic.* Ægyptia, *J. B.* Ægyptia Dioſcoridis, *Veſling.* Ægyptia, Stratiotes Antiquorum, *Chab.* aquatica vera Dioſcorides & Ægyptiaca, *Park.* Lenticula paluſtris Ægyptiaca, ſive Stratiotes aquatica foliis Sedo majore latioribus, *C. B.* Water-Sengreen. In Nilo oritur. *Uſu.* Folia. *Vires.* Refrigerat, Sanguinem ſiſtit, inflammationes ſedat.

III. *De Acantho.*

2. ACanthus ſylveſtris, *Offic. Park.* ſylveſtris aculeatus, *Ger.* aculeatus, *C. B.* ſylveſtris ſive Branca Urſina ſpinoſa, *Chab.* Carduus acanthus ſive Branca Urſina ſpinoſa, *J. B.* Wild-Blank-Urſine. In hortis Botanicis colitur. Julio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

IV. *De Leontopetalo.*

HUic radix tuberoſa; flores Ranunculi, ſtellati, pentapetali. R. Meth. A. p. 129.

1. Leontopetalon, *Offic. Ger. C. B. Chab.* quorundam, *J B.* foliis coſtæ ramoſæ innaſcentibus, *T. Coroll.* Black-Turnep. In Apulia naſcitur. Serius floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Serpentium ictibus auxiliatur. *Dioſc.* Digerendi facultatem & exſiccandi, excalfaciendique poſſidet. *Galen.*

2. Chryſogonum, *Offic. Ger. Park.* Dioſcoridis quibuſdam, *J. B. Chab.* Leontopetalo affinis foliis Quernis, *C. B.* Leontopetalo foliis coſtæ ſimplici innaſcentibus, *T. Coroll.* Red-Turnep. In Syria oritur. *Uſu.* Radix. *Vires.* Cum priore convenit.

Pag.

Pag. ead. lin. ult. ſubjunge,

VI. *De Perſicaria ſiliquoſa.*

Caulis flavicans pellucidus; folia Mercurialis; Flores flavi penduli calcari donati. Siliquæ breves per maturitatem diſſilientes & ſemina projicientes.

A. Perſicaria ſiliquoſa, *Offic. Ger.* Balſamina lutea ſive Noli me tangere, *C. B.* Herba impatiens ſeu Noli me tangere, Floris petalo luteo, *H. Ox.* Noli me tangere, *J. B. Chab.* Mercurialis ſylveſtris, Noli me tangere dicta, ſive Perſicaria ſiliquoſa, *Park.* Touch-me-not. In hortis reperitur. *Uſu.* Herba. *Vires.* Vi diuretica inſigni pollet, ut Diabetem inducat. Facultate fertur pernicioſa & deleteria. *Dod.*

VII. *De Hypecoo.*

Cujus notæ folia tenuiter diſſecta; Siliquæ longæ planæ articulatæ, in ſingulis internodiis ſingulæ ſemina longiuſcula continentes. R. Meth. A. p. 129.

1. Hypecoon, *Offic. C. B. Chab.* ſiliquoſum, *J. B.* ſiliquis erectis articulatis incurvis, *H. Ox.* legitimum Cluſii, *Park.* Cyminum corniculatum ſive Hypecoon Cluſii, *Ger.* Horned Wild Cumin. In Gallia Narbonenſi ſponte oritur. Maio floret. *Uſu.* Herba, Succus. *Vires.* Natura eadem quæ Papaveris ſucco, *Dioſc.* Ejus ſuccus inſtar Opii ſomnum inducit. D. *Herm.*

2. Cuminum ſiliquoſum, *Offic. Ger.* Hypecoi altera ſpecies, *C. B.* Hypecoum alterum, *Park.* Hypecoon ſiliquis propendentibus non articulatis bivalvibus incurvis, *H. Ox.* Codded Wild-Cumin. In Hiſpania reperitur. Maio floret. *Uſu.* Herba. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

VIII. *De Epimedio.*

Cujus notæ ſunt, Cauliculi in ternos ramulos, ramuli in ternos pediculos folia ſuſtinentes, Hederaceorum ferè figurâ, diviſi; flores tetrapetali geminati aut potiùs octopetali; ſiliquæ bivalves, tenues; ſemina compreſſa rotunda. R. Meth. A. p. 129.

Epimedium, *Offic. Ger. C. B. Park.* Dodonæi, *El. Bot.* quorundam, *J. B.* quorundam Floribus purpureis cum apicibus luteis, *Chab.* Barren-wort. In Hortis apud nos reperitur. *Uſu.* Radix, Folia. *Vires.* Utraque conceptum adimit.

XI. *De Tribulo terreſtri.*

Folia huic Lenticulæ aut Ciceris; flore pentapetali; fructus muricati, è quinque velut triangularibus partibus compoſiti, quarum cuſpides in centro concurrunt, reliqui anguli in longam & acutam ſpinam exeunt. R. Meth. A. p. 130.

Tribulus terreſtris, *Offic. Ger. Park. J. B. Chab.* terreſtris Ciceris folio, ſeminum integumento aculeato, *C. B.* Caltrops. In Italia reperitur. Julio floret. *Uſu.* Herba, ſemen. *Vires.* Refrigerat, inſpiſſat, inflammationes juvat, ulcera oris putredineſque gingivarum ſanat. Semen contra venena commendatur; ictos à Serpentibus recreat.

CLAS-

CLASSIS TERTIA,
SEU
DENDROLOGIA.

SECTIO PRIMA.

De Arboribus caudice ſimplici non ramoſo.

I. *De Palma.*

Pag. 386. poſt lineam ſextam adde,

PALMA oleoſa, *Offic.* coccifera ex Guinea, *C. B.* Guinea, *J. B.* foliorum pediculis, fructu pruniformi luteo oleoſo, *Cat. Jamaic.* Nucifera Guineenſibus incolis Palma Adyl, *Jonſ. D.* Arbor Manicongo, Sambaancie Palma, *Chab.* Nucula Indica altera. *Park.* An Nucula, *Ger. emac.* The Palm-Oyl-Tree. In Guinea ſpontanea creſcit. *Uſu.* Oleum ſeu potiùs Unguentum craſſum Aurantii coloris, odore ſuavi, ex hoc fructu

confectum ad hunc modum : Nempe carni è nucleis avulſæ, adjiciunt aquæ ferventis bonam partem ; deinde jubent ut pulpa in lebete diu agitetur commiſceaturq; exactè ſuper ignem, deinde remotum ab igne lebetem tandiu ſtare ſinunt, donec amurca omnis in fundum ſubſiderit ; tandem oleum aquæ ſupernatans cochleari excipiunt : quo exhauſto aqua fervente iterum effusâ operationem repetunt. Egligenda eſt recens non rancidum, coloris Aurantii, odoris ſuavis, conſiſtentiæ Butyri. *Vires.* Extrinſecus Anodynum eſt, Nervos confortat dolores Podagricos mitigat, laſſitudines juvat, contractiones relaxat.

3. Coccus, *Offic. Nieremberg.* Palma Indica Nucifera Coccus dicta, *R. H.* 1356. nucifera Indica major, *Jonſ. D.* ducifera Americana major 1a Cocoeire ſeu Coqueire, *Ejuſd.* Indica coccifera anguloſa, *C. B.* nucifera arbor, *J. B.* coccifera ſeu Nux Indica, Indis Lubi, *Camel. Syllab.* Indica nucifera, *Chab.* major coccifera, *H. Beaum.* ſive Nux Indica vulgaris ferens coccos, *Park.* Nux Indica & Cocci vocata arbor *Hern.* Indica, *Chab.* Indica arbor, *Ger.* Indica vulgaris, *Piſ. Mant.* Indica Coquo Luſitanis dicta, *Bont. in Garc.* Inaja-guacuiba vulgò Coccos, *Piſ.* Inaja-gacuiba cujus fructus Inaja-guaca *Marg.* Tenga, *H. M.* The Coco or Toker-Nut-Tree. Utriuſque Indiæ alumna eſt. *Uſu.* Fructus medulla, liquor arboris Suri dictus, liquor nucleo contentus. *Vires.* Liquorem ſeu Vinum Suri Phthiſicis mirè conferre aiunt, & valdè opportunum eſſe urinæ, renumque vitiis laborantibus. E nucleis contuſis atque expreſſis lac extorquetur citra ignis operam, lumbricis enecandis utiliſſimum. Liquor nucleo contentus ſiti febribuſque extinguendis

guendis calorique contemperando idoneus eſt. *R. H.*

4. Coccos de Maldiva, *Offic. Park.* de Maldiva ſive Nux Indica ad venena celebrata, *Chab.* Palma coccifera figura Ovali, *C. B.* Nux Indica ad venena celebris ſive Coccus de Maldiva, *C. B.* Tavarcare quibuſdam, *R. H.* ſive Nux Maldivenſium, *Piſ. Mant.* The Maldiva-Nut. In India Orientali reperitur. *Uſu.* Fructus magnus figura ovali, cortice nigro, medulla candida, poroſa, ſapore excellenti. *Vires.* Laudatur adverſus venena, ad Coli dolores, Paralyſin, Epilepſiam, aliòſque nervorum affectus. Specificam qualitatem promovendi partum difficilem habet.

5. Ebenus Æthiopica, *Offic.* Palma Haira, *Park.* Americana ſpinoſa, *C. B.* tota ſpinoſa major, fructu pruniformi, *C. Jamaic.* Braſilienſis ſexta Airi *Piſ.* Portoricenſis ſpinoſiſſima vinifera, *Hort. Beaum.* Palmæ facie Haira. *J. B.* Ebenus, *Chab.* Haira ſive Ayri, *Jonſ. D.* The Macow or Ebony-Tree. In America frequens reperitur. *Uſu.* Lignum nigrum denſiſſimum. *Vires.* De viribus Ebeni vide pag. 435. Pharmacologiæ noſtræ.

In priore meo libro duas Ebeni ſpecies memini, quarum hodie uſus eſt inter mechanicos. Verùm an utervis earum vera & genuina Antiquorum Ebenus ſit, adhuc controvertitur. *Dioſcorides* duas deſcribit ſpecies. Prima ex *Æthiopia* defertur, *nigra, nullos habens venarum diſcurſus, factitii cornus lævore: cum frangitur denſa apparet, mordens guſtu, atque aſtringens, &c. Altera ex India lineis candidis & fulvis intercurrentibus, eademque maculis prædita: ceterùm prior bonitate antecedit.* Plinius in ejus deſcriptione inquit, *Rara eſt arbor, quam nullam aliam niſi Palmarum generis decuit:*

Unde concludo Plantam quam hîc exhibeo Ebenum Æthiopicam eſſe, & illam *Helbigii* Indicam.

Ex quo hæc ſcripſi, veram Ebenum Indicam à D. *Camello* deſcriptam inveni: quæ cùm Bacciferæ ſit arbor in tribu illa inveniet Lector.

Pag. 388. lin. ult. ſubjunge,

Fructus hujus arboris inſignis etiam uſûs eſt; à D. *Marloe* Nux Malabarenſis dictus. Nuce Moſchata cui aliàs valdè ſimilis, major eſt, etiam compreſſus cum umbilico in medio, altera extremitate rotunda. *Vires.* Admirandarum virium eſt in Scrophulis curandis. Sanguinem corrigit, Humores noxios alterat; Hepar & Lienem emendat, facultatem digeſtivam reſtituit: totumque corporis habitum in meliorem mutat.

N. B. Fructus immaturus vertiginem inducit, non ſecus ac ſi ſumpto vino quis ebrietatem contraxerit.

7. Sagou. *Offic.* Palma prunifera Japonica, *Herm. Cat.* Japonica ſpinoſis pediculis Polypodii folio *P. B. P.* Indica caudice in annulos proruberantes diſtincto, fructu Pruniformi, *R. H.* 1360. vinifera Belgarum, *Breyn. Prod.* 1. farinifera Japonica Satecſou Japonenſibus, *Ejuſd. P.* 2. Palmam referens arbor farinifera, *C. B.* Arbor farinifera, *Park.* Todda-panna, ſeu Monta-panna, *H. M.* Sago-Tree, Indan Bread, or Libby-Tree. In India Orientali multis in locis naſcitur. *Uſu.* Fæces medullæ hujus arboris facilè ſolubiles Cari confecta quoad magnitudine referentes, ſapore aquoſo, colore ex fuſco albicante, odoris nullius. Hoc autem modo conficitur

citur *Sagou.* Arbore deciſa & in taleas fiſsâ medulla ruſpando eximitur, quæ in mortario grandi piſtillo ligneo ſtrenuè contunditur; deinde aquâ probè commixtâ, per pannum percolatur, in alveum ſatis capacem, in quem ſubſtantia medullæ defluit. Levioribus duntaxat furfuribus & quiſquiliis in panno remanentibus, quæ ut inutiles abjiciuntur: Quod in alveum decidit ſubſidere permittitur, quod brevi fit: Dein aqua è fæcibus elutriatâ, ex iiſdem efformantur placentulæ, è quibus in clibano coctis Panis efficitur ſatis probus, ab Indigenis in inopia Orizæ eſitatus; vel eædem granulatæ & exſiccatæ in Europæas regiones tranſportantur. *Vires.* A nonnullis valdè nutritiva & analeptica habetur, omniſque generis fluxiones ſiſtere dicitur.

Utrum *Sagou* ſit medulla trunci aut gemmæ alicujus Palmæ ſeu Gummi arboris non amplius quæſtio eſt, medullam eſſe omnibus conſentientibus; verùm cujus generis Palmæ nondum extra controverſiam eſt, inter Botanicos apprimè gnaros, aliis aliam & aliam arborem eſſe opinantibus. *C. Bauhinus* medullam gemmæ ſeu capitis Palmæ Regalis dictæ Barbadenſis ſeu Jamaicenſis The Cabbage-Tree dictæ referentis facit. Quod *Cluſius* & omnes noſtri nuperi perigrinatores negant, medullam trunci eſſe uno ore affirmantes. Neque hîc ceſſat controverſia; ſiquidem *Robertus Knox* nauclerus, qui per multos annos in *Ceylona* Inſula captivus detinebatur, medullam *Codda Panna*, H. M. Talipot *Singalenſibus* dictæ eſſe aſſerit. In cujus ſententiam initio inclinabat eruditiſſimus vir D. *Johannes Raius.* Verùm *Horti Malabarici* autoribus medullam *Toddæ Pannæ* eſſe ex qua *Sagou* conficitur affirmanti-

bus; *Piſone* etiam & *Margravio* duas arborum ſpecies in *Braſilia* naſcentes, & utraſque Palmas deſcribentibus, quarum Medulla ad Panem conficiendum ab indigenis uſitata erat; obvium eſt conjicere plures Palmarum ſpecies *Sagou* præbere. Sed vera genuina ſpecies è medulla *Toddæ Pannæ* conficitur ut *D. Raius* à D. *Tancredo Robinſon*, M. D. certior factus eſt, qui ejus iconem inter alia rariora ad *Societatem Regiam Londinenſem* ex India Orientali tranſmiſſam in ejuſdem Societatis Muſeo, & nos etiam vidimus.

8. Chamærhiphes, *Offic.* Chamærepis, *Theoph.* Palma minor, *C. B.* humilis ſeu Chamæriphes, ſive Palma humilis Hiſpanica ſpinoſa & non ſpinoſa, *J. B. Chab.* folio plicatili ſeu flabelliformi humilis, *R. H.* 1369. humilis ſive Chamærrhiphes vel Palmites, *Park.* Palmites ſive Chamærrhiphes, *Ger.* The Dwarf-Palm. In Hiſpania, Luſitania & Italia creſcit. *Uſu.* Bacca. *Vires.* Contra omnes fluxiones vi ſua adſtringenti commendantur. Folia ad Sportulas, Tegetes & Scopas parandas inciſa ſunt.

9. Palma Sanguis Draconis fundens altera, *Offic.* foliis & caudice undique ſpinis longis acutiſſimis nigris armata D. *Sherard.* The other Dragons-Blood-Tree. In Amboyna oritur. *Uſu.* Reſina è fructu exſtillans.

Ex quo librum priorem in lucem emiſi, literis aliquot ab ingenioſiſſimo illo Botanico D. *Gulielmo Sherard.* LL. D. nunc Conſule Societatis Mercatorum Turicicorum Smyrnenſium certior factus ſum, tres dari ſpecies arborum quæ Sanguinem Draconis præbent. 1. Illam *Cluſii* à me jam editam p. 463, libri ſupradicti quæ

propriè

propriè Palma eſt, & huic Capiti inſeri debet. 2. Quam hîc exhibeo cujus fructus, *Fructui ſquamoſo Cluſii Exot. lib. 2. cap. 3.* ſimilis eſt, Nucis Myriſticæ circiter magnitudine, ſquamis tectus, inter quas & corticem continetur nucleus parvus, qui concuſſo fructu crepitat. 3. Draco arbor, &c. *Hort. Amſtel.* quam inter arbores ſiliquoſas diſpoſui. *Pomet.* etiam in *Hiſtoire de Drogues* p. 259. tres Sanguinis Draconis ſpecies enumerat, quarum primam Indicam vocat, eſtque *Cluſiana* : 2m, Canarienſem appellat, cujus duas icones exhibet diverſarum arborum, quarum prima ſiliquoſa eſt foliorum anguſtiorum, quæ fortè tertia eſt D. *Sherard.* 2dam foliis latioribus depingit, fructu Alkekengi referente. 3tiam *Pometus* falſam vocat & ex Hollandia allatum ait. Quin & *Camellus* S. J. duas Sanguinis Draconis ſpecies memorat, quarum primam *Sanguinis Draconis Officinarum* vocat, qui idem eſt cum *Cluſiano*, cujus gummi *Camellus* ſic deſcribit, *Pulveriſatus coloris eſt vilioris* Laccæ *aut* Boli *ordinariæ*. Unde eum Sanguinem noſtrum Draconis in maſſis ſeu glebis eſſe exiſtimo. Secundum *Sanguinis Draconis Pictorum Cinnabarin Dioſcorides* denominat, qui eſt *Sanguis* noſter *Draconis in guttis* ſeu *guttatus* ; verùm cujus arboris ſuccus ſit non dicit, dubitat tamen an non producatur à quadam Arbore Peruviana à *Monarde* deſcripta. Fortaſſe idem fuerit cum gummi quod à ligno Nephritico defluere dicit. Alia fortaſſe præter has Sanguinis Draconis ſpecies eſt cujus notitiam à D. *Hyde* habuit ingenioſus Botanicus D. *Jacobus Bobart*, à Canna ſeu Arundine hauſti quam in Capite Arundinum in hoc libro diſpoſui. Verùm an differat

differat à *Sherardina* 2da non auſim determinare: Quamvis enim in notis nonnullis deſcriptiones conveniunt, tamen adeò breves ſunt, ut de illis certò judicare aut definire non poſſimus.

Hujus fructum à D. *Sherardo* ex Hollandia, cùm in itinere eſſet verſus Smyrnam accepi & fragmenta quædam ipſius gummi, admodum puri & cum puriſſimo Sanguine Draconis in guttis colore convenientis.

II. *De Muſa.*

1. MUſa, *Offic.* Serapionis, *Ger.* arbor, *J. B. Park.* caudice viridi, fructu longiore, falcato, anguloſo, *Cat. Jamaic.* aut Amhuſa Arabibus, & Perſis Daracht, *Chab.* Muza ex Flore Sinenſi, *Jonſ. D. icon.* Palma humilis longis latiſque foliis, *C. B.* Ficus Indica fructu racemoſo foliis oblongis, *ejuſd.* Indica racemoſa foliis & fructu ampliſſimis, Muſa Arabibus dicta, *P. Alm.* exotica cruciata, *Sterb. Cit. cult.* Ficoides ſive Ficus Indica longiſſimo latiſſimoque folio, Muſa Serapionis dicta, *H. Beaum.* ſeu Ficus Indica longiſſimo latiſſimoque folio, fructu longiſſimo, Muſa Serapionis dicta, *Herm. Cat.* Bala, *H. M.* Bananiera, *Piſ.* Banana Braſilienſibus, *Marcg.* The Plantain-Tree. Utriuſque Indiæ incola eſt. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Multum nutrit, Urinam cit, Venerem ſtimulat.

2. Banana, *Offic.* Muſa, caudice maculato fructu recto, rotundo breviore odorato, *Cat. Jamaic.* Ficoides ſeu Ficus Indica longiſſimo latiſſimoque folio, caule maculato, fructu minore, *H. Beaum.* Senoriæ *Jonſ.* D. Pacoeira *Piſ. Marcg.* The Bonana-

Bonana-Tree. In America colitur. *Usu.* Fructus. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

SECTIO II.

Arbores fructu à flore remoto Glandiferæ.

Pag. 392. poſt lin. 17. adde,

III. *De Fago.*

Notæ ſunt, nux duplex triquetra eidem tegumento incluſa, aſpero, hirſuto, quadripartito. R. Meth. A. p. 140.

A. Fagus, *Offic. C. B. Ger. Park. Chab.* Fagus Latinorum, Oxya Græcorum, *J. B.* The Beech-Tree. In meridionalibus Angliæ frequens. Autumno fructum fert. *Usu.* Folia. *Vires.* Tuſa & impoſita calidis tumoribus prosunt eaſque diſcutiunt, & torpentia membra corroborant. Eſitata labiorum, gingivarumque vitiis mirificè opitulantur. *Matth.*

V.

V. *De Quercu.*

Pag. 393. poſt lin. 19. adde,

2. PHagus & Eſculus, *Offic.* vel Eſculus, *J. B. Chab.* ſive Eſculus, *Park.* Quercus parva ſive Phagus Græcorum & Eſculus Plinii, *C. B.* Eſculent or Sweet Oak. In Græcia & Dalmatia reperitur. *Uſu.* Cortex, Folia, Glandes, Caliculæ. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

3. Cerrus & Ægilops, *Offic.* Cerrus, Corris, Ægilops Idæorum, Aſpris Macedonum, & Farnia Italorum, *Chab.* Cerrus Ægilops Aſpris Theophraſti putata, *J. B.* Cerris majore glande, *Ger.* Ægylops ſive Cerrus mas majore glande, *Park.* Quercus calyce echinato glande majore, *C. B.* The Holm-Oak, or Bitter Oak. In Italia naſcitur. *Uſu.* Radix, Folia, Cortex, Glandes. *Vires.* Radix Scorpionibus adverſatur. Folia, Cortex & Glandes fluxiones ſiſtunt.

4. Robur, *Offic.* tertia Cluſii, *J. B.* ſive Galla major altera, *Ger. emac.* ſive Quercus cum Gallis, *Chab.* cum Galla majore rugoſa, *Park.* Quercus gallam exiguæ nucis magnitudine ferens, *C. B.* The Gall-Oak. In Iſtria & Pannonia creſcit. *Uſu.* Gallæ ſeu tubercula excrementitia, nidus cujuſdam Inſecti rotundi.

VI. *De Ilice.*

Cujus notæ, Folia dentata aut aculeata, perpetua. R. Meth. A. p. 140.

Pag. 394. poſt lin. 13. adde,

2. Smilax arborea, *Offic.* Arcadum glandifera major, *Park.* glandifera arbor, *Chab.* Daléchampii, *J. B.* Ilex arborea, *ejuſd.* & *Chab.* major glandifera, *Ger.* major aculeata & non aculeata, *Park.* oblongo ſerrato folio, *C. B.* folio rotundiore molli modiceque ſinuato, ſive Smilax Theophraſti, *ejuſd.* The Great Scarlet Oak. In Italia & Gallia Narbonenſi frequens occurrit. *Uſu.* Cortex, Folia, Glans. *Vires.* Vehementiùs aſtringit Ilex quàm Quercus.

3. Phellodrys, *Offic. Chab.* alba latifolia & anguſtifolia, *Park.* candicans latifolia, molliter aculeata & candicans anguſtifolia ſerrata, *C. B.* Nigra Daléchampii, *J. B.* The Laurel-Oak. In Dalmatia & Græcia reperitur. *Uſu.* Folia, Cortex, Glans. *Vires.* Cum Quercu viribus convenit.

Arbores

Arbores fructu à flore remoto Coniferæ.

VIII. *De Abiete.*

Pag. 396. lin. ult. ſubjunge,

AB ingenioſo amico meo D. *Davide Kreig*, M. D. certior factus ſum ſolam differentiam inter Reſinam & Picem Burgundicam eſſe in coctione Picis Burgundicæ, ex aheno exemptæ cùm primùm bullire incipit, atque idcircò mollior eſt, & coloris magis brunnei. Hoc obſervavit in *Saxonia* ſolo ſuo natali.

IX. *De Pinu.*

Pag. 398. poſt lin. 4. adde,

3. PInus maritima, *Offic.* ſylveſtris montana, *Ger.* maritima major, *ejuſd.* & *C. B.* maritima Theophraſti Lobelio, *J. B. Chab.* ſylveſtris maritima, conis firmiter ramis adhærentibus, *ejuſd.* & *J. B.* Sea-Pine. In Gallia Narbonenſi oritur. *Uſu.* Cortex, Folia Reſina. *Vires.* Cum præcedentibus viribus convenit.

Pag. 400. poſt lin. 8. adde,

XIV. *De Arbore Vitæ.*

NOtæ ſunt Folia ſquamatim incumbentia, ramuli compreſſi, conuli oblongi è ſquamis compoſiti. R. Meth. A. p. 138.

Arbor vitæ, *Offic. Ger. Park.* vitæ ſive Paradiſiaca, *Chab.* vitæ ſive Paradiſiaca vulgò dicta, odorata ad Sabinam accedens, *J. B.* Thuya Theophraſti, *C. B.* The Tree of Life. Americæ incola eſt, apud nos autem in hortis curioſorum reperitur. *Uſu.* Folia. *Vires.* Digerit & abſtergit, partium eſt tenuium.

XV. *De Alno.*

ARbor eſt Julifera, fructu ſquamoſo conoide, folio Coryli. R. Meth. A. p. 138.

A. Alnus, *Offic. Ger. Chab.* vulgaris, *J. B. Park.* rotundifolia glutinoſa viridis, *C. B.* The Alder-Tree. In aquoſis gaudet. *Uſu.* Cortex, Folia. *Vires.* Cortex ſiccat & aſtringit. Folia viridia impoſita rumores diſcutiunt & inflammationes reſtinguunt. Traumatica ſunt internè ſumpta.

Arbores

Arbores Flore à fructu remoto Bacciferæ.

XVII. *De Junipero.*

Pag. 401. lin. ult. ſubjunge,

2, JUniperus major, *Offic.* major baccâ cœruleâ, *C. B.* maxima, *Ger.* maxima Illyrica, *Park. J. B. Chab.* The Black Juniper. In Græcia provenit. *Uſu.* Lignum, Baccæ. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

XVIII. *De Oxycedro.*

NOtæ ſunt Folia Cupreſſina; terna in unoquoque acino oſſicula dura. R. Meth. A. p. 141.

1. Oxycedrus, *Offic.* Lycia, *Ger.* Cedrus folio Cupreſſi major, fructu flaveſcente, *C. B.* folio Cupreſſi media majoribus baccis, & folio Cupreſſi minor, *ejuſd.* Lycia retuſa Bellonio dicta *J. B.* ſive Oxycedrus Lycia, *Chab.* Phœnicea folio Cupreſſi, *Park.* Juniperus folio Cupreſſi major fructu flaveſcente, *Herm. Cat.* major Dioſcoridis Cluſio, *P. Al.* folio Cupreſſi media majoribus baccis teretiſolia, *ejuſd.* Berry-bearing Cedar. In Hortis Botanicorum reperitur. *Uſu.* Lignum, Bacca. *Vires.* Cum Junipero ut in externa facie, ita in viribus convenit.

2. Sa-

2. Sabina baccifera, *Offic. Ger. Park J. B.* baccifera major, *Park.* folio Cupreſſi, *C. B.* folio Cupreſſi altera, *ejuſd.* Cedrus baccifera fructu minore cœruleo, *R. H.* Juniperus Alpina, Sabinam referens, *P. Al.* Berry-bearing Sabine. In hortis curioſorum nonnunquam colitur. *Uſu.* Folia. *Vires.* Cum Sabina viribus convenire creditur.

XIX. *De Taxo.*

Notæ ſunt, Folia molliora, ſaturo virore prædita, pectinatim circa ramulos diſpoſita; Baccæ unicum intùs granum continentes. R. Meth. A. p. 141.

A. Taxus, *Offic. Ger. C. B. J. B. Park. Chab.* The Yew-Tree. In montoſis ſylvis & ſepibus. Quæ de facultate venenoſa & lethifera hujus arboris apud veteres habentur, an vera ſint necne contraria recentiorum experimenta dubium faciunt. *R. Synop. vid. ejuſd. Hiſt. p.* 1416.

Arbores

Arbores flore à fructu remoto Lanigeræ.

XX. *De Populo.*

Pag. 402. poſt lin. 13. adde,

A. 2. Populus alba, *Offic. Ger. Park. Chab.* alba folio majore, *Jonſ.* D. alba λεύκη, *J. B.* alba (quæ λεύκη ab albedine dicitur) majoribus foliis, *C. B.* The Abele or White Poplar. In aquoſis gaudet. *Uſu.* Cortex. *Vires.* In dolore Iſchiadico, intùs & extrà, in Stranguria, & in ambuſtis adhibetur. *R. Synop.*

A. 3. Populus tremula, *Offic. C. B.* tremula ſive Libyca, *Jonſ.* D. Libyca, *Ger. Park.* Libyca Plinii, κάρπις Theophraſti, *J. B.* Libyca Cercis Theophraſti, *Chab.* The Aſp or Aſpen-Tree. In ſylvis & locis uliginoſis. *Uſu.* Folia. *Vires.* Cum Populo nigro viribus convenire creditur.

XXI. *De Salice.*

Pag. 403. lin. 3. adde,

A. 2. Salix rubens, *Offic.* vulgaris rubens, *C. B.* anguſtifolia purpurea ſeu nigra, *Park.* rubra minimè fragilis folio longo anguſto, *J. B. Jonſ.* D. *Chab.* folio utrinque glauco, viminibus rubris, *C. C. Cat. Angl.* Common Red-Willow. In aquoſis gaudet. *Uſu.* Folia, Cortex, *Vires.* Cum priore viribus convenit.

A. 3.

A. 3. Salix helice, *Offic.* helicè Theophraſti, *Park.* roſea, *ejuſd.* roſea Anglica, *Ger.* humilis capitulo ſquamoſo, *C. B.* tenuior, folio minore utrinque glabro fragilis, *J. B. Jonſ. D. Chab.* humilior foliis anguſtis ſubcœruleis ex adverſo binis, *R. H. R. Synop.* Yellow Dwarf-Willow. Juxta torrentes creſcit.

A. 4. Salix nigra, *Offic.* folio Amygdalino utrinque virente aurito, *C. B. Jonſ. D.* Spontanea Amygdalino folio fragilis auriculata, *J. B. Chab.* vimipalis nigra, *Park.* folio ſplendente auriculato flexilis, *C. C. Cat. Angl. R. H. R. Synop.* Shining-Willow. In Salicetis repetitur.

Arbores Flore à fructu remoto Vaſculiferæ.

XXII. *De Oſtry.*

Notæ cujus ſunt, Putamen fructûs alatum ſeu ligulâ foliaceâ auctum; folia Ulmi aut Fagi. R. Meth. p. 140.

A. Oſtrys, *Offic.* ſive Oſtria, *Park.* Oſtrya Ulmo ſimilis, fructu in umbilicis foliaceis, *C. B. Jonſ. D.* Fagus ſepium. *Chab.* ſepium vulgò, Oſtrys Theophraſti, *J. B.* Carpinus Matthioli, *Herm. Cat.* Betulus ſive Carpinus, *Ger.* Aceri cognata foliis oblongis rugoſis ſerratis, ad Ulmum accedentibus, vaſculis disjunctis, membranis foliaceis, ſeminibus ipſis appoſitis pluribus confertis, *P. Al.* The Horn-Beam. In ſylvis & ſepibus. De Uſu ejus in medicina nihil invenio apud Authores.

SECTIO

SECTIO III.

De Arboribus Flore fructuque aggregato.

I. *De Ficu.*

Pag. 404. poſt lin. 14. adde,

2. Caprificus, *Offic. Ger. Park. J. B.* Ficus ſylveſtris Dioſcoridi, *C. B.* ſylveſtris, ſive Caprificus, *Jonſ. D.* The wild Fig-tree. In Græcia aliiſque calidis locis reperitur. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Cum Sativa viribus convenit.

3. Ficus Indica, *Offic. J. B.* Indica Orientalis, *Jonſ. D.* Indica, Arbor radicum Indiæ, *Chab.* Indica arcuata, *Park.* Indica foliis Mali Cotonei ſimilibus, fructu ficubus ſimili, ex Goa, *C. B.* Arbor ex Goa ſive Indica, *Ger.* Katou-Alou, *H. M.* The Indian Fig-tree. In India Orientali oritur. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Cum Sativa viribus polleт.

4. Sycomorus, *Offic. J. B. Ger. Chab.* Ægyptia, *Jonſ. D.* ſive Ficus Ægyptia, *Park.* Ficus folio Mori Fructum in caudice ferens, *C. B.* The Egyptian Sycomore. In Ægypto & alibi reperitur.

ritur. *Uſu.* Fructus, Lacryma. *Vires.* Fructus refrigerat, & humectat, ventriculum laxat, & ſubvertit; tumores duros ſanat. Lacryma peſti & venenis adverſatur.

5. Ficus Cypria, *Offic. J. B.* folio Sycomori, fructum non in caudice gerens, *C. B.* ſylveſtris Cretica folio non diviſo leviter crenato, *T. Coroll.* Sycomorus, Cypria, *Chab. Fonſ.* D. altera ſive Ficus Cypria, *Park.* The Cyprian Sycomore-Tree. In Inſula Cypro naſcitur. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Cum priore convenit.

Pag. 407. lin. ult. ſubjunge,

V. *De Alypo.*

ALypum, *Offic.* montis Ceti, *Ger.* Monſpelienſium ſive Herba terribilis, *Park.* Monſpelienſium ſive frutex terribilis, *J. B.* Frutex terribilis, Empetrum, Alypum Monſpelienſium, *Chab.* Thymelæa foliis acutis capitulo Succiſæ, *C. B. Fonſ.* D. Scabioſa fruteſcens Myrtyfolia, Flore cæruleo villoſo, *P. Al.* Globularia fruticoſa Myrtifolio tridentato, *El. Bot.* Gut-wort, Herb-terrible. In monte Ceti oritur. *Uſu.* Folia. *Vires.* Vim cathartícam vehementem obtinet, nec minus violenter purgat bilem, pituitam & aquas quam Tithymalus, *J. B.*

SECTIO

SECTIO IV.

De Arboribus fructu umbilicato

De Pomiferis umbilicatis.

IV. *De Sorbo.*

Pag. 412. poſt lin. 15. adde,

A. 2. Ornus, *Offic.* ſive Fraxinus ſylveſtris, *Park.* Sorbus aucuparia, *J. B.* aucuparia, Ornus aucuparia, *Chab.* ſylveſtris ſive Fraxinus bubula, *Ger.* ſylveſtris ſoliis domeſticæ ſimilis, *C. B.* ſylveſtris pinnatis anguſtioribus foliis, undique glabris, fructu parvo miniato, *P. Al.* The Quitchen-Tree. In montoſis & uliginoſis oritur. Maio floret. Septembri fructum maturat. *Uſu.* Fructus: Liquor è vulnere exſtillans. *Vires.* Fructus Hydragogum egregium præbet, in Scorbuto ſanando aptum, D. *Needham.* Liquor aſſiduè potus ad ſcorbuticos & ſpleneticos affectus à nonnullis commendatur *R. H.*

V. D

V. *De Meſpilo.*

Pag. 413. poſt lin. 4. adde,

A. 2. Aria, *Offic.* Theophraſti, *Ger.* Sorbus Alpina, *J. B. Chab.* ſylveſtris Aria Theophraſti dicta, *Park.* Meſpilus Alni lanato folio major, *Herm. Cat.* Alni folio ſubtus incano Arla Theophraſti dicta, *R. Synop.* Alni effigie, lanato folio major, *C. B.* The white Boam-tree. In montibus ſylvoſis & petroſis. Aprili floret. *Uſu.* Fructus *Vires.* Tuſſes Jujubarum inſtar lenit, & ſputum promovet.

3. Dioſpyrus, *Offic. J. B.* Meſpilus Alni lanato folio minor, *Herm. Cat.* folio rotundiore, fructu nigro ſubdulci, *El. Bot.* Alni effigie lanato folio minor, *C. B. Jonſ. D.* Pyrus cervina Italis, *R. H.* 1461. Vaccinia alba, *Ger.* Vitis Idæa tertia Cluſii, *Park.* White Whortles. In Alpibus & montoſis. Maio floret. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Cum præcedente viribus convenit.

4. Pyracantha, *Offic. Park.* quibuſdam, *J. B.* ſeu Oxyacantha quibuſdam, *Chab.* Oxyacantha Theophraſti, *Ger.* Dioſcoridis ſive Spina acuta Pyrifolio, *C. B.* Meſpilus Pyrifolia, *Jonſ. D.* Spinoſa Pyrifolia, *Herm. Cat.* aculeata Pyrifolia, *El. Bot.* Ever-green Thorn. In hortis colitur. *Uſu.* Baccæ. *Vires.* Cum Spina alba viribus convenit.

VI. *De Cratego.*

FOliis laciniatis floribus eoſque ſequentibus fructibus umbellatim congeſtis, oſſiculis intus duris à reliquis differt.

A. 1. Sorbus torminalis, *Offic. Ger.* torminalis ſeu vulgaris, *Park.* torminalis & Crategus Theophraſti, *J. B.* torminalis Plinii Crategus Theophraſti, *Chab.* Meſpilus Apii folio ſylveſtris non ſpinoſa, ſeu Sorbus torminalis, *C. B.* Apii folio ſylveſtris, non ſpinoſa, aliis Sorbus torminalis Crategus Theophraſti, *Jonſ. D.* The wild Service or Sorb-tree. In Sepibus. Maio floret, Septembri fructum maturat. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Refrigerat & adſtringit, fluxus alvi ſiſtit.

2. Aronia, *Offic.* Meſpilus aronia, *Ger.* aronia veterum, *J. B. Chab.* aronia ſive Neapolitana, *Park.* Apii folio laciniato, *C. B. Jonſ. D.* folio laciniato ſpinoſa fructu majore eſculento, *R. H. p.* 1458. The Neapolitan Medlar. In hortis curioſorum apud nos colitur. Maio floret. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Moderatè alvum conſtringit.

VIII. *De Arbore Febrifuga Peruviana.*

Pag. 415. lin. ult. ſubjunge.

PEruviani Corticis uſus in Officinis probè cognitus eſt. Verùm cujuſnam arboris ſit, eruditis nondum ſatisfactum eſt. In priori meo libro varias de ea opiniones, quæ mihi tum occurrebant exhibui. Poſt opuſculum illud editum, in *Itinerario Waferi* qui profeſſione Chirurgus erat, invenio ſequentem de eo narrationem.

Aricæ (inquit Autor iſte) in Peruvia magnam hujus Corticis quantitatem vidi, & ab Hiſpano quodam edoctus ſum corticem fuiſſe arboris *Mangles* aquarum dulcium quæ in lacu magno regionis iſtius naſcebatur.

Verum Hiſtoria ſeu Relatio hæc multum ſuperatur ab alia in *Actis Philoſophicis Londinenſibus* N.

290.

290. tradita à D. *Gulielmo Oliver*, M. D. ab ingenioſo Pharmacopœo *Gadibus* in *Hiſpania* degente, qui in Peruvia diu vixerat, eumque corticem ſæpius collegerat, accepta: quam quoniam Arboris deſcriptionem continet, Latinam facere & huc transferre non gravabor.

Cortex Peruvianus ab arbore deſumitur Pruni circiter magnitudine, foliis hederaceis, ſed paulò minoribus, ſemper virentibus. Autumno colligitur, & cortex circumcirca delibratur tam trunci quàm ramorum, qui quatuor menſium ſpatio iterùm ſuccreſcit Suberini in modum. Fructum fert Caſtaneæ non abſimilem (excepta exteriore teſta ſeu tegmine) qui propriè appellatur China-China, & ab indigenis pluris æſtimatur quàm Cortex à trunco aut ramis detractus. Sorbi ſpeciem eſſe Arborem hanc febrifugam Peruvianam affirmat D. *Tancred Robinſon*, M. D. ex relationibus Itinerantium in Americâ Auſtrali.

IX. *De Opuntia.*

Notæ ſunt, Fructus carnoſus, pulpâ humidâ, multa ſemina includens. Verùm ab aliis quibuſcunque plantis abundè diſtinguitur ex modo naſcendi; folio enim plantatur, & ex meris foliis, aliis ex aliis enaſcentibus, conſtat. Flos etiam & fructus è folio emergit. R. Meth. A. p. 144.

1. Opuntia, *Offic.* vulgò Herbariorum, *J. B.* Ficus Indica, *Ger.* Indica major, *Park.* Indica folio ſpinoſo fructu majore, *C. B.* Indica *Tuna* dicta, ſive Opuntia ſola hirſute pungens. *P. Al.* Tuna Indorum, *Jonſ. D.* The prickly Pear-tree. In utraque India naſcitur. *Uſu.* Fructus, folia. *Vires.* Refrigerant & humectant, Febres ardentes extinguunt, ſitim ſedant.

2. Cochinillifera, *Offic.* Ficus Indica major lævis ſive non ſpinoſa, Vermiculos quos Cochinilla vocant proferens, *P. P. Tab.* 281. *Fig.* 2. Arbor Cochenille, *Duret.* Nocheznopatli ſeu Nopalnocheztli in quo Coccus Indicus naſcitur, *Hern.* Nepalnocheteli ſeu Nochetzli Nopalli, *Jonſ. D.* An Opuntia maxima, folio oblongo rotundo majore, ſpinulis obtuſis mollibus & innocentibus obſito, flore ſtriis rubris variegato *Cat. Jamaic.?* The Cochineal-tree. In America reperitur. *Uſu.* Vermiculi; de quibus vide *Pharmacologiam noſtram, p.* 539. & *Act. Philoſoph. Lond.* N. 193. & N. 292.

Bacciferæ Umbilicatæ.

X. *De Loto arbore.*

A Ceraſo differt foliis Urticæ quodammodo ſimilibus, fructibus in ſingulis foliorum alis ſingulis, cùm in Ceraſo plures ex eodem nodulo ſeu gemma erumpant, carne paucâ, oſſiculo velut quadripartito. R. Meth. A. p. 150.

Lotus arbor, *Offic. Ger. Park.* Lotus fructu Ceraſi, *C. B.* arbor fructu Ceraſi, *J. B. Chab.* domeſtica, *Jonſ. D.* Celtis fructu nigricante, *El. Bot.* The Nettle tree. In Italia & Francia reperitur. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Adſtringit & avum ſiſtit, maturus minus. Decoctum Dyſentericis Fœminiſque profluvio laborantibus confert.

Pag. 418. lin. ult. ſubjunge,

XV. *De Vaccinio.*

FRutice parvo, flore urceolum referente, fructu humido parvo, non racematim naſcente innoteſcit, R. Meth. A. p. 145.

1. Vitis Idæa, *Offic.* Idæa foliis carnoſis & velut punctatis, *Jonſ. D.* Idæa foliis carnoſis & velut punctatis, ſive Idæa radix Dioſcoridis, *C. B.* Radix Idæa putata, & Uva Urſi, *J. B. Chab.* Vaccinia Urſi, ſive Uva Urſi apud Cluſium, *Germac.* Uva Urſi, Galeni Cluſio, *Park.* Spaniſh Whortles. In Italia, &c. reperitur. Maio floret. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Alvum menſeſque & omnem abundantiam Sanguinis ſiſtit. *Dioſc.*

A. 2. Myrtyllus, *Offic. Volck.* Vitis Idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante, *C. B.* Idæa fructu nigro, *J. B.* Vaccinia Pannonica ſive Vitis Idæa, *Ger.* nigra Pannonica, *Park.* rubra foliis Myrtinis criſpis, *Mer. Pin.* rubra foliis Myrtinis criſpis D. Merret, *R. H. Synop. Cat. Plant. Angl.* Black Whortles. In ſaxoſis. Maio floret. *Uſu.* Baccæ, *Vires.* Frigidæ ſunt, & cum manifeſta adſtrictione reficcant. Ventriculo æſtuanti conveniunt, ſitim ſedant, febrium calores mitigant, alvum reprimunt, vomitum ſiſtunt, adverſus choleram morbum proſunt. *Dod.*

Pag. 419. poſt lin. 20. adde,

XVII. *De Oſyride.*

NOtæ ſunt, Folia Linariæ, flores Ribis fructus ſive bacca rotunda, cum unico intus oſſiculo. R. Meth. A. p. 147.

Oſyris, *Offic.* Plinio, *R. H. p.* 1489. fruteſcens baccifera, *C. B.* Caſſia poetica Lobelii, *Ger.* poetica Monſpelienſium, *Park.* lignea Monſpelienſium, *J. B.* Poets Roſemary. In Italia & Gallia Narbonenſi oritur. Maio floret. *Uſu.* Totus frutex. *Vires.* Adſtringentem facultatem obtinet.

Pag. 422. poſt lin. 13. adde,

XX. *De Lauro Tino.*

NOtæ ſunt, Flos monopetalos quinquepartitus; fructus Olivæ figurâ, magis acuminatâ, monoſpermos, cortice parùm carnoſo; ſemen pellicula cartilagineâ tectum. R. Meth. A.

Laurus Tinus, *Offic. Ger.* Tinus, Laurus ſylveſtris, *Chab.* Tinus Luſitanica cœruleâ baccâ, *Park.* Sylveſtris Corni fœminæ foliis ſubhirſutis, *C. B.* Lauri Tini ſylveſtris primum genus, *J. B.* Tinus prior Cluſii, *El. Bot.* Wild Bay. Luſitaniæ incola eſt. Julio & Auguſto floret. *Uſu.* Baccæ. *Vires.* Intro aſſumptæ purgant deorſum non levi totius corporis perturbatione. *Park.* Mezereonis aut Laureolæ baccæ os & fauces inflammant.

SECTIO

SECTIO VI.

De Arboribus Pruniferis.

Pag. 440. lin. ult. ſubjunge,

VIII. *De Nuce Virginiana.*

Foliis Laurinis ſeu glabris & ſplendentibus; fructu parvo turbinato, pulpam paucam continente, à reliquis Pruniferis differt.

Nux Virginiana, *Offic.* Prunifera vel Nucifera ſeu Nuciprunifera arbor Americana præcelſa anguſtis Lauri foliis latè virentibus, Maſtichen odoratam fundens, *P. P. Tab.* 217. *fig.* 5. *Cat. Jamaic. R. D. p.* 44. The Virginia-Nut. In Inſula Barbados reperitur. *Uſu.* Officulum nuclei Avellanæ magnitudine circiter & figurâ eſt, glabrum colore fuſco cum hilo prope alterum extremum, durum officulum continens nucleo intus albo globulari, ſapore amariuſculo, eóque & odore aromatico. *Vires.* Obſtructiones hepatis potenter reſerat, totamque Sanguinis maſſam depurat, & Scorbuticum malumque habitum corporis emendat, volatilibus illis ſalibus vitalem hunc liquorem imprægnando, quæ eum evanidum & langueſcentem ad puriorem ſpirituoſiorem ſtatum reſtituit, adeóque à fixatione eum præ-

ſervat. Cutem etiam à maculis aliiſque impuritatibus liberat. *Marl. ob.*

Paradoxum alicui fortaſſe videre poſſit, quòd ego fructum hunc pro *Marlovii* Nuce Virginiana exhiberem, cùm ruſticus ille medicus, qui primus virium ejus deſcriptionem ad D. *D. Croon* tranſmiſit, diſertè affirmet eum fructum eſſe *Locus* arboris quæ *Gummi Animæ* præbet: De quo Gummi ſuperiùs tractavi in Libro meo priore *p.* 506. Cui reſpondeo, cùm D. *Marlow* primus fuerit, qui obſervationem hanc publicaverit, concedendum eſt, veriſimillimum eſſe illum quid nomine illo intelligeret omnium optimè noviſſe; ideóque, cùm fructum illum hoc titulo propriâ ipſius D. *Marlow* manu ſubſcriptum apud D. *Finch* invenerim, non veritus ſum eum abſque omni ſcrupulo hîc collocare. Præterea, addi poteſt, quòd cùm hæc etiam arbor gummi præbeat Animæ non abſimilem, occaſionem errandi medico prædicto potuerit ſubminiſtrare.

X. *De Myrobalanis.*

Pag. 443. lin. 26. verbo [anguloſum] junge,

FAba Bengalenſis, *Offic. R. D. p.* 134. Bengala Bean dicta, excreſcentia rugoſa, rotunda, compreſſa, cava, umbilici in modum, magna, foris fuſca, intùs nigricans, ſaporis ſtyptici & aſtringentis, odoris nullius. *Vires.* Aſtringit fortiter, & ad omnes hæmorrhagias, præſertim ad hæmoptyſin ſiſtendam, ſummè utilis, Sanguinem modicè incraſſans, venarum & arteriarum oſcula obdurans, & rupturas conſolidans, humores acres

cres & erodentes mitigans & contemperans. *Marloe.*

D. *Marloe* prædictus primus erat, quod sciam, qui exoticum hoc medicamentum, ejusque usum Orbi literato publicavit sub ænigmatico nomine *Fabæ Bengalensis.* Unde nonnulli *fructum ex Bengala, &c. Clusii exot. lib. 2. cap. 14.* esse opinati sunt. Alii Myrobalani quandam speciem, alii denique florem Myrobalani Citrini, quia persæpe inter fructus illos invenitur. Mihi excrescentia quædam esse videtur ex punctura insecti cujusdam excitata; aut magis propriè fructus Myrobalani citrini ipse vulneratus, qui venenati hujusmodi ictûs occasione monstrosam hanc formam assumit. Ipse Prunos sæpissimè observavi hujusmodi ictu ob insecto quodam inflicto formam naturalem amisisse, & cavos intùs fieri absque ullo officulo.

XI. *De Jujuba.*

Pag. 445. post lin. 9. adde,

2. OEnoplia, *Offic.* spinosa & non spinosa, *Germ. emac. C. B.* spinosa & non spinosa, sive Napeca, sive Zizyphus alba, *Park.* sive Nabca, Paliurus Africana, *Chab.* Nabca folio Rhamni vel Jujubæ, *J. B.* The great Jujube. In Ægypto, Creta, & alibi incola est. *Usu.* Fructus. *Vires.* Fructus immaturus astringit, stomachi alvique relaxationem firma. Succus maturarum purgat bilem è ventriculo.

XIV. *De Olea.*

Pag. 448. poſt lin. 9. adde,

2. OLeaſter, *Offic.* ſive Olea ſylveſtris, *Park. J. B. Chab.* Olea ſylveſtris, *Ger.* ſylveſtris ſive Oleaſter, *Jonſ. D.* ſylveſtris folio duro ſubtus incano, *C. B.* The wild Olive-tree. In Italia, Hiſpania, aliiſque locis ſpontanea oritur. *Uſu.* Folia *Vires.* Cum Oliva ſativa viribus convenire creditur.

Pag. ead. lin. ult. ſubjunge,

XV. *De Saponaria Arbore.*

NOtæ ſunt, Flos roſaceus; fructus ſphæricus, nucu â fœtus pariter ſphæricâ, nucleum condente ejuſdem formæ. R. Meth. A. p. 151.

Arbor ſaponaria, *Offic.* ſaponaria Americana, *R. H. p.* 1548. prunifera, racemoſa, folio alato, coſtâ mediâ membranulis utrinque extantibus donatâ, fructu ſaponario, *Cat. Jamaic.* ſeu Nuciprunifera fructu ſaponario, orbiculato, monococco, nigro, Americana, *P. P. Tab.* 217. *fig.* 7. Quity, *Piſon.* Braſilienſibus, *Marcg.* ſaponariæ ſphærulæ, *Chab.* ſphærulæ arboris Filicifoliæ, *J. B.* Nuculæ ſaponariæ non edules, *C. B.* Arbor Miſtecæ provinciæ fructu avellanæ ſimili, *Laet. Jonſ. D.* Baccæ Bermudenſes *Marl. Obſ.* Soap-Berries. In Inſula Jamaica & alibi Indiæ occidentalis oritur. Octobri fructus matureſcit.

Uſu.

Uſu. Fructus cùm jam ſiccus ſphæricus, coloris ex rubentis, Galla minor, hilo amplo, ſapore amar o, odore nullo; unicum rotundum nigrum oſſiculum continens. *Vires.* Multum commendantur adverſus chloroſin, *Marl. Obſ.* Baccæ ad chloroſin ſingulare & ſpecificum medicamentum ſunt, poſt chalybeata incaſſum uſurpata, morbum illum debellantes & ſanantes. Spiritus, tinctura, aut extractum exhibenda ſunt potiùs quàm baccæ crudæ, *R. D. p.* 134.

Europæus horum uſus in medicina à D. *Marlot* orbi literato primùm communicatus eſt, per modum Epiſtolæ à medico quodam ruſtico ad egregium Virum D. *Boyle* ſcriptæ. Verùm cùm nomen hoc adeò ænigmaticum eſſet ut difficulter conjici poſſet quid eſſent: & duo ex Amicis meis quos ſuper hac re conſului, de iis diverſum ſentirent, uno Palmæ cujuſdam ſemina eſſe opinante; altero hujus arboris fructus in cujus opinione confirmatus fui à prædicto D. *Finch*, qui me eorum nonnullis, è ciſtula propriâ D. *Marloe* manu Bermudas-Berries inſcripta deſumptas donavit.

XVI. *De Pado.*

Notæ ſunt, folia ad Salicis latifoliæ potiùs quàm ad Ceraſi folia accedunt, fructus racemoſi Ceraſis ſimiles; oſſiculum tamen oblongum, ſcabrum, ſecus quàm in Ceraſis. R. Meth. A. p. 150.

A. 1. Padus, *Offic.* Ceraſus avium nigra & racemoſa, *Ger.* racemoſa fructu non eduli, *C. B.* racemoſa ſylveſtris, *Tonſ. D.* racemoſa quibuſdam, aliis

aliis Padus, *J. B. Chab.* avium racemosa, *Park.* Birds-Cherry. In montosis & Alpinis nascitur. *Usu.* Fructus. *Vires.* Ad Epilepsias puerorum appensus collo commendatur.

2. Mahaleb, *Offic.* Macaleb Gesneri, *Ger.* Machaleb Germanicum, *Park.* Cerasus sylvestris amara, Mahaleb putata, *J. B.* sylvestris amara, Arabum Mahaleb putata, *Chab.* Cerasso affinis, *C. B. Jonst. D.* Rock-Cherry. In petrosis montibus oritur. *Usu.* Nuclei. *Vires.* Calfaciunt, emolliunt. *Matth.*

XVII. *De Lauro-cerasо.*

Fructu racemoso, ossiculo longiore, tenuiore, à Cerasо foliis amplis, crassis, semper virentibus, ab eadem & aliis differt. R. Meth. A.

Lauro-cerasus, *Offic. Ger. J. B.* Clusii, *El. Bot.* Cerasus folio Laurino, *C. B.* Cerasus Trapezuntina, sive Lauro-cerasus, *Park.* Lauro-cerasus Laurus Trapezuntina, *Chab.* Laurel or Cherry-Bay. In hortis nostris frequentissima. Maio florer. *Usu.* Baccæ. *Vires.* Ad Scorbutum à nonnullis commendantur.

XVIII. *De Pèrsea.*

Fructu pyriformi, racematim cohærente, nucleum cordis effigie continente, foliis Lauri similibus à reliquis differt.

Persea, *Offic. C. B. J. B. Jonst. D.* arbor, *Ger.* arbor Clusii, *Park.* Laurus Indica, *Aldin.* Pruniferа arbor, fructu maximo pyriformi, viridi, pericarpio

pericarpio esculento butyraceo, nucleum unicum maximum, nullo officulo tectum, cingente, *Cat. Jamaic.* Ahvacaquanhitl seu arbor querciformis butyraceo fructu, *Hern. Fonſ. D.* Pyrosimilis fructus in Nova Hiſpania nucleo magno, *C. B.* Pyrifacie Aguacat, *J. B.* Nicaraguæ pomum nuce rotunda, *ejuſd.* pomum, *Chab.* Mala Americana pyri facie, *C. B.* Spaniſh-Pear. Inſulæ Jamaicæ indigena eſt. *Uſu.* Folia, Fructus. *Vires.* Fructus Stomacho eſt utilis, Folia arida pulveriſata illitu ſanguinis eruptiones ſiſtunt. *Dioſc.*

XIX. *De Manga.*

NOtæ ſunt, folia bina, terna, aut quaterna eodem pediculo, Flos racematim, fructus magnus reniformis.

Manga, *Offic.* Indica fructu magno reniformi *R. H. p.* 1550. Mangas, *Park.* ſive Amba, *J. B.* Amygdalam referens fructus hirſutus, *Ejuſd.* Mangas & Amba Linſchotani, *Chab.* domeſtica, *P. Al.* Perſicæ ſimilis putamine villoſo, *C. B.* Manga, Amba, Ambo, & Ambe, *Camel. Syllog.* Arbor mangifera, *Bont. Jonſ. D.* Conchifolia Indiæ orientalis comantibus Floribus & ferè corymboſis, *P. P. Tab.* 142. *fig.* 1. Mao ſive Mau, *H. M.* The Mango-tree. In India orientali oritur. *Uſu.* Fructus muriâ conditus: Officula. *Vires.* Fructus conditus frigidus & humidus eſt. Officulis aſſatis alvi profluvia ſiſti aiunt.

SECTIO

SECTIO VII.

De Arboribus Bacciferis.

Arbores & Frutices Bacciferæ fructu monopyreno.

Pag. 455. adde,

I. *De Zizypha.*

NOTÆ *ſunt, folia longa, mollia, alternatim poſita, flos monopetalos, tubulatus, in ſex partes diſſectus; fructus oblongus, olivæformis.*

Zizypha, *Offic.* Cappadocica, *Ger.* Cappadocica, quibuſdam Olea Bohemica, *J. B. Chab.* Olea ſylveſtris folio molli incano, *C. B.* Oleaſter Cappadocicus, *Park.* Elæagnus orientalis anguſtifolius, fructu parvo olivæformi, ſubdulci, *T. Coroll.* Wilde Jujube. In Bohemia, Hiſpania, &c. reperitur. Æſtate floret. *Uſu.* De uſu & viribus nil invenio.

II. *De*

II. *De Arbuto.*

FLore urceolari insignis; fructu carnoso, eduli, in quinque loculamenta partito, seminibus aliquot adnascentibus onusta, à reliquis differt. R. Meth. A. p. 155.

A. 1. Arbutus, *Offic. Ger. Park.* Arbutus Comarus Theophrasti, *J. B. Chab.* folio serrato, *C. B. Jonst. D.* Unedo Plinii vulgò, *Herm. Cat. P. Al.* The Strawberry-tree. In sylvis & dumetis calidioribus. *Usu.* Fructus. *Vires.* Acerbus est & austerus.

2. Adrachne, *Offic. Park.* Theophrasti, *Ger. J. B.* Theophrasti Arbuto seu Comaro proximè accedens, *Chab.* Arbutus folio non serrato, *C. B Jonst. D.* Dioscoridis vera Comara dicta, *Wheel. Itin.* The Strawberry-Bay. In Græcia oritur. *Usu.* Fructus. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

D. *Georgius Wheeler*, hanc arborem *Dioscoridis* Arbutum esse credit, contra opinionem *Matthioli*, qui primam speciem eam esse affirmat.

Pag. 460. post lin. 5. adde,

VIII. *De Phillyrea.*

FLore quadripartito, fructu & semine sphærico, foliis in caule binis oppositis, ab Alaterno distinguitur, quam Botanici & Hortulani nostrates cum ea confundentes, utramque indiscriminatim Phillyream denominarunt. R. Meth. A. p. 152.

Phillyrea

Phillyrea, *Offic.* folio Liguſtri, *C. B. Jonſ. D.* latiuſculo folio, *J. B. Chab.* latiore folio, *Ger.* latifolia foliis ferè non ſerratis, *Park.* Mock-Petbet. In hortis colitur. *Uſu.* Folia. *Vires.* Siccant & adſtringunt, ad oris ulcera maximè commendantur.

X. *De Thymelæa.*

Pag. 460. poſt lin. 19. adde,

Notæ ſunt, flores monopetali quadripartiti; fructus carnoſi ſemen continentes unicum, oblongum rotundumve, tunica cartilaginea tectum. R. Meth. A. p. 152.

Pag. 461. poſt lin. 4. adde,

3. Cneoron niger, *Offic.* Matthioli, *Ger. emac.* Matthioli ſuffrutex, *J. B. Chab.* Thymelæa minor ſive Cneoron Matthioli, *Park.* Alpina Linifolia humilior Flore purpureo odoratiſſimo, *El. Bot.* foliis acutis, floribus odoratis, purpureis, Cneoron Matthiolo dicta, *Herm. Cat.* Thymelææ affinis facie externâ, *C. B. Jonſ. D.* Rock-Roſe. In montoſis provenit. Aprili floret. *Uſu.* Cortex. *Vires.* Cum Chamælæa viribus convenire creditur.

Empetrum, *Offic.* Thymelæa foliis Kali lanuginoſis ſalſis, *C. B.* Sanamunda ſecunda Cluſii, *Ger. emac. J. B. Chab.* altera Cluſii, *Park.* Heath-Spurge. In maritimis Bæticæ ſponte oritur. Februario floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Drachmæ pondere cum decocto Cicerum ſumpta mirificè purgat. *R. H. p.* 1589.

5. Sana

5. Sanamunda, *Offic.* prima Cluſii, *Ger. emac.* Thymelæa foliis candicantibus, Serici inſtar mollibus, *C. B.* Tartonraire Maſſilienſium. *Park.* Maſſilienſium, Sanamunda prima Cluſii, *J. B. Chab.* Heath-Spurge. In Gallo-provincia ſponte provenit. *Uſu.* Folia. *Vires.* Vi cauſtica prædita ſunt.

XI. *De Viburno.*

NOtæ, vimina lenta, lanuginoſa; folia ſubrotunda, pronâ facie incana; flores in umbellis, baccæ per maturitatem nigræ compreſſæ, ovales ferè; ſemina ejuſdem figuræ, valdè compreſſa, canaliculata & ferè oſſea. R. Meth. A. p. 147.

A. Viburnum *Offic. Park.* vulgò, *C. B.* Matthioli, *El. Bot.* Lantana ſive Viburnum, *Ger.* vulgò aliis Viburnum, *J. B. Chab.* The Wayfaring-Tree. In ſepibus non infrequens. Æſtate floret. Septembri matureſcunt acini. *Uſu.* Folia, Baccæ. *Vires.* Siccant & adſtringunt, unde ad tonſillarum & gutturis inflammationes, columellæ procidentiam, dentes vacillantes, alvi fluxiones commendantur. *Matth.*

Pag. 462. lin. ult. ſubjunge,

XIII. *De Rhamno.*

FRutices eſt ſpinoſo, fructu minore, pulpâ humidâ unicum intùs ſemen claudente. R. Meth. A. p. 152.

1. Rhamnus

1. Rhamnus albus, *Offic.* ſpinis oblongis, Flore candicante, *C. B. Jonſ. D.* primus Cluſii, *Ger.* ſecundus Monſpelienſium ſive primus Cluſii, *Park.* cortice albo Monſpelienſis, *J. B. Chab.* Ram-thorn with white Flowers. Hiſpaniæ, Luſitaniæ, &c. incola eſt. Maio floret. Autumno fructus maturat. *Uſu.* Folia. *Vires.* Igni ſacro & ſerpentibus ulceribus efficaciter illinuntur. *Dioſc.*

2. Rhamnus niger, *Offic.* niger Theophraſti, *Park.* tertius Cluſii, *Ger. Chab. J. B.* tertius Flore herbaceo baccis nigris, *C. B.* Flore herbaceo, baccis nigris, *Jonſ. D.* Black Ram-thorn. In hortis nonnunquam reperitur. Maio floret. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Decoctum membra relaxata & diſſoluta atque podagræ dolores juvat.

A. 3. Oleaſter Germanicus, *Offic.* Rhamnus ſecundus Cluſii, *Ger.* primus Dioſcoridis Lobelio ſive litoralis, *Park.* Salicis folio anguſto, fructu flaveſcente, *C. B. Jonſ. D.* ſive Oleaſter Germanicus, *J. B. Chab.* Rhamnoides fructifera foliis Salicis, baccis leviter flaveſcentibus, *T. Coroll.* Sallow-thorn. In maritimis arenoſis. Junio floret. Septembri fructum maturat. *Uſu.* Baccæ. *Vires.* Rob acidum eſt, commendaturque ad Dyſenteriam.

XIV. *De Ebeno Indico.*

EBenus, *Offic. C. B. J. B Chab.* Ebenum ſive Lignum Indicum, *Camell. Syll.* Ebony. Ex India orientali adfertur, *Uſu.* Lignum.

Arborem hanc cum *P. Camello* verum Antiquorum Ebenum Indicum eſſe exiſtimo, eſtque arbor baccifera foliis Juglandinis ſimilibus quoad magnitu-

nitudinem ; atque idcircò quod de ea ſcripſi pag. 435. libri mei prioris huc transferendum eſt.

Huic ſubjungit *Camellus* ſex alia arbores quas omnes pro variis Ebeni ſpeciebus habet : quarum primam in Capite Palmarum jam dedi ; ideóque illuc Lectorem meum ablego.

Pag. 465. poſt lin. 10. adde,

XVIII. *De Fagara.*

FAgara, *Offic. Ger.* major, *J. B. Chab.* ſeu Cayutana Luzonis, *Camel. Syllab.* Fagara Coccula Indo ſimilis fructus, *Park.* Cubebis affinis Fagara major, *C. B.* Rubus exoticus, *ejuſd.* Lubi facie ſenticoſa planta Lobellio, *J. B. Park. Chab.* In Philippinis Inſulis reperitur. *Uſu.* Baccæ, harum cortex exterior, tener, ſubniger, ſaporis aromatici & acriuſculi, hæ maturæ rumpuntur, & granum nigrum ſplendidum, ſat ſolidum, ſaporis & odoris expers exhibent. *Vires.* Calfaciunt & ſiccant, ſtomachi ac Hepatis frigiditati utiles, concoctionem juvant, & alvum adſtringunt. *Avicen.*

Arbores

Arbores & Frutices bacciferæ, fructu tripyreno.

Pag. 468. poſt lin. 2. adde,

XXII. *De Alaterno.*

NOtæ ſunt; Foliis in ramis & ſurculis alterno ordine ſitis, baccis tricoccis, à Phillyrea differt. R. Meth. A. p. 154.

1. Alaternus, *Offic. J. B. Chab.* Spina Burgi Monſpellienſium, *Ejuſd.* Alaternus major & minor, *Park.* Plinii, & humilior, *Ger.* ſive Philyca elatior & humilior C. Bauhini, *P. Al.* Phillyca elatior & humilior, *C. B. Jonſ. D.* Evergreen-Privet. In hortis colitur. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Moderatè alvum conſtipat.

2. Celaſtrus, *Offic.* Theophraſti, *C. B. Park. Jonſ. D. Ger. emac.* Alaternus latifolia, Celaſtrus dicta, *Herm. Cat.* The Staff-tree. In hortis curioſorum nonnunquam reperitur. De viribus & uſu nil invenio apud Autores.

3. Caſſina, *Offic. C. B.* Caſſine vera Floridanorum, Arbuſcula baccifera Alaterni ferme facie, foliis alternatim ſitis, tetrapyrene, *Pl. Mant.* Caſſinp. In Carolina oritur. *Uſu.* Folia unciam circiter longa ſunt, ſemiunciam lata, figurâ folia Senæ repræſentantia, colore quando exſiccata, ſunt nigricante, cum ſplendore ſupernè, ſubtus viridiora, odore nullo, ſapore paulùm aromatico. *Vires.* In Variolis optimum medicamentum

mentum habetur, fermentationem Sanguinis nimis violentam cohibens, nec tamen facultatem expulsivam penitus ligans. Expectorationem promovet, & pulmones tutatur. Caput denique & guttur ne invadant variolæ impedit. D. *Marloe.*

4. Perygua, *Offic. Marl. Obſ.* In *Uſu* ſunt, Fragmenta foliorum exſiccatorum, feſtucarum & pulvis, unde allata diſcere nequeo. *Vires.* Purgat interdum, aliàs vomitum excitat, nonnunquam inſenſibilem perſpirationem promovet, prout natura inclinat. Specificum præſtantiſſimum habetur in Diabete, cujus effectus in morbo illo curando plura exempla profert D. *Marloe.*

Cujuſnam plantæ Perigua fragmenta ſit, quæſtio eſt non facilè determinanda: neque eruditorum in re Botanicâ opiniones facilè poſſunt conciliari. Sunt qui pro Alaterni Specie eam habent, quorum autoritate permotus eam hoc in loco diſpoſui. Alii quærunt an ſit Peragu, *H. M. Tom. 2. p. 41.* Mihi veriſimillimum videtur plantam eam eſſe cujus meminit *Du Biſcay* in Navigatione ſua ſurſum in *Rio de la Plata* ſub titulo *Herbæ de Paraguay*, quâ indigenæ adverſus vapores minerales & noxios utuntur: quæque iiſdem inſervit pro medicamento ad vomitum excitandum. An Fragmenta Plantarum nuper importata nomine Paraguay Tea, iiſdem ſunt cum Perygua D. *Marloe* ſupradicta?

XXIII.

XXIII. *De Sambuco.*

Pag. 469. poſt lin. 4. adde,

3. SAmbucus montana, *Offic.* racemoſa rubra, *C. B. Park. Jonſ. D.* racemoſa, *Chab.* racemoſa acinis rubris, *J. B.* racemoſa vel Cervina, *Ger.* Mountain-Elder. In hortis colitur. *Uſu.* Folia. *Vires.* Frigida & Soporifera eſt, & cum Bella donna viribus convenit.

Arbores & frutices Bacciferæ fructu tetrapyreno.

XXV. *De Thea.*

Pag. 472. lin. ult. ſubjunge,

IN Anglia tres ſpecies *Theæ* in uſu ſunt. Quarum Prima *Bohe* dicitur, eſt folium parvum ad nigredinem vergens, quod aquam plerunque cui incoquitur brunneo aut rubente colore tingit & ſapore Sennæ infuſum refert.

Secunda *Thea viridis* eſt, nonnullis *Singlo* dicta. Hæc duorum generum eſt. Alterum folio oblongo & anguſto, alterum minore; utrumque æquè bonum, & colore cœruleo-viridi; commanducatum criſpum admodùm videtur, & aquam colore pallidè viridi inficit.

Tertia

Tertia *Imperialis Thea* dicitur. Folio eſt amplo laxo, cum reliquæ duæ folio ſunt convoluto: optima viſui viridis eſt, in ore criſpa & odore jucunda.

Omnes hæ Theæ Species à China adferuntur uniuſque & ejuſdem arboris folia eſſe exiſtimantur; differre tantùm tempore colligendi, & præparandi, ſeu ut vocant curandi modo. *Vires.* Omne genus Thearum vires jam tradidi. Bohe duntaxat Sanativa & Balſamica habetur, naturæ languentis reſtauratrix, & adverſus Phthiſin & Tabem prophylactica.

Pag. 475. poſt lin. 2. adde,

XXIX. *De Lycio.*

FRutex eſt baccifer ſpinoſus, à Rhamno, ut videtur, diſtinguendus ſpinis minoribus & brevioribus, quæ longiores validioreſque in Rhamno. Addi etiam poteſt Folia eſſe minora in Lycio. R. Meth. A. p. 195.

Lycium, *Offic.* Buxi foliis, *Jonſ. D. C. B.* facie pruni-ſylveſtris ſive Italicum, *ejuſd.* Italicum *J. B. Chab. Park.* vulgatius, *ejuſd.* Italicum *Jonſ. D. Bod. à Stapel.* Buxi foliis rotundioribus Syriacum vel Perſicum *Breyn. 2. Prod.* Hiſpanicum, *Ger.* Rhamnus Hiſpanicus Buxi folio minor, *El. Bot.* Box-Thorn. In Hiſpania aliiſque locis calidioribus oritur. *Uſu.* Rob ex foliis & ramis, cujus parandi modus à *Dioſcoride* ſic deſcribitur. Rami cum radiculis tuſi, & antè per multos dies macerati coquuntur, tum abjectis lignis itidem liquor coquitur, donec mellis craſſitudo fiat.

Adulte-

Adulteratur id Lycium adjecta decoctioni amurca, aut Abſinthii ſucco aut felle bubulo. Simili modo fit Lycium Semine expreſſo & inſolato. Optimum quod uri poteſt, reſtinctumque rubentem ſpumam oſtendit, glebis intrinſecus nigris, intùs cum fregeris rufis, odore minimè viroſo, cum amaritudine aſtringens, crocino colore. *Vires.* Adſtringit, caliginem oculorum diſcutit: genarum Scabiem, pruritus, vetereſque fluxiones ſanat: facit ad purulentas aures exulceratas gingivas, tonſillas, labiorum fiſſuras, ſedis rimas, attrituſque illitum: cœliacis dyſentericis potum inditumque convenit: datur ſanguinem excreantibus & tuſſi ex aqua: contra rabioſi canis morſus in catapotio devoratur, aut in aqua bibitur: flavos facit pilos reduviis, ulceribus quæ ſerpunt, aut putreſcunt medetur: fœminarum profluvia appoſitum ſiſtit rabioſorum ictibus ex melle potum, aut vice catapotii auxiliatur. *Dioſc.*

Duæ Lycii ſpecies à *Dioſcoride* memorantur. Alter à planta in *Græcia* naſcente, quam hîc exhibeo, Lycium ſimpliciter dicta: altera à planta Indica de qua in Capite de Acacia agam quæ nomine *Cate* innoteſcit,

Pag. 476. lin. ult. ſubjunge,

Frutices Bacciferæ, fructu polypyreno.

XXXII. *De Rubo.*

Pag. 477. lin. ult. ſubjunge,

A. 3. Chamæbatos, *Offic.* Chamærubus ſive Humirubus, *Park.* ſpinoſus fructu cœruleo, *Jonſ. D.* Rubus minor fructu cœruleo, *J. B. Chab.* repens fructu cæſio, *C. B. Ger. emac.* The Dew-Berry. Inter ſegetes reperitur. Maio floret. Autumno fructum maturat. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Cum primo viribus convenit.

XXXIII. *De Uva marina.*

Notæ ſunt Ramuli & ſurculi Equiſeti æmuli, aphylli. Fructus ad nodos Rubi fructibus ſimiles. R. Meth. A. p. 195.

Tragos, *Offic.* ſive Uva marina major, *J. B. Chab.* Uva marina major, *Ger.* Polygonum bacciferum maritimum majus, *C. B.* bacciferum ſive Uva marina major, *Park.* Ephedra maritima major, *Tal. Bot.* Sea-Grape or Shrub-Horſe-Tail. In Sicilia aliiſque locis maritimis oritur. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Ex vino poti cœliacis & fœminis fluxione laborantibus auxiliantur. *Dioſc.*

Adulteratur id Lycium adjecta decoctioni amurca, aut Abſinthii ſucco aut felle bubulo. Simili modo fit Lycium Semine expreſſo & inſolato. Optimum quod uri poteſt, reſtinctumque rubentem ſpumam oſtendit, glebis intrinſecus nigris, intùs cum fregeris rufis, odore minimè viroſo, cum amaritudine aſtringens, crocino colore. *Vires.* Adſtringit, caliginem oculorum diſcutit: genarum Scabiem, pruritus, vetereſque fluxiones ſanat: facit ad purulentas aures exulceratas gingivas, tonſillas, labiorum fiſſuras, ſedis rimas, attrituſque illitum: cœliacis dyſentericis potum inditumque convenit: datur ſanguinem excreantibus & tuſſi ex aqua: contra rabioſi canis morſus in catapotio devoratur, aut in aqua bibitur: flavos facit pilos reduviis, ulceribus quæ ſerpunt, aut putreſcunt medetur: fœminarum profluvia appoſitum ſiſtit rabioſorum ictibus ex melle potum, aut vice catapotii auxiliatur. *Dioſc.*

Duæ Lycii ſpecies à *Dioſcoride* memorantur. Alter à planta in *Græcia* naſcente, quam hîc exhibeo, Lycium ſimpliciter dicta: altera à planta Indica de qua in Capite de Acacia agam quæ nomine *Cate* innoteſcit,

Pag. 476. lin. ult. ſubjunge,

Frutices Bacciferæ, fructu polypyreno.

XXXII. *De Rubo.*

Pag. 477. lin. ult. ſubjunge,

A. 3. Chamæbatos, *Offic.* Chamærubus ſive Humirubus, *Park.* ſpinoſus fructu cœruleo, *Jonſ. D.* Rubus minor fructu cœruleo, *J. B. Chab.* repens fructu cæſio, *C. B. Ger. emac.* The Dew-Berry. Inter ſegetes reperitur. Maio floret. Autumno fructum maturat. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Cum primo viribus convenit.

XXXIII. *De Uva marina.*

Notæ ſunt Ramuli & ſurculi Equiſeti æmuli, aphylli, Fructus ad nodos Rubi fructibus ſimiles. R. Meth. A. p. 195.

Tragos, *Offic.* ſive Uva marina major, *J. B. Chab.* Uva marina major, *Ger.* Polygonum bacciferum maritimum majus, *C. B.* bacciferum ſive Uva marina major, *Park.* Ephedra maritima major, *Tournef. Bot.* Sea-Grape or Shrub-Horſe-Tail. In Sicilia aliiſque locis maritimis oritur. *Uſu.* Fructus. *Vires.* Ex vino poti cœliacis & fœminis fluxione laborantibus auxiliantur. *Dioſc.*

SECTIO VIII.

De Arboribus Pomiferis.

VIII. *De Nuce Vomica.*

Pag. 486. poſt lin. 24. adde,

3. FABA Sti. Ignatii, *Offic.* Nux pepita ſeu Faba Sancti Ignatii, *Act. Philoſ. Lond. No.* 249. Igaſur, ſeu Nux Vomica legitima Serapionis Camelli, *Ejuſd. No.* 250. ſeu Nux Vomica legitima Serapionis Camelli, Faba Sti. Ignatii vulgo, *R. H.* Cucurbitiferâ Malabathri foliis ſcandens Catolongay & Contara Philippinis Orientalibus dicta, cujus Nuclei Pepitas de Byſayas aut Catbalogan & Fabæ Sti. Ignatii ab Hiſpanis, Igaſur & Mananaog *i. e.* Victorioſi, Inſulanis nuncupati, *Pl. Mant.* St. Ignatius-Bean. Ex India Orientali tranſportatur. *Uſu.* Semina oblonga, avellanæ Nuci cum putamine pares, aut etiam paulò majores, nodoſa, duriſſima, diaphana & quaſi cornea ſubſtantia, ſaporis intenſius amari, coloris autem inter album & glaucum. *Vires.* Veneno reſiſtit, febres quartanas curat, urinam & menſes provocat: vertiginem inducit & vomitiones ciet.

SECTIO

SECTIO IX.

De Arboribus fructu per maturitatem ſicco.

I. *De Staphylodendro.*

NOTÆ ſunt *Flores racemoſi, pentapetali; fructus veſicula in duos aut tres loculos diviſa nuces continentes calvariæ figurâ.* R. Meth. A. p. 157.

A. Staphylodendron, *Offic. J. B. Chab.* ſylveſtre & vulgare, *Herm. Cat.* Matthioli, *El. Bot.* Nux veſicaria, *Ger. Park.* Piſtachia ſylveſtris, *C. B.* The-Bladder-Nut-Tree. In ſepibus nonnunquam reperitur. Maio floret. Autumno nucleos maturat. *Uſu.* Nuclei. *Vires.* Cum Piſtachia viribus à quibuſdam convenire creditur.

Pag. 492. poſt lin. 14. adde,

VI. *De Cotino.*

NOtæ ſunt, *Semina compreſſa rubentia, lenticulis æqualia, obiter diſpoſita in cymis tenuiſſimorum, ſed rigidorum filamentorum, latè*

diffusis, pilis plumatim obsitis quæ ad summos ramulios oriuntur. R. Meth. A. p. 158.

Cotinus, *Offic.* Matthioli, *C. B.* coriaria Plinii, *Jonst. D.* coriaria Dodonæi, *El. Bot.* Coccigria Cotinus coriaria nonnullis putata, *Chab.* sive Cotinus putata, *J. B.* Coggygria Theophrasti vel Cotinus coriaria Plinii, *Ger.* sive Cotinus coriaria, *Park.* Gallice Sumach. In Italia reperitur. Maio flore. Augusto fructus matureſcit. *Usu.* Fructus. *Vires.* Siccat & adstringit, insigniter sauciorum & genitalium ulcera sanat, fluxus alvi mensesque sistit.

Pag. 493. post lin. 25. adde,

IX. *De Spiræa.*

Nota sunt, Flos pentapetalos; fructus è pluribus siliquis seu vaginis compositus quarum unaquæque semina aliquot compressa continet. R. Meth. A. p. 158.

Spiræa, *Offic. Jonst. D.* Theophrasti Clusio, *Ger. emac.* Theophrasti fortè Clusio, *J. B. Park. Chab.* Salicis folio, *El. Bot.* Frutex spicatus foliis Salignis serratis, *C. B.* Spiked-Willow. In hortis colitur. Julio floret. Augusto Semen maturat. *Usu.* Semen. *Vires.* Astringentem facultatem habet.

Pag

Pag. 495. poſt lin. 4. adde,

XI. *De Acere.*

Cujus notæ, Folia laciniata aut anguloſa; ſemina bina juncta, vaſculis duris, membranis extantibus alatis incluſa. R. Meth. A. p. 157.

A. 1. Acer majus, *Offic. Ger.* majus, multis falsò Platanus, *J. B.* majus, quibuſdam Platanus dictum, *Chab.* majus latifolium, Sycomorus falsò dictum, *Park.* montanum candidum, *C. B.* montanum candidum, aliis Platanus, *Jonſ. D.* The Great-Maple. In Cœmeteriis & ambulacris. Maio floret. Fructus matureſcit Septembri. *Uſu.* Succus ex vulnerato arbore. *Vires.* Ad Scorbutum utilis eſſe creditur.

Ex hujus Succo Saccharum præparabant Canadenſes: vide *Act. Philoſ. Lond. No.* 171. *p.* 988.

A. 2. Acer minus, *Offic. Ger. emac.* minus ſive vulgare, *Park.* campeſtre & minus, *C. B.* campeſtre, aliis Opulus campeſtris veterum, *Jonſ. D.* Acer, *Chab.* vulgare minori folio, *J. B.* The-Maple. In ſepibus frequens. Maio floret. *Uſu.* Radix. *Vires.* Contuſa è vino jecinoris doloribus utiliſſimè imponitur. *Plin.*

3. Acer montanum, *Offic. Park.* montanum flavum ſive criſpum, *C. B. Jonſ. D.* montanum Orientalis Platani foliis atro-virentibus *P. P. Tab.* 252. *fig.* 1. Mountain-Maple. In montoſis.

XIII. *De Ulmo.*

Pag. 397. pro 2da & 3a Speciebus Ulmi, adde,

A. 2. Ulmus montana, *Offic. C. B.* montana aliis latifolia, *Fonſ. D.* latiore folio, *Park.* folio latiſſimo ſcabro, *Ger. emac.* The Wych-Hazel. In ſepibus frequens. *Uſu.* Cortex. *Vires.* Cum priore viribus convenit.

3. Macer, *Dioſc. Theoph.* veterum, *C. B.* Græcorum, *Park. Fonſ. D.* Dioſcoridis & Græcorum, *J. B. Chab.* Ulmo affinis, vaſculis membranaceis & ſemine intus incluſo compoſito, *R. H. p.* 1779. The Grecian Macer. Ex Barbaria advehitur. *Uſu.* Cortex flaveſcens, craſſus, guſtu perquàm adſtringens. *Vires.* Contra cruentas excreationes, Dyſenterias & alvi fluxiones bibitur. *Dioſc.*

Pag. 498. poſt lin. 3. adde,

XV. *De Platano.*

Notæ ſunt, Fructus in pilulas ſphæricas conglobati, multa ſemina continentes. R. Meth. A. p. 140.

Platanus, *Offic. C. B. J. B. Ger. Chab.* vulgaris, *Fonſ. D.* Orientalis vera, *Park.* pilulis majoribus, *Herm. Cat.* Orientalis pilulis ampliſſimis, *P. Al.* The Plane-Tree. In Creta oritur. *Uſu.* Folia, Cortex, Pilulæ. *Vires.* Tenerrima folia in vino decocta & illita, oculorum fluxiones ſiſtunt, tumores

tumores & inflammationes levant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilulæ in vino potæ ſerpentium morſibus auxiliantur. *Dioſc.*

XVI. *De Elæagno.*

A. Elæagnus, *Offic.* Gale Frutex odoratus Septentrionalium, Elæagnus *Cordo.* Chamælæagnus Dodonæo, *J. B. Chab.* Myrtus Brabantica ſive Elæagnus Cordi, *Ger.* Rhus Myrtifolia Belgica, *C. B.* ſylveſtris, ſive Myrtus Brabantica vel Anglica, *Park.* Dutch Myrtle or Gaule. Locis paludoſis gaudet. *Uſu.* Folia. *Vires.* Siccat & diſcutit; Lumbricos necat.

XVII. *De Paliuro.*

Notæ ſunt, Spinæ longæ acutiſſimæ; fructus petaſoides, pulpâ intus fungosâ oſſiculum durum continens triſpermum, hoc eſt, tribus conceptaculis cum ſingulis in unoquoque ſeminibus donatum. R. Meth. A. p. 158.

Paliurus, *Offic. Ger. Chab,* Dodonæi, *Herm. Cat. El. Bot.* ſive Rhamnus tertius Dioſcoridis, *Park.* Jujubinis foliis fructu petaſoide, *P. Al.* Rhamnus folio ſubrotundo, fructu compreſſo, *C. B. Inſt. D.* Christs-Thorn. Italiæ, &c. incola eſt. Maio & Junio floret; Autumno fructum maturat. *Uſu.* Folia, Radix, Baccæ. *Vires.* Radix & folia aſtringunt, ventrem fluentem cohibent, digerunt & Phymata curant. Fructus incidendi vim obtinet, calculos veſicæ comminuit & pectoris pulmoniſque excretionibus auxiliatur. *R. H. p.* 1709.

SECTIO X.

De *Arboribus & Fruticibus* *siliquosis.*

Arbores & Frutices flore uniformi.

Pag. 502. lin. ult. subjunge,

II. *De Acacia glorioſa.*

Notæ sunt, Folia pinnata, siliqua lata echinata, fructus rotundus durus.

Bonduch, *Offic.* Indorum, *Jonſ. D.* cinerea foliis longioribus, *Act. Philoſoph. Lond. n.* 267. Arbor exotica ſpinoſa foliis Lentiſci, *C. B.* ſpinoſa Indica muricatis ſiliquis, *Park.* Lobus echinatus, *Ger. emac.* echinatus fructu cæſio foliis longioribus, *P. B. P.* alius exoticus hirſutus cum piſo duro cinerei coloris, *Chab.* ἰχνευμὼν cum piſo duro cinerei coloris, *J. B.* Acacia glorioſa Lentiſci foliis ſpinoſa, Flore ſpicato luteo, ſiliqua magna muricata, *P. P. Tab.* 2. *fig.* 2. Caretti, *H. M. Tom.* 2. Inimboy Braſilienſibus, *Marcg.* Braſilianorum frutex ſpinoſus ſpicatus, platylobis echinoidibus, glycyrrhizæ foliis *Breyn. Prod.* 1. Inimboia ſive ſylva de praya Luſitanis, *Piſon.* Molucca-Nuts, or Bezoar-Nuts.

Utri-

Utriuſque Indiæ alumna eſt. *Uſu.* Fabæ rotundæ, cinerei coloris, intus albæ, ſaporis impenſe amari, odoris nullius. *Vires.* Herniosis tumoribus conducunt, flatus diſſipant, dolorem colicum ſedant, ſtomachum debilem confortant, menſes movent, in calculo proſunt. *Vid. Marlow. Obſervat.*

Pag. 504. poſt lin. 26. adde,

V. *De Angſana.*

ANgſana, *Offic.* Draco arbor Indica ſiliquoſa Populi folio, Angſana vel Angſava Javanica, *Commel. Hort. Amſt. R. D. p.* 113. In India Orientali oritur. *Uſu.* Lachrymæ. *Vires.* Virtutibus aſtrigentibus pollet, & in affectibus aphthoſis præ cæteris remediis conducit.

Gummi hujus arboris ab eruditiſſimo & ingenioſiſſimo D. *Commelino* in Pharmacopolarum Officinis nomine Sanguinis Draconis in guttis divenditum eſſe dicitur: unde non poſſum non obſervare (præter ea quæ jam ſcripſi in Capite de Palmis) quòd Botanices Autores quænam arbor ſit, valdè incerti ſint, & magna obſcuritate ac confuſione laborent, aut diverſas arbores eſſe quæ hoc gummi producant.

Pag. 508. poſt lin. 4. adde,

IX. *De Nerio.*

NOtæ ſunt, Flos ſpecioſus, ſiliqua & ſemen Apocyni, lanugine ſeu pappo adhærente alatum. R. Meth. A. p. 169. 196.

Nerium, *Offic.* ſive Rhododendron, *Chab.* ſive Oleander, *Ger.* ſive Rhododendron Flore rubro & albo, *J. B.* floribus rubeſcentibus & floribus albis, *C. B. Jonſ. D.* Oleander ſive Laurus Roſea, *Park.* vulgò, *Herm. Cat.* Roſe-Bay. In hortis colitur. Julio flotet. *Uſu.* Folia. *Vires.* Extrinſecus vim digerendi habent. Intra corpus aſſumpta perniciosa & venenoſa eſſe ſcribit *Galen.*

Arbores & Frutices ſiliquoſæ floribus difformibus ſeu Papilionaceis.

XII. *De Arbore Judæ.*

NOtæ ſunt, Folia circinatæ ferè rotunditatis Aſari ſed majora, alternatim in ramulis naſcentia; floris ſtructuræ peculiaris, folia etenim lateralia Alæ dicta, folium ſuperius ſeu vexillum ſuperant, præter aliorum hujus generis normam, præterea folium inferius è duobus foliis ſeu mavis partibus penitus ſeparatis componitur; Siliquæ longæ, compreſſæ, membranaceæ. R. Meth. A. p. 162.

1. Cer-

1. Cercis, *Offic.* prior Theophraſti quibuſdam, aliis Colytea Theophraſti, *R. H.* Arbor Judæ, *Ger. Park.* Judaica, *Chab.* Judaica arbor, *J. B.* ſiliqua ſylveſtris rotundifolia, *C. B.* ſylveſtris vulgaris, *Jonſ. D.* ſpuria rotundifolia ſylveſtris, *Volck.* Siliquaſtrum, *El. Bot.* Judas his Tree. In hortis colitur. Æſtate florens.

2. Acacalis, *Offic.* quorundam, ſive Keſmeſan foliis Ceratiæ, *J. B.* Dioſcoridis, *C. B.* Siliquæ ſylveſtri ſimilis, *ejuſd. Jonſ. D.* Wild-Carob. Circa Conſtantinopolin reperitur. *Uſu.* Semen. *Vires.* Tam vulgare Conſtantinopoli ad oculorum morbos eſt remedium, ut tritum ſit proverbium; *Si doleant oculi habes Cheſmeſen. R. H.*

XIII. *De Spartio.*

ALtitudine ſuâ & viminibus junceis à Geniſtellâ, differt. R. Meth. A. p. 162.

Spartium, *Offic. Chab.* arboreſcens ſeminibus lenti ſimilibus, *C. B. Jonſ. D.* Spartum Hiſpanicum frutex vulgare, *Park.* Genniſta Hiſpanica, *Ger.* juncea, *J. B.* Hiſpanica, floribus luteis amplis, ſeminibus lenti ſimilibus. *Herm. Cat.* Spaniſh-Broom. In Italia, Hiſpania, &c. naſcitur. Junio & Julio floret. *Uſu.* Vimina, Flores, Semina. *Vires.* Cum Geniſta vulgari viribus convenit, quâ tamen efficacior eſt.

XIV.

XIV. *De Scorpio.*

NOtæ *ſunt, tota ex aculeis denſiſſimis ferè componitur; folia enim poſt exortum brevi decidunt.* R. Meth. A. p. 162.

A. 1. Scorpius, *Offic.* Geniſta ſpinoſa vulgaris, *Ger. emac.* ſpinoſa major longioribus aculeis, *C. B. Jonſ. D.* ſpinoſa major vulgaris ſeu Scorpius Theophraſti quam Gaza Nepam tranſtulit, *Park.* Geniſtellæ ſpinoſæ affinis, Nepa quibuſdam *J. B.* ſpinoſæ affinis Nepa & Scorpius quibuſdam, *Chab.* Geniſta-Spartium majus longioribus aculeis, *El. Bot.* Furz or Goſs. Ericetis & incultis naſcitur. Vere floret. *Uſu.* Tota planta. *Vires.* Cum Geniſta viribus convenit.

A. 2. Nepa, *Offic.* Geniſta aculeata minor ſive Nepa Theophraſti, *Ger.* ſpinoſa minor, *Park.* ſpinoſa major brevibus aculeis, *C. B. Jonſ. D.* Geniſta Spartium majus brevioribus aculeis, *El. Bot.* The leſſer Furz. Cum priore convenit. Autumno floret. *Uſu.* Tota planta. *Vires.* Cum priore viribus etiam convenit.

Pag. 509. poſt lin. 2. addè,

XVI. *De Anagyride.*

NOtæ *ſunt, odor fœtidus, flores è foliorum ſinubus bini, terni aut quaterni ſimul exeuntes, figurâ; obſervante D.* Tournefortio, *peculiari, ſiquidem folium ſuperius multo brevius eſt reliquis.* R. Meth A. p. 163.

Anagyris

Anagyris, *Offic. Chab.* fœtida, *C. B. Ger. Park. Jonſ. D.* vera fœtida, *J. B.* Stinking-bean-treſoil. In Italia provenit. Maio & Junio floret. *Uſu.* Folia, Semen. *Vires.* Tenera Folia trita tumores illitu reprimunt; ſi partus hæreat & ſecundæ menſeſque morentur; drachmæ pondere bibuntur in paſſo: ſic & ſuſpiriosis dantur, & contra capitis dolores in vino: Radicis cortex concoquendis, diſcuriendiſque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer ciet. *Dioſc.*

XVI. *De Laburno.*

Cujus notæ, ſtatura & magnitudo inſignis; Flores plures ſimul velut in racemo dependentes. R. Meth. A. p. 163.

Laburnum, *Offic. Chab.* arbor trifolia Anagyridi ſimilis, *J. B.* Anagyris, *Ger.* non fœtida ſive Laburnum majus, *Park.* non fœtida major vel Alpina, *C. B.* fœtens major vel Alpina, *Jonſ. D.* Cytiſus Alpinus latifolius Flore racemoſo pendulo, *El. Bot.* Bean-Treſoil-Tree. In montibus provenit. Junio & Julio floret. *Uſu.* Folia, Semen. *Vires.* Purgat per inferiora & ſuperiora vehementiſs.

XVII. *De Cytiſo.*

Statura eſt humilior quàm præcedens, & magnitudo minor, ſiliqua compreſſa. R. Meth. A. 163.

1. Cytiſus, *Offic.* incanus ſiliquis falcatis, *C. B. Jonſ. D.* ſeptimus cornutus, *Ger.* ſiliquâ incurvâ folio

folio candicante, *J. B.* siliquâ incurvâ, *Chab.* Medica frutescens incana, seu Trifolium frutescens incanum siliquâ falcatâ planâ, folio candicante, *P. Al.* Medicago trifolia frutescens incana, *El. Bot. T. Inst.* Falcata incana, *Rivin.* Shrub-Trefoil. In hortis colitur. Æstate floret. *Usu.* Folia. *Vires.* Refrigerant: tumores discutiunt: decoctum porro urinam ciet. *Dioſc.* Ex hujus ligno Turcæ ensium manubria conficiunt. *Volck.*

Quamvis vereres unicam tantùm Cytisi speciem descripserunt idque imperfectè; Recentiores tamen plurimas invenerunt plantas quibus id nomen attribuunt. Quocirca stirps quam hîc propono æquo jure Cytisi *Dioscoridis* nomen sibi vendicare potest quàm alia quævis, imò potiori, cum *Volckamerus* lignum ejus hodiè in usu esse apud Turcas affirmet (ut supra scripsi) adeóque si illarum regionum nativum non est, tamen ibi probè cognitum sit.

2. Pseudo-cytisus, *Offic.* hirsutus, *Ger.* Cytisus hirsutus, *J. B.* quartus Hispanicus Clusii, *Chab.* Hispanicus arboreus, *Park.* foliis subruffa lanugine hirsutis, *C. B.* Hairy-Shrub Trefoil. In Italia & Sicilia invenitur. *Usu.* Folia.

3. Acacia altera, *Offic.* altera trifolia, *Ger.* altera, *C. B.* secunda seu altera Dioscoridis, *Park.* Asphalathus secunda trifolia, quæ Acacia secunda Matthiolo trifolia, *J. B.* secunda trifolia, Acacia secunda quorundam, *Chab.* Cytisus spinosus, *Herm. Cat.* spinosus Acacia dictus, *R. H.* Cytiso-spartium aculeatum Acacia trifolia dictum, *P. Al.* Trefoil-Acacia. In Sicilia, Italia, &c. reperitur. *Usu.* Succus. *Vires.* Astringit, sed viribus inferior [est quàm vera Acacia] & ocularibus medicamentis inutilis. *Dioſc.*

Pag-

Pag. cad. post lin. 19. adde,

XIX. *De Colutea.*

Siliquis vesicæ in modum turgidis & velut inflatis ab aliis distinguitur. R. Meth. A. p. 163.

Colutea, *Offic. Ger.* vesicaria, *C. B. J. B. Jonst. D. Chab.* vesicaria vulgaris, *Park.* Bastard-Sena. In hortis colitur. Junio & Julio floret. *Usu.* Folia, Semina. *Vires.* Purgant non solùm per inferiora, vomitiones movent.

XX. *De Acacia.*

Pag. 510. pro 2da Specie Acaciæ, adde,

2. LYcium Indicum, *Offic.* Indicum putatum Garciæ, *Park.* Garciæ sive Cate, *J. B. Chab.* foliis Ericæ, *C. B.* Ericæ foliis, Cate Garciæ, *Jonst. D.* Arbor spinosa in Java, undè Cate, *ejusd.* spinosa, undè Cate sive Lycium exprimitur, *Bont.* Indian-Thorn. In India Orientali oritur. *Usu.* Succus inspissatus Cate dictus. *Vires.* Dentes & gingivas corroborat & firmat.

Num Cate *Bontii* & Terra Japonica sive Catechu una eadem res sint, dubium est non facilè solubile inter eruditos hujus seculi. Ex proximitate nominum Cate & Catechu facilè inducor ut credam eandem esse. Verum è contrario *Heligius*, ut in superiore meo libro *p.* 387. monui, diserte affirmat Catechu ab arbore illa desumi, cujus fructum Indigenæ cum calce & Betle foliis mandu-

manducant, quam *Bontius* fidenter affirmat Arecæ seu Faufel fructum esse; tanto viro non possum non fidem adhibere; præsertim cùm considero illum eo loci diù vixisse. Cúmque tanta observetur varietas in colore & pondere Terræ Japonicæ, quamvis sub eodem nomine omnes huc adferantur, non video cur diversarum plantarum gemina esse non possint.

SECTIO XI.

De Partibus Stirpium minus cognitarum.

II. *De Corticibus minùs cognitis.*

Pag. 518. post lin. 4. adde,

PSeudo-cassia Dioscoridis, *Jonst. D.* Canella crassiore cortice vulgari, *ejusd.* Pseudocassia sive Cinnamomum vulgare, crassiore cortice, *J. B. Chab.* Cinnamomum seu Cassia crassior, Pseudo-cassia, *C. B.* Wild-Cinnamon. Ex India Orientali transportatur.

III

III. *De Lignis minùs cognitis.*

De Agallocho ſeu Ligno Aloes.

Pag. 520. poſt lin. 6. adde,

REverendus Pater *Camelli* in Syllabo ſuo varia hujus ligni genera adnotavit, quæ ex Appendice eruditiſſimi viri D. *Joannis Raii* Dendrologiæ huc tranſcribam.

Lignum Alcës *Manilam* Sinæ *de* Chauchin-china defertur triplex.

1. Sokhio, *quod caudicis pars extima eſſe videtur, leve, coloris cinerei, ex nigro virgatum amarum tantillùm, odoratum modicè, non gummoſum.* 2. Thimhio, *eſt* Officinarum, *ſubnigrum ſolidum & ponderoſum, ſtriis & venis interſectum, gummoſum, amarum, valdè odoriferum, aquis innatans. Hiſp.* Calamba. 3. Gilam-hio, *ex cinereo eſt palleſcens, molle ſed odoratum validè.*

Aliud *Kalapè dilatum adſervo*, Thim-hio *magis fuſcum, & magis ponderoſum, & aquæ fundum petens.* Aliud *prætereà lignum Sinæ afferunt nigerrimum, odoris modici, quod* Vai-hio *vocant.* Aliud *peculiò ruffeſcens, odoris præſtantiſſimi,* Chi-tua *vocant.*

His addi poteſt quod nuper à doctiſſimo viro D. *Jacobo Cunningham* ad ingenioſiſſimum D. *Jacobum Petiver* tranſmiſſum, & ab illo mihi communicatum eſt in his verbis:

Ca-

Calambac *verùm cognoſcitur ex ejus odore ſuavi, guſtu amaricante & aromatico, & ex ejus mollitie inſtar Ceræ vel Maſtiches cum dentibus maſticatur, & digitorum unguibus cedit. Bonitatis varii ſunt gradus, unde ejus valor (in Regno Cochin-Chinenſi ſive* Annamico, *ubi præcipuè ſi non ſolummodò provenit) à* 10 *ad* 50 Tael *& amplius aſcendit pro una libra Anglica. Reſpectu coloris tria ſunt genera, ſcil. Coloris varii ſeu nigro-purpurei inſtar capitis Anatis (ſicut comparationem inſtituunt* Annamici. 2°. *Coloris maculati inſtar Tigris.* 3°. *Coloris flavi, velut luteum ovi. Quod ſua ſponte in terram decidit, id plerumque coloris eſt varii & melioris notæ.* Calambac *lingua* Annamica *vocatur* Kenam, *Mercatores* Sinæ Tokienſes Kelam *pronunciant, vocabulum verò* mō *vel* moe *ſignificat Lignum, unde fortè derivatur vox* Calambac. Lignum Aloes *in ejus decocto vel ſucco coctum pro* Calambac *vero à quibuſdam venditur, ſed diutiùs ſiccatum fragrantiam, mollitiem,* &c. *amittit.*

Lignum Aloes *ſeu* Agallochum, *quo propius ad* Calambac *accedit, eo melius, plerumque verò durius eſt, & cùm maſticatur, quaſi pulvis in ore magis ſiccum eſt, nec adeò pingue, & omnibus aliis qualitatibus debilioribus dignoſcitur. Ejus libra una valet ad* 5 *mas ad* 6 Tael Lignum Aloes, *Luſitanicè* Pao Agula ; *Annamicè* Keang, *i. e. odorum nominant Sinæ linguâ Mandarinica hoc* Tehin-hiang, *i. e. odorum pavidum ſeu fundum petens, alterum* Suk-hiang, *i. e. odorum pingue vocant.*

Arbores Ligna hæc producentes diverſi eſſe generis quidam aſſerunt, alii negant ; qui aſſerunt, dicunt arborem bacciferam Do *dictam (cujus ſpecimen habetur in herbario tuo ſicco)* Lignum Aloes *producere, quæ fortè eſt* Arbor baccis rubris à Serapion

memo-

nemorata : alii dicunt ex variis Arboribus fieri Lignum Aloes : *ab omnibus autem conceditur* Calambac *fieri ex arbore cujus fructus (quem unc mitto) fere pyriformis, lanuginosus, magnitu-ine Myrobalani citrinæ, cortice crasso & lignoso el fungoso, bifariàm debiscens, totidem semina (septo medio intercepta) turbinata cum appendicibus membranaceis continet calyci insidens quinquifido. Fructus pulverisatus ad ventris tormina insigne remedium.*

ZOOLO-

ZOOLOGIA.

CLASSIS PRIMA.

De Animalibus Exanguibus.

SECTIO I.

De Animalibus Exanguibus minoribus, ſeu, De Inſectis.

Inſecta Apoda.

Pag. 530. lin. 27. adde,

III. *De Limace.*

A 1. Limax ruber, *Offic. Schrod.* quartus ſubrufus, montanus, *Liſt. Hiſt. Animal. Angl. App.* ſubrufus, *Ejuſd. H. Conch.* magna Germanis à colore ruffa *Aldrov. Jonſ.* The red [illegible]mail. In agris reperitur. *Uſu.* Liquor Lima[illegible]m hoc in modo paratus. Rubri Limaces conciſi

cisi misceantur cum pari pondere salis communis conjicianturque in manicam Hippocratis, ut in cella defluant in liquorem. *Vires.* Dolentes partes podagricæ illinuntur, & verrucæ scalpello priùs abrasæ facilè averruncantur. *S. Closs.* Ani procidentiam tollit. *Schnod.*

A. 2. Limax ater, *Offic. List. Gesn.* tertia tota nigra, *Ald. Jonst.* The Black Snail. *Vires.* Contusa & applicata Ulcera mirificè leniunt. *Enzelius.*

Insecta pedata non alata.

VII. *De Araneo.*

Pag. 532. post lin. 12. adde,

A. 2. Araneus niger, *Offic. List. H. Animal. Angl.* The Black Spider. In sylvis, dumetis & pascuis non infrequens. *Vires.* Inter approbata remedia D. *Matthæi Lister* Equitis aurati, proavi mei plurimùm honorandi, illud invenio, quod sine invidia communicandum putavi; nimirùm aquam stillatitiam ex Araneis nigris optimè vulnera sanare; idque fuisse ex secretis D. *Gualteri Raleigh*, fortissimi viri. *List. Hist. prædict.*

Pag. 533. poſt lin. 11. adde,

X. *De Julo.*

A Julus, *Offic. Mouff. Charlt. ex. Aldrov. Jonſ. Mer. pin.* The Gally-worm. Inſecta eſt terreſtris longa, ex annulis multis compacta, multis pedibus arcuatim repens, ſi tangitur in globum ſe complicans. In hortis reperitur. *Vires.* Ictericiæ & Urinæ difficultati confert ex vino potus, *Charlt.*

XI. *De Scolopendra.*

A Scolopendra, *Offic. Charlt. ex. Mouff. Mer. Pin.* terreſtris, *Aldrov. Jonſ.* The Many-feet. Vermiculus eſt longiſſimus, planus, gracilis, trium digitorum longitudine, coloris ſublutei aut ruffi, pedibus multis utrinque refertus, & antennis binis longiuſculis, caudaque bifida ornatus. *Vires.* In vino cocta pro depilatoria à quibuſdam æſtimantur.

XII. *De Scolopendra marina.*

A Scolopendra marina, *Offic. Charlt.* marina prima, *Rondel. Aldrov. Jonſ.* marina rubicundior, *Mouff. Mer. pin.* The Sea Many-feet. In profundo maris invenitur *Geſn.* In Oſtrearum arcis, *Mouffet. Vires.* In oleo decocta ſi illinatur, avellit capillos: ſed contactu pruritus facit. *Dioſc.*

Insecta Anelytra, seu pennis nudis & detectis.

Pag. 535. post. lin. 28. adde,

XIV. *De Vespa.*

A. Vespa, *Offic. Mer. Pin. Aldrov. Charlt. ex Mouff. Jonst.* The Wasp. *Usu.* Insectæ *Vires.* Obstructiones renum & vesicæ aperiunt, calculum frangunt & à quibusdam cum Asellis æstimantur virtutibus convenire.

XV. *De Crabrone.*

A. Crabro, *Offic. Aldrov. Mer. Pin. Jonst. Mouff. Charlt. ex.* The Hornet. *Usu.* Favi. *Vires.* Adversus Scrofulas equis infunditur. *Charlt.*

XVI. *De Formica.*

Pag. 536. post. lin. 6. adde,

A. 2. Formica major, *Offic. Aldrov.* major Hercules culanea ἱππομύρμηκας, *Charlt. ex.* alatæ ἱππομύρμηκες Aristoteli, *ejusd.* major Aristotelis ἱππομύρμηκας, *Jonst.* The Horse-Ant. *Vires.* Veneris excitat: oleum per infusionem Podagram & Paralysin juvat.

In Capite de Gummi Laccæ, *Garciæ* opinionem tradidi, nimirùm formatum illud eſſe à magnis quibuſdam formicis alatis: contrarias etiam opiniones retuli; ut eaſdem hîc repetere non ſit opus. Verùm an Arbores iſtæ à Formicis prædictis terebrentur, an ab Indica quadam Formica tota ſpecie diverſa, non auſim determinare,

XXI. *De Eruca.*

Pag. 538. poſt lin. 15. adde,

PLinuum Erucæ à *Dioſcoride* abſque deſcriptione nominantur. Hæ à *Matthiolo* in Pinis Tridentinis frequenter inveniri traduntur: quæ, quantum ex ejus deſcriptione colligere licet, gregariæ ſunt, Sepiariarum nonnullarum ad inſtar, quæ telâ amplâ univerſæ ſe includunt.

Inſecta Coleoptera, ſeu Vaginipennia.

XXII. *De Scarabæo.*

Pag. 539. poſt lin. 16. adde,

BUpreſtis, *Offic. Aldrov. Jonſ. Mouffet. Charlt. ex.* The Burn-Tow. Ex Cantharidum genere eſſe videtur; ſed oblongiore corpore; elytrum exterius ex viridi flaveſcit vel potiùs aurum imitatur. Longiora item crura habet,

bet, & craſſiuſcula. Oculi globoſi, prominentes. Ex fronte juxta oculos, duo cornua oblonga articulata gerit. Caput parvum; Os patulum durum robuſtum, forcipatum, dentatum, quo crudeliter vulnerat & mordet. Venter non rotundus, ſed in longum productus. *Vires.* Erodere, ulcerare, calorem elicere vim habent. *Dioſc.*

Bupreſtis à *Dioſcoride* memoratur his verbis: *Simili modo vocantur Bupreſtes genera quædam Cantharidum.* Quæ Deſcriptio adeò brevis eſt, ut magnas controverſias excitaverit inter Auctores Zoologicos. Deſcriptio quam hîc exhibeo à D. *Pennio* deſumpta eſt, qui affirmat, quòd circa Heydelbergam frequentes inveniantur; ſuntque Capricorni ſpecies. *Plinius* Bupreſtes in Italia frequentes eſſe ſcribit, quas *Matthiolus* Scarabæi parvum genus eſſe ait: *Mouffetus* præter prædictam Bupreſtin à *Pennio* deſcriptam, 3 aut 4 Scarabæorum ſpecies meminit, quas pro Bupreſtum generibus habet. Nonnulli Araneum parvum rubicundum pro Bupreſti habent, ſed præter rationem. Neque Gryllo-talpæ figura in Anglica editione *Dodonæi* abſque cenſura tranſeunda eſt.

Pag. 539. lin. 33. poſt verbum *Offic.* adde,

Cochenille, *Duret.* Coccinilla, *Laet.* Cochinele, Coccus radicum, *Grew. Muſ. R. S.* Cochinille, ſive Fici Indici grana, *Park.* Ficus Indicæ grana, *C. B.* Nepalnochezcli, ſeu Coccus Indicus in Tunis quibuſdam naſcens, *Nieremb.* Scaraboolus hæmiſphæricus Cochineeliſer, *Gaz. Pet. T.* 3. *fig.* 5. Cochineal, *Act. Philoſ. Lond. n.* 176. 193.

Pag

Pag. 541. lin. 24. ſubjunge,

Quamvis Cochinilla Officinarum Scarabæi Ladybird noſtratibus dicti ſpecies ſit; non eſt tamen noſter communis, ut D. *Salmonus* in *Diſpenſatorio* ſuo & *Seplaſiario Londinenſi* erroneè affirmavit. Nam quamvis 8 aut 10 ſpecies Scarabæi illius in Anglia viderim, nullus tamen ex eis compreſſus aut contuſus delicatum illum Cochinillæ colorem præbuit.

In *Actis Philoſoph. Londin. no.* 292. D. *Lewenhoeck* microſcopicas quaſdam obſervationes dedit de Cocconilla ad probandum eam animalem ſubſtantiam eſſe, non fructum aut excreſcentiam alicujus Plantæ, ut Mercator quidam Amſterodamenſis exiſtimabat. Quod ad argumentum quo utitur ad opinionem ſuam confirmandam, nimirùm quòd Inſecta hæc tranſmutationem non ſubeant, quia in ovis quæ ex eorum corporibus exemit, Animalculum ſex pedibus præditum ſemper obſervaverit; cùm ad contrarium probandum æquè inſervire poſſit hoc argumentum: nam cùm Scarabæorum genus ova ponit, quæ omnia in Hexapoda Animalcula abeunt quæ in Scarabæos tandem mutantur. His addere liceat, quod ingenioſus ille Rerùm naturalium exquiſitor D. *Jac. Petiver* in *Gazophylacio* ſuo *Tab.* 1. *fig.* 5. Cochiniliæ in omnibus ſuis formis figuras exhibuit: *Hexapodis, Aureliæ, Scarabæi.*

Pag. 542. lin. ult. ſubjunge,

XXV. *De Blatta.*

A Blatta, *Offic.* fœtida, *Mouffet. Charlt. ex. Aldrov. Jonſ. Inſect. Mer. Pin.* Scarabæus impennis tardipes, *Gazophylac. Nat. & Art. Tab.* 24. *Fig.* 7. The ſlow-leg'd Beetle. In cellis vinariis reperitur. *Vires.* Cum oleo decocta aurium dolores inſtillatu mitigant. *Dioſc.*

SECTIO

SECTIO II.

De Exanguibus majoribus.

Exanguia Mollia, ſive Molluſca.

Pag. 545. lin. ult ſubjunge,

II. *De Lepore marino.*

LEpus marinus, *Offic. Charlt. ex.* marinus primus, *Aldrov. Jonſ.* The Sea-Hare. Maris incola eſt. Loligini parvæ ſimilis eſt deſcribente Dioſcoride. *Vires.* Per ſeſe tritus, aut cum Urtica marina illitus capillos evellit. *Dioſc.*

APPENDIX.

Zoophyta Exanguia Mollia.

ZOophyta *ſunt, quæ nec animalium, nec plantarum, ſed tertiam ex utroque naturam habent, & ut* Ariſtoteles *loquitur,* Τὰ ἀπορώτερα ζῶα φυτῶν ἢ ζῴων, *quæ ambigunt inter plantam & animal, quæ Plantanimalia dici poſſunt.* C. B. Pin.

III. *De Pulmone marino.*

A Pulmo marinus, *Offic. Aldrov. C. B. Jonſ.* Sea-Lungs. Mari innatat. Colore eſt cryſtalli in modum pellucido, cum cœruleo miſto, ſubſtantia tam fragili, ut vix è mari integer eximi queat. *Vires.* Podagras pernioneſque emendat Pulmo marinus recens tritus & illitus. *Dioſc.*

IV. *De Urtica marina.*

URtica dicta, quòd admota contrectantis manum pungat. Plin.

A, Urtica marina, *Offic. Aldrov. Charlt. ex. Jonſ.* marina 5. & 6. Rondeletii, *C. B.* Urticæ vel Pulmonis marini ſpecies, *Mer. Pin.* Sea-Blubber. Aquis innatat æſtuque maris in litore ſæpe rejicitur. Copora ſunt pellucida rotunda compreſſa gelatinæ in modum cum venis rubris intermixtis. *Vires.* Cum Lepore marino viribus convenit.

Exan-

Exanguia Teſtacea.

Turbinata.

VIII. *De Buccino.*

Pag. 553. lin. 6. poſt verbum [oſtendimus] adde,

Clonia, *Offic.* eſt media pars circa quam teſtæ volumen calviculatim intorquet. *Vires.* Cremata ſimili modo Purpuris Bucciniſque facultatem urendi conſequuntur. *Dioſc.*

Bivalvia.

X. *De Oſtreo.*

Pag. 553. lin. 12. poſt verbum [eſt] adde,

3. *Oetus*, i. e. Veſicaria marina, *Offic. J. B. Chab. Cat. Angl.* Pila marina velut ex ampullis conſtans ad ſpumæ ſimilitudinem, *C. B.* Sea-Balls. Hæ æſtu maris in litora ſæpe rejiciuntur. 4. *Teſta petrificata*, i. e. Lapis Oſtracites, *Offic.* Oſtracites, *Laet. Boet.* maximus rugoſus & aſper, *Liſt. H. A. Plot. H. Ox. Tab.* 4. *fig.* 19. major craſſiuſculus, vulgare Oſtreo non abſimilis, *Lud. Lithog.* Teſtæ ſimilitudinem habet,

cruſtoſus & in laminas fiſſilis. In fodinis & glareoſis reperitur.

Pag. eadem, lin. 20. junge,

Oſtracite utuntur mulieres pumicis loco ad pilos auferendos. Potus in vino menſes fluentes ſiſtit. A purgatione ſumptus conceptionem prohibet. Ad nomas, & mammarum inflammationes imponitur utiliter. *Dioſc.* Cum floribus Chamæmeli ſumptus Lithontripticum inſigne æſtimatur.

Pag. 557. lin. ult. ſubjunge,

XV. *De Pectunculo.*

A Pectunculus, *Offic. Charlt. ex.* vulgaris, albidus, rotundus, circiter 26 ſtriis majuſculis, & planioribus donatus, *Liſt. H. A. A.* capite minore, rotundiore, & magis æquali margine, *Liſt. H. C.* Concha ſtriata prima, *Aldrov.* The Cockle. Paſſim in littore arenoſo magna copia reperiuntur. *Uſu.* Caro in culinis, teſta in Officinis. *Vires.* Caro gratiſſimi ſaporis eſt, tam cruda quàm cocta Ex teſta uſta & in cinerem redacta dentifricia optima conficiuntur.

XVI.

XVI. *De Tellina.*

A Tellina, *Offic. Aldrov. Jonſ. Charlt. ex.* maris Italici, *Bonan.* intùs ex viola purpuraſcens, in ambitu ſerrata, *Liſt. H. A. A.* ſubfuſca anguſtior intùs purpuraſcens, *ejuſd. H. C.* The Limpin. In mari capiuntur. *Vires.* Recentes alvo utiles, ſed maximè jus earum. Salitæ uruntur, tritique in cinerem & cum cedria inſtillatæ, avulſos palpebrarum pilos renaſci non patiuntur. *Dioſc.*

XVII. *De Chama.*

CHama, *Offic. Charlt. ex.* ab altero tantùm latere ferè naturaliter hiantibus, *Liſt. H. C.* Chama, alio nomine Glycymerides magna, hoc eſt, Chama magna dulcis, *Bonan.* Chama Glycymeris, *Aldrov. Rondel. Jonſ.* Baſtard-Cockle. In mari Iberico reperitur. *Vires.* Chamarum aliarumque conchularum in exigua aqua decoctarum jus, alvum ciet; id cum vino aſſumitur. *Dioſc.*

XVIII. *De Farragine.*

A Farrago, *Offic. Ariſtot.* Auſtralis, Alcyonium ſecundum Dioſcoridis, *C. B.* Veſicaria marina nigra, Farrago Ariſtotelis quorundam, *J. B. Chab.* Mytilorum aliorumve teſtaceorum fœtura nobis videtur.

Exan-

Exanguia Cruſtacea.

Pag. 558. poſt lin. 19. adde,

XX. *De Aſtaco marino.*

Aſtacus, *Offic. Aldrov.* marinus communis, *Jonſ.* marinus, *Mer. Pin. Charlt. ex.* The Lobſter. In mari capiuntur. *Vires.* Caro multum nutrit, undè in Phthiſi commendatur. Cruſta ſeu Teſta cremata in vino pota Renes expurgat, & Calculos frangit.

XXI. *De Squilla.*

Squilla, *Offic. Jonſ. Charlt. ex.* parva, *Mer. Pin.* parva Rondeletii, *Aldrov.* The Shrimp. In mari capiuntur. *Vires.* Cum Aſtaco viribus convenit.

Pag. ead. lin. antepenultima deleatur verbum *marinus*, cujus loco lege *Paguru*.

Pag.

Pag. 559. lin. ult. junge,

XXIV. *De Echino Marino.*

ECHinus marinus, *Offic. Mer. Pin. Aldrov. Jonſ.* The Sea Hedge-Hog. In alto mari capiuntur. *Vires.* Stomacho ventrique utilis eſt: urinam cit. Hujus teſta cruda inaſſata commodè medicamentis admiſcetur quæ Pſoras abſtergunt. Crematæ verò cinis ſordida ulcera expurgat, luxuriantem carnem reprimit. *Dioſc.*

CLAS-

CLASSIS SECUNDA.

De Animalibus Sanguineis.

SECTIO I.

De Piſcibus.

De Piſcibus Anguilliformibus, ſeu lævibus, lubricis.

Pag. 563. poſt lin. 5. adde,

I. *De Lampetra.*

LAmpetra, figura oris rotunda ſeu ovali, foramine in ſummo roſtro, pinnarumque tum ventralium tum branchialium carentia ab aliis omnibus ſui generis, hoc eſt longis & lubricis piſcibus, facilè diſtinguitur. R. Ichy. p. 104.

A. Lam

A. Lampetra, *Offic. Rondel. Jonſ.* major, *Aldrov. Raj. Ichthy. Salvian.* Muſtela ſive Lampetra Bellonii, *Geſn.* The Lamprey, or Lamprey-Eel. In fluminibus majoribus, quæ è mari ſubeunt, frequens reperitur. *Uſu.* Caro. *Vires.* Caro venerem ſtimulat, multum nutrit.

II. *De Serpente marino.*

SErpens marinus, *Offic. Aldrov. Geſn. Rondel. Bellon. Salv. Jonſ. Charlt. ex.* The Sea-Serpent. In mari Mediterraneo reperitur. *Uſu.* Caro. *Vires.* Cum radice Lilii Urinæ incontinentiam juvat. *Plin.*

Pag. ejuſd. poſt lin. 11. adde,

IV. *De Remora.*

REmora, *Offic. Aldrov. Imperat. Charlt. ex. Jonſ.* Iperuquiba & Piraquiba Braſilienſibus, *Marg.* The Sucking-Fiſh. In alto mari reperitur. *Vires.* Venerem inhibet, Abortus prohibet, fœtumque ad maturitatem continere creditur. *Aldrov.*

Pag. 564. poſt lin. 3. adde,

VI. *De Siluro.*

SIlurus, *Offic.* Rondeletii, *Geſn.* Glanis, *Aldrov. Salv.* The Sboat-Fiſh. In Danubio flumine, &c. reperitur. *Uſu.* Caro. *Vires.* Recens.

cens in cibo nutrit & facilem præbet alvum, sale verò conditus, minimum suppeditat alimentum: arteriam expurgat & vocem expedit. Illita saliti caro aculeos & infixa corpori spicula extrahit. Muria ejus incipientibus dysenteriis prodest, si in desidentium fœtus adjiciatur: fluxiones siquidem ad summa cutis elicit: ischiadicis infusu medetur. *Dioscor.*

Pag. ejusd. lin. ult. subjunge,

De Piscibus corpore contractiore vel saltem non admodùm lubrico, qui pinnis ventralibus carent.

VIII. *De Hippocampo.*

A Hippocampus, *Offic. Rondel. Aldrov. Mouffet. Jonst. Charlt. ex.* The Sea-horse. In Mediterraneo capiuntur. *Vires.* Cremati cinis excepus cum Liquida pice, Auxungia, seu Amaracino Unguento illitus, Alopecias replet. *Dioscor.* Remedium adversus Canis rabidi morsum. *Ælian.*

IX. *De Acu.*

ACus, *Aristot.* secunda species, *Rondel.* secunda Species Rondeletii, *Gesn.* Acus Aristotelis, *Aldrov. Jonst.* Typhle, sive Typhline Antiquorum

tiquorum, *Bellon.* The Pipe-Fish. In mare Adriatico invenitur. *Vires.* Cinerem in potu ad ſtillicidium urinæ commendat *Galen.*

Piſces non aculeati tribus in dorſo pinnis donati.

QUamvis lapides ſeu officula Dentalio in Officinis Pharmacopolarum ſimilia in capitibus Aſini Antiquorum dicti obſerventur, ut & Aſelli mollis; & ut opinor, in reliquis hujus generis omnibus: verum tamen ſeu genuinum ex Aſello majore deſumitur. Quocircà Synonyma omnia Prioris mei libri p. 656, dele, & eorum vice ſubſtitue,

X. *De Aſello.*

A. 1. Aſellus, *Offic. Jonſ.* major, *Charlt. ex.* major vulgaris, *R. Ichth.* Merlucius, Cabeliau, *Mer. pin.* major vulgaris, Belgis Cabeliau, Morhua vulgaris (maxima Aſellorum ſpecies) *Bellon.* Morhua, vel Molva altera, *Aldrov.* Molva, vel Morhua altera minor, *Rondel. Geſn.* The Cod-fiſh, or Keeling.

A. 2. Oniſcus, *Offic.* Aſellis mollis major, ſeu albus, *R. Ichth.* mollis, *Jonſ. Tab.* 2. *Mer. Pin.* An Merlanus, *Rondel.* The Whiting. In mari reperitur. *Uſu.* Caro, Jecur. *Vires.* Caro omnes gentes & judicant, & ſentiunt eſſe ſaluberrimum, *Turn.* Jecur in Phthiſi commendatur.

Pag.

Pag. 565. lin. 1. lege,

Piſces non aculeati quibus unica in dorſo pinna marini.

Piſces non aculeati, quibus unica in dorſo pinna, fluviatiles & edentuli.

Pag. 570. poſt lin. 14. adde,

XVIII. *De Leuciſco.*

A Leuciſcus, *Offic. Bellon. Jonſ. Charlt, ex. Aldrov. Mer. Pin.* ſecundus *Rondel.* Leuciſci ſecunda ſpecies Rondeletii, *Geſn.* The Date, or Dare. In fluviis reperitur. *Uſu.* Caro in Culinis. Pinguedo & Fel in Officinis. *Vires.* Caro mollis ſuaviſque eſt. Pinguedo aurium doloribus ſuccurrit, & cum Felle ejuſdem permiſta oculorum caliginem abſtergit. *Rondel.*

XIX. *De Rutilo.*

A Rutilus, *Offic. R. Ital.* ſive Rubellus fluviatilis, *Geſn.* fluviatilis Geſneri, *Jonſ.* ſive Rubellus fluviatilis Geſneri, *Aldrov.* ſive Rubellus fluviatilis, *Charlt. ex.* ſive Rubellus, *Mer. Pin.* Phoxinus alter, *Rondel.* Une Roſſe, *Bellon.* The Roche. In fluviis frequens eſt. *Uſu.* Caro *Vires.* Ad venerem excitandam à quibuſdam æſtimatur.

Piſces

Piſces non aculeati quibus duæ in dorſo pinnæ eriguntur.

XX. *De Genere Thynino.*

Nota ſunt, præter pinnas inſigniores pinnulæ aliquot exiguæ propè caudam ſummo dorſo, & imo corpore innaſcentes. R. Ichth. pag. 176.

A. 1. Thunnus, *Offic. Aldrov. Jonſ. Charlt. ex.* Thynnus, ſeu Thunnus, *Bellon. Geſn.* Orcynus, *Rondel.* The Tunney-Fiſh, or Spaniſh Mackrel. In alto mari invenitur. *Vires.* Conditanei Thunni caro ſumpta iis auxiliatur, quos vipera, nomine præſter, momorderit: ſed oportet vinum quàm plurimum ſubinde cogantur haurire, ita ut vomitione reddatur. Contra Acrimonias eſitatorum maximè valet; canum morſibus utiliſſimè illinitur. *Dioſc.*

A. 2. Scomber, *Offic. Rondel. Bellon. Geſn. Aldrov. Charlt. ex. Jonſ.* Scombrus, *R. Ichthy. icon.* The Mackrel, or Macarel. Maris incola eſt. *Vires.* In Ictero commendatur. Jecoris obſtructiones juvat. *Ælian.*

Pag. 571. poſt lin. 12. adde,

XXII. *De Gobio.*

A Gobius niger, *Offic. Bellon. Rondel. Fonſ.* niger Rondeletii, *Aldrov. Geſn.* marinus, *Charlt. ex.* marinus fluviatili viridior, & maculis magis reſperſus, *Mer. Pin.* Go vel Gobius marinus, *R. Ichy. Icon.* The Sea-Gudgeon, or Rock-Fiſh. In rupibus marinis capitur. *Vires.* Aſſus & ſine ale manſus, Dyſenterias, Lienterias, & nimia egerendi deſideria, quæ cum dolore fiunt, ſanat, *Sim. Seth.* Illitus contra ſerpentium, canumque morſus auxilio eſt. *Dioſc.*

Piſces

Piſces ſpinoſi quibus pinnarum dorſalium radii aliqui aculeati ſunt.

§ *Piſces aculeati duabus in dorſo pinnis, anteriore autem ſpinis radiata.*

Pag. 572. poſt lin. 16. ſubjunge,

XXV. *De Milvo.*

Milvus, *Offic. Bellon. Salvian. Aldrov. Jonſ. Charlt. ex.* Milvago, *Plin.* Hirundo, *Rondel. Geſn.* Pirabebé prima, *Piſon.* ἰπτὴ, *Oppian.* The Flying-Fiſh. In Oceano, & in mari Mediterraneo plurimi habentur. *Uſu.* Fel. *Vires.* Oculorum caliginem abſtergit.

XXVI. *De Mullo.*

Mullus, *Offic. Bellon.* minor, *Salv.* barbatus, *Rondel.* barbatus Rondeletii, *Geſn. Aldrov.* barbatus minor, *Charlt. ex. Jonſ.* The leſſer Mullet. In mari Mediterraneo reperitur. *Uſu.* Caro. *Vires.* Mullorum aſſiduo cibo aciem oculorum hebetari conſtat. Is marini Draconis Aranei

nei & Scorpionis morſibus medetur, ſi crudus atque diſſectus admoveatur. *Dioſc.*

XXVII. *De Uranoſcopo.*

URanoſcopus, *Offic. Aldrov. Jonſ. Salv.* ſeu Cœli ſpectator *Charlt. ex.* Callionymus vel Uranoſcopus, *Rondel.* vel Uranoſcopus Rondeletii, *Geſn.* ἀστρογνίτης *Oppian.* The Star-Gazer. In mari Mediterraneo frequens capitur. *Uſu.* Fel. *Vires.* Prælens ad Oculorum ſuffuſiones remedium eſſe æſtimatur.

XXVIII. *De Dracone Marino.*

A Draco marinus, *Offic. Bellon.* Draco, *Jonſ.* marinus & Traſcina, *Salv.* ſive Araneus *Plin. Rondel. Geſn.* Araneus, *Charlt. ex.* alter *Aldrov.* The Weaver. In Oceano nec non mari Mediterraneo capitur. *Uſu.* Cineres recentes è capite, Oſſa. *Vires.* Recentis è capite cinis, contra omnia venena prodeſſe, affirmat *Rondel.* Oſſibus ſcarificatis gingivis dentium dolores ſedari ſcribit *Plin.*

XXIX. *De Umbra.*

UMbra, *Offic. Salv. Rondel. Geſn.* marina, *Aldrov.* Chromis, *Bellon. Charlt. ex.* Sciœna ſive Umbra, *Jonſ.* The Grunter, or Shadow-Fiſh. In mari Mediterraneo capitur. *Uſu.* Oſſa in capite reperta, Lapides Umbrarum Officinis dicti.

Vires.

Vires. Ad dolorem colicum commendantur. In Gallia aurifices argento incluſos vulgò divendere ſolent, appellantque *Pierres de Colique*, quaſi lapides colicis utiles. Aiunt enim geſtatos ac collo appenſos, non ſolùm colicos dolores abigere, ſed etiam vetare, nè amplius redeat. *Bellon.*

XXX. *De Coracino.*

COracinus, *Offic. Rondel. Aldrov. Charlt. ex. Jonſ.* Corvinus, *Salv.* Corvo, *R. Ichth. icon.* The Crow-Fiſh. Cum priore capitur. *Uſu.* Oſſa in capite reperta, Lapides Coracini Officinis dicta. *Vires.* Ad Nephriticum dolorem vel Colicum à vulgo æſtimantur, ab aliis etiam ad morbum regium. *Rondel.*

Piſces aculeati unica in dorſo pinna, radiis anterioribus ſpinoſis poſterioribus mollibus.

XXXI. *De Melanuro.*

MElanurus, *Offic. Aldrov. Rondel. Bellon. Geſn. Salv. Charlt. ex. Jonſ.* The Black-Tail. In mari Mediterraneo reperitur. *Vires.* Aſſus viſum acuit, jus verò Colicos ſanat, teſte *Kranide.*

XXXII.

XXXII. *De Mæna.*

MÆna *Offic. Rondel. Bellon. Gesn. Aldrov. Charlt. ex. Jonst.* The Cackerel. In mari Mediterraneo etiam reperitur. *Vires.* Ex capitibus cinis, si illinatur, callosas sedis rimas abolet. Ejus etiam garum oris putrilagines collutione sedat. *Dioſc.*

XXXIII. *De Smaride.*

SMaris, *Offic. Rondel. Bellon. Gesn. Jonst. Charlt. ex.* The White-Cackerel. Maris Mediterranei incola est. *Vires.* Saliti caput exustum, excrescentes ulcerum oras pulvillosque reprimit, nomas cohibet, thymos clavosque absumit, Caro non secus ac salsamentum prodest à Scorpione percussis, aut à cane demorsis. *Dioſc.*

XXXIV. *De Turdo.*

A. 1. Turdus, *Offic. Charlt. ex.* secundus, *Aldrov. Jonst.* vulgatissimus, *R. Ich.* primus, *Rondel.* The Wrasse, or Old-Wife. In Oceano etiamque mari Mediterraneo reperitur. *Vires.* In Epilepsi & Pleuritide commendat *Trallian.*

A. 2. Merula, *Offic. Salv. Rondel. Aldrov. Jonst. Charlt. ex.* Turneri, *Mer. Pin.* Turdus niger, *R. Ich.* The Cook-Fish. In Oceano reperitur. *Vires.* In curatione Epilepsiæ, & dysenteriæ hepaticæ et intemperie frigida exhiberi jubet *Trallian.* In

distem

diſtemperantia hepatis & in febricitantibus commendat *Plin.*

XXXV. *De Julide.*

JUlis, *Offic. Salv. Rondel. Aldrov. Geſn. Bellon. Jonſ. Charlt. ex.* The Rain-bow-Fiſh. Circa Genuam frequens eſt. *Vires.* Jus alvum emollit, & urinas ciet. *Plin.*

XXXVI. *De Scorpio Marino.*

SCorpius marinus, *Offic.* Scorpius, *Aldrov. Jonſ. Salv.* major, *Rondel. Geſn.* Scorpio, *Charlt. ex.* The Scorpion-Fiſh. In mari Mediterraneo reperitur. *Uſu.* Fel. *Vires.* Ad ſuffuſiones oculorum, albuginem & hebetudines convenit. *Dioſc.*

XXXVII. *De Aſpredine.*

ACernua, *Offic.* fluviatilis, *Bellon. Geſn. Charlt. ex.* Aſpredo *Caii*; Aurata fluviatilis, *Trag.* Perca fluviatilis minor, *Aldrov. Jonſ.* fluviatilis minor Aurata Tragi, *Geſn.* The Ruff. In rivulis majoribus Angliæ. *Uſu.* Oſſicula in capite reperta. *Vires.* Adverſus calculos renum, & quæ in coſtis alibive ſentiuntur dolores pungentes commendat *Geſn.*

Piſces Cartilaginei.

Pag. eadem lin. ult. ſubjunge,

§ *De Cartilagineis planis.*

XXXVIII. *De Paſtinaca marina.*

A. Paſtinaca, *Salv.* marina, *Offic. Charlt. ex.* marina lævis, *Bellon.* marina lævis Bellonii, *Aldrov. Jonſ.* marina prima, *Rondel.* Aquila piſcis, ſeu Paſtinaca marina, *Mer. Pin.* The Poyſon-fiſh, Fire or Fierce-flaw. In alto mari reperitur. *Uſu.* Jecur, Aculeus qui ejus cauda enatus. *Vires.* Jecur ad pruritum conferre prædicant, in oleo decoctum lichenas & lepras tollit. *Wotton.* Aculeus adverſus ſquamis reflectitur, dentium dolores mitigat, nam eos frangit & evocat. *Dioſc.*

XXXIX. *De Raia.*

A. Raia, *Offic.* clavata, *Aldrov. Rondel. Geſn. Mer. Pin. Charlt. ex.* clavata prima, *Jonſ.* The Thornback. In Oceano reperitur. *Uſu.* Caro, Jecur, Fel. *Vires.* Caro Venerem ſtimulat, analeptica eſt. *Jecur* eaſdem vires obtinet. *Fel* oculorum caliginem abſtergit, pruritum ſanat.

XI.

XL. *De Squatina.*

A Squatina, *Offic. Aldrov. Salv. Jonſ. Charlt. ex. Rondel. Geſn.* The Kingſtone, or Monk-Fiſh. In Oceano Britannico & alibi capitur. *Uſu.* Ova, Coria, Cinis. *Vires.* Ova exſiccata ad ſiſtenda alvi profluvia multum conferre experientia compertum piſcatorum, qui iis ad omnes alvi fluores utuntur, *Rondel.* Ex cute optimum fit in pſora & ſcabie ſmegma, ejuſdemque cinis contra alopeciam & ulcera capitis manantia prodeſt. *Aldrov.*

XLI. *De Torpedine.*

TOrpedo, *Offic. R. Ith. Aldrov. Salv. Rondel. Jonſ. Charlt. ex. Geſn.* The Cramp-Fiſh. In mari mediterraneo reperitur. *Vires.* Diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus vehementiam mulcet, eadem appoſita everſam ſedem prociduamque coercet. *Dioſc.*

De Cartilagineis longis.

XLII. *De Cane Carcharia.*

A Canis Carcharias, *Offic. Charlt. ex. Geſn.* Carcharias, ſeu Lamia, *Rondel.* Canis Ariſtoteli, *Aldrov. Jonſ.* The White Shark. Tum mari Mediterraneo, tum in Oceano reperitur.

Uſu. Dentes Serpentis, & dentes ejuſdem petrifacti *Gloſſopetræ*, *Offic.* dicti. *Vires.* Dentes adverſus venena æſtimantur: eos mulierculæ è collis puerorum ſuſpendunt, quoniam dentitionem juvare vulgò creduntur, puerorumque arcere pavores, *Rondel.* *Gloſſopetræ* vim alexipharmacam obtinere à quibuſdam creditur.

De Piſcibus Cetaceis.

Pag. 574. lin. ult. ſubjunge,

XLV. *De Delphino.*

A. Delphinus, *Offic. Aldrov. Rondel. Geſn. Charlt. ex. Jonſ.* The Dolphin. In Oceano Britannico & alibi invenitur. *Uſu.* Jecur, Cinis, Venter, Adeps. *Vires.* Venter ſiccus & tritus in potu Splenèticos ſanat. Jecur aſſum & in Cibo ſumptum tertianam, quartanamque & omnem nocturnum typhum integrè ſanare aſſerit *Kiranid.* Cinis inter medicamenta quæ Lychenas & Lepras tollunt, enumeratur à *Plinio.* Adeps medetur Hydropicis liquatus & cum vino potus. *Idem.*

XLVII.

XLVII. *De Cete.*

Pag. 575. Dele vocem *Orca* omniaque ſynonyma in 2. 3. & 4ta lineis ſequentibus, ut ad Sperma Ceti minimè pertinentia, & ſequentia adde,

1. A. Cetus, *Offic. Cluſ. exot.* Balæna, *R. Ith. icon.* Tab. fig. 3. *Jonſ. icon.* Tab. 42. macrocephala bipennis *Sib. Obſ.* Balænarum tertium genus, *Purchaſ.* Trompa, *Park.*

Præter prædictas duæ aliæ Cetorum ſpeciès à D. *Sibbald. E. A.* recenſentur in quorum capitibus *Sperma Ceti* invenitur.

Pag. 577. lin. 1. dele verbum *Cetus, Offic.* & in ejus loco ſubſtitue Balæna, *Offic.*

Alia præterea aliquot Piſcium ſpecies à D. *Salmon* in *Pharmacopœia* ſua *Londinenſi* memorantur, ut *v. g. Cyprinus latus, Alauſa minor, Aburnus Liparis, Apuæ Corbitæ, Aquila marina, Aurita, Conger, Clupea, Cuculus, Lavaretus, Lyra, Locha, Orbes, Paſſer & Rhombus*: quibus cùm nullæ vires medicæ attribuantur, ſed uſus duntaxat culinares, plura de iis dicere ſupersedeo nomina ſola ſufficere exiſtimans.

SECTIO II.

De Avibus.

Aves aquaticæ fissipedes maximæ.

Pag. 582. post lin. 2. adde,

Aves aquaticæ fissipedes Piscivoræ.

Pag. ead. post lin. 15. adde,

II. *De Ardea.*

A. 2. Asterias, *Offic.* Ardea stellaris, *R. Ornith. Gesn. Charlt. ex.* Ardea asterias sive stellaris, *Aldrov. Jonst.* Taurus, *Plin.* Butorius & Botaurus *recentioribus*: Ocnus, *Aristotel.* The Bittern, or Mire-Drum. Juncetis, arundinaceis, &c. latitat. *Usu.* Cutis, Plumæ. *Vires.* Ustæ Hæmorrhagias sistunt.

Pag.

Pag. 583. poſt lin. 4. adde,

Aves aquaticæ limoſugæ.

IV. *De Scolopace.*

A. Gallinago, *Offic.* Scolopax, *R. Ornith. Charlt. ex.* Scolopax ſive Perdix Ruſtica, *Aldrov. Jonſ.* Ruſticula, vel Perdix ruſtica major, *Geſn.* Ruſticola major, *Mer. Pin.* The Wood-cock. In aquoſis gaudet. *Uſu.* Cineres. *Vires.* Lithontriptici æſtimantur.

V. *De Pluviali.*

GLottis, *Offic. Baltn. Geſn.* Limoſa Venetorum, *ejuſd.* Pluvialis major, *Aldrov.* major Aldrovando, *Jonſ. Charlt. ex.* The Great Plover. In aquoſis gaudet. *Uſu.* Fel. *Vires.* Oculorum morbis medetur. Gelatina carnis Analeptica æſtimatur.

Aves aquaticæ fissipedes Insectivoræ.

VI. *De Vanello.*

A. Vanellus, *Offic. Charlt. ex. Mer. Pin. Jonst. Gesn.* Capella sive Vanellus, *Aldrov. R. Ornith.* The Lapwing, or Bastard-Plover. In aquosis etiam gaudet. *Usu.* Cineres, Cor, Cutis. *Viren.* Cineres in vino poti colicos juvat, & in Cataplasmatis forma applicata, Canis rabidi morsus sanat. Cor dolorem lumborum mitigat. Cutis in cephalalgia æstimatur.

Aves aquis innatantes fissipedes, quibus digiti nullis ad latera membranis augentur.

VII. *De Gallinula.*

Gallinularum notæ characteristicæ, quibus ab aliis avium generibus distinguantur, sunt, Caput parvum, Corpus ferè adductum, gracile & ad latera compressum: Rostrum breve & modicè inflexum: Alæ breviusculæ, concavæ & Gallinaceis similes: Cauda perbrevis: Crura longa: Digiti longissimi: Ungues latus breves. R. Ornith. p. 232.

A.

A. Gallina aquatica, *Offic.* Gallinula chloropus major, *Aldrov. R. Ornith. Jonſ.* chloropus, *Charlt. ex.* The Common Water-Hen, or Wood-Hen. In piſcinis juxta nobilium ædes plerunque victitat. *Uſu.* Ventriculus, Plumæ eorumque cineres. *Vires.* Ventriculus in Aſthmate commendatur. Fumus plumarum contra Paſſionem Hyſtericam æſtimatur. Cineres ejuſdem ulcera vetera, & fiſtulas ſiccant.

Aves natarices fiſſipedes digitis ad latera membranis auctis.

VIII. *De Fulica.*

A. Fulica, *Offic. Aldrov. Jonſ. Geſn.* Cotta major, ſive Calva, *Charlt. ex.* Phalaris, *Kiranid.* Mergus niger & Pullus aquaticus, *Albert. mag.* An Cotta, ſive Cutta Anglorum, *Aldrov. Jonſ.* The Coot, or Bald-Coot. Locis paluſtribus & ſtagnantibus delectatur. *Uſu.* Caro, Cor. *Vires.* Cor in Epilepſia commendatur. Caro contra ictus Araneorum in uſu eſt.

Aves palmipedes anguſtiroſtræ.

IX. *De Mergo.*

Roſtris anguſtis, in extremo aduncis, ſerratis à reliquis Palmipedibus tetradactylis digito poſtico ſoluto differt.

A. Morgus, *Offic.* Merganſer, *Charlt. ex. Jonſ. Aldrov.* Fœmina, *R. Ornith.* Mergus cirratus longiroſter major, *Aldrov. Harl. Bellon.* The Gooſander, or Dundiver. In oris maritimis reperitur. *Uſu.* Jecur. *Vires.* Inveteratum autem ſale Mergi, jecur ex hydromelite binis ligulis potum, ſecundas pellit, *Dioſc.* Id aſſatum cum oleo, & modico ſale datum, mirificè conferre à rabido cane morſis aſſerit *Ætius.* Avis totum aſſum & in cibo ſumptum elephantiaſi & ſpleni medetur. Sanguis ejus antipharmacum eſt, & feris venenatis reſiſtit. Ova dyſenteriam, & renes & ſtomachum ſanant. *Kiranid.*

X. *De Laro.*

Larus palmipes eſt, Roſtro oblongo, anguſto, acuto, ac parumper in extremo recurvo; naribus oblongis; alis longis & validis, cruribus breviuſculis; pedibus parvis, &c. R. Ornith. p. 261.

A. Larus, *Offic.* major, *Aldrov.* hybernus, *Baltn.* major Aldrovandi, *R. Ornith.* fuſcus ſive hybernus, *ejuſd.* The Coddy-Moddy. In rivulis ſalſis gaudet. *Uſu.* Cerebrum, Cor, Ventriculus. *Vires.*

Vires. Cerebrum ſiccatum Epilepſiam curat. *Aurelian.* Cor in partu difficili commendatur. Ventriculum & concoctionem juvat. *Kiranid.*

Aves palmipedes cruribus brevioribus Latiroſtræ.

Pag. 584. lin. ult. adde,

XIII. *De Vulpanſere.*

A Vulpanſer, *Offic. Aldrov. Charlt. ex.* ſive Chenalopex, *Jonſ.* Tadorna, *Bellon.* Chenalopex, Vulpanſer, *Mer. Pin.* Tadorna Bellonii, Vulpanſer quibuſdam, *R. Ornith.* The Shel-Drake, Burrogh-Duck, or Ber-Gander. In maritimis obſervatur. *Uſu.* Adeps. *Vires.* Contra Herpetes, & tumores faciei à quibuſdam commendatur.

Aviculæ roſtris longiſſimis ſeu Piſcivoræ.

Pag. 586. poſt lin. 12. adde,

XVI. *De Merope.*

MErops, *Offic. Aldrov. Bellon. Jonſ. Charlt. ex.* ſive Apiaſter, *R. Ornith.* The Bee-Eater. In Creta & Italia frequens reperitur. *Uſu.* Avis ipſa,

ipſa, Cor, Fel: *Vires.* Merops & Cor ejus, Cardiacos, icteros & ſtomachicos juvant; Fel cum melle & ſucco Rutæ oculorum ſuffuſionem ſanare tradit *Kiranid.*

Aviculæ roſtris tenuibus ſeu Inſectivoræ.

XVII. *De Alauda.*

Pag. 587, lin. 1. & 2. dele, *Aldrov. Geſn.* vulgaris *R. Ornith. pag.* 149. cujus in loco ſubſtitue,

CRiſtata, *Geſn. Aldrov.* criſtata, Viennæ Auſtriæ viſa & deſcripta, *R. Ornith. p.* 151. The Creſted-Lark.

Pag. eadem Galeritæ viribus adde,

Hæc aſſa & in cibo ſumpta cæliacos adjuvat. *Dioſc.*

XVIII. *De Hirundine.*

Pag. ead. lin. ult. ſubjunge,

A. 2. Apos, *Offic. Aldrov. Jonſ. Geſn.* major, *Turn. Charlt. ex.* Hirundo apus, *R. Ornith. Mer. Pin.* The Black-Martin, or Swift. Æſtate in Anglia venit. *Uſu.* Avis ipſa. *Vires.* In vino ſumpta tormina ſanat. *Plin.*

3. Hirun-

3. Hirundo, *Offic.* maritima, *Act. Philoſoph. Lond. n.* 285. *pag.* 1396. Sinenſis nido eduli Bontii, *R. Ornith. p.* 157. Hirundo Chinenſis, *Bont. p.* 66. An Hirundo exotica aquatica, *Jonſ. Mantiſſ.* The Indian Swallow. In maritimis Chinenſibus. *Uſu.* Nidus ſemi-hemiſphæricæ figura, ovi Anſerini magnitudine, pellucidus, ſubſtantiâ ichthyocollam referente. *Vires.* Venerem ſtimulat. An ex ſpermate quorundam Piſcium, vel ex Gum. plantarum ruponſium. D. *Tancredo Robinſon*, M.D.

XIX. *De Rubecula.*

A Rubecula, *Offic. Jonſ. Charlt. ex. Geſn.* ſive Erithacus, *Aldrov. R. Ornith.* The Robin-red-breſt, or Ruddock. *Uſu.* Avis ipſa. *Vires.* Venerem ſtimulare à quibuſdam æſtimatur.

XX. *De Luſcinia.*

A Luſcinia, *Offic. Aldrov. Geſn. Jonſ. Charlt. ex.* ſeu Philomela, *R. Ornith.* ſeu Luſciniola, *Mer. Pin.* The Nightingale. *Uſu.* Caro, Fel. *Vires.* Caro in Cachexia prodeſt, cerebrum confortat. Fel cum Melle illitum, viſum perfectè acuit. *Kiranid.*

XXI. *De Ficedula.*

A Ficedula, *Offic. Charlt. ex.* Atricapilla, *Jonſ.* ſive Ficedula, *Aldrov. R. Ornith. p.* 162. The Black-Cap. *Uſu.* Avis ipſa. *Vires.* Ficedula in cibo aciei viſui medicamentum præbet. *Dioſc.*

Avicula

Aviculæ magnis craſſis & validis roſtris ſeu Phytivoræ.

Pag. 589. poſt lin. 5. adde,

XXV. *De Rubicilla.*

A Rubicilla, *Offic. Charlt. ex. Mer. Pin.* ſeu Pyrrhula Aldrovandi, *R. Ornith.* Pyrrhula ſeu Rubicilla, *Aldrov. Jonſ.* Byrriola, *Scalig.* The Bull-Finch, Alp, or Nope. *Uſu.* Caro. *Vires.* In Colicos affectus à quibuſdam æſtimatur.

Pag. eadem lin. 14. adde,

XXVII. *De Carduele.*

A Carduelis, *Offic. R. Ornith. Aldrov. Geſn. Jonſ. Charlt. ex.* Aurivittis, *Turner.* Chryſomitris & Avis Jovis, *quibuſdam.* The Gold-Finch. *Uſu.* Avis ipſa. *Vires.* Aſſa & in cibo ſumpta, Iliacos & Colicos perfectè curat. *Kiranid.*

XXVIII. *De Linaria.*

A Linaria, *Offic. Aldrov. Geſn. Jonſ. Mer. Pin. Charlt. ex.* vulgaris, *R. Ornith. pag.* 190. The Common Linnet. *Uſu.* Caro. *Vires.* Analeptica à quibuſdam æſtimatur, Calculos è Renibus & Veſica expellit.

Avi

Aves roſtro & unguibus minùs hamatis majore.

§ *Aves majores roſtris craſſis, validis & longiuſculis rectis.*

Pag. 590. lin. ult. ſubjunge,

XXXI. *De Monedula.*

A. Monedula, *Offic. Jonſ. Charlt. ex.* Graculus vel Monedula, *Turn. Mer. pin.* Monedula ſive Lupus, *R. Ornith. Aldrov.* The Jack-Daw. *Uſu.* Caro. *Vires.* Externè applicata tumores diſſolvit, & Scrophulas juvat.

XXXIII. *De Graculo.*

GRaculus, *Offic. Charlt. ex.* Argentoratenſis, *Aldrov. R. Ornith. Jonſ.* The Roller. In agro Argentoratenſi reperitur. *Vires.* Cum Monedula viribus convenit.

Aves

Aves majores roſtris brevioribus aut minoribus donatæ, ſeu Granivoræ.

Gallinaceum Genus.

XXVI. *De Gallo gallinaceo.*

Pag. 593. lin. 7. poſt verbum *Ova*, adde,

LApis in ventriculo reperitur *Lapis Alectorius* in *Officinis* dictus: colore variat, interdum enim Chalcedonio & Cryſtallo obſcuro ſimilis eſt, interdum fuſcum, vel cinereum colorem habet, interdum ſanguineis venis diſtinguitur: rarò, *Plinio* teſte, fabæ magnitudinem excedit.

Pag. 594. ad finem. Vires Galli gallinacei adde,

Lapis Alectorius Venerem excitat ori incluſus, ſi im ac cordis æſtum ſedat, mulieribus virorum gratiam conciliare, conſtantiam, ac eloquentiam geſtatori tribuere, contraque quævis pericula tutum facere creditur, ſcribit *Bætius*, ſed credat qui vult.

Pag.

Pag. 595. poſt lin. 11. adde,

XXVIII. *De Meleagride.*

A. Meleagris, *Offic.* Gallo-parvo, *Aldrov. Geſn. Jonſ. Charlt. ex. Mer. pin.* Gallo-pavo ſive Meleagris & Numidica avis, *R. Ornith.* Gallus Indicus, *quibuſdam.* The Turkey. *Vires.* Caro Analeptica æſtimatur, Veneremque excitans.

Pag. 596. poſt. lin. 9. adde,

XXXI. *De Attagene.*

A. Attagen, *Offic. Aldrov. Jonſ. ex. Bellon.* Lagopus altera, *Plin.* Attageni Aldrovandi ſeu Francolino Italorum ſimilis ſi non eadem, *R. Ornith.* The Goz-Cock, Moor-Cock, or Red-Game. In altiſſimis montibus reperitur. *Uſu.* Caro, Fel. *Vires.* Conceditur purulentis à *Tralliano*, Nephriticis à *Galeno.* Cerebrum & genituram auget. *Avicen.*

Pag. 597. lin. ult. ſubjunge,

XXXIII. *De Turdis.*

Notæ omnibus communes ſunt, magnitudo inter Columbas & Alaudas media; Roſtrum longitudinis & craſſitiei mediocris, deorſum modicè inflexum; Os intus flavum: Cauda longa; victus

ex

ex baccis & insectis promiscuus. R. Ornith. pag. 137.

A. 1. Turdus, *Offic. Charlt. ex.* primus, *Aristot.* vulgaris, *Mer. Pin.* viscivorus minor, *Bellon.* simpliciter dictus, *Aldrov. Jonst.* simpliciter dictus sive Viscivorus minor, *R. Ornith.* The Mavis, or Throstle. *Vires.* Myrtorum baccis farti & assi ventris profluvio laborantibus exhibentur, *Plin. Bellon.* Tempore pestis in aceto macerati laudantur, *Alexand. Bened.* Pulverem adversus Napellum commendat *Gainarius.*

A. 2. Merula, *Offic. Aldrov. Jonst. Charlt. ex. Mer. pin. Gesn.* vulgare, *R. Orinth.* Collyrion, *Turn.* The Black-Bird. *Usu.* Avis ipsa, Stercus. *Vires.* Avis inassata cum Myrti baccis dysentericis mederi scribit *Plin.* Fimus cum aceto mistus extirpat lentigines. *Jonst.*

A. 3. Sturnus, *Offic. Aldrov. Jonst. Gesn. Charlt. ex.* vulgaris, *Mer. Pin.* The Stare, or Starling. Circa Turres & altiora ædificiorum culmina. *Usu.* Fimus. *Vires.* Cosmetica æstimatur, ad alphos, pannos, impetiginem & morpheam. *Galen.*

4. Galgulus, *Offic.* Galbula Aldrovandi seu Picus nidum suspendens, *R. Ornith.* Icterus, *Plin.* Chloreus, *Aristot.* Oriolus, *Albert.* Picus nidum suspendens. *Aldrov. Jonst.* The Wittwall, by *Salmon* called the Yellow-Hammer, *i. e.* Emberica lutea. *Vires.* Ad morbum regium commendat *Plin.*

Aves

Aves roſtro & unguibus aduncis ſeu Rapaces vel Carnivoræ.

Aves Rapaces diurnæ.

XXXIV. *De Aquila.*

Pag. 598. pro 1ma Specie Aquilæ, adde,

A. 1. Aquila, *Offic. Mer. pin.* fulva ſive Aurea, *R. Ornith.* Chryſaetos, *Aldrov. Geſn. Jonſ. Charlt. ex.* The Golden-Eagle. *Uſu.* Fel, Stercus. *Vires.* Fel deſtillatum cum oleo violaceo ad ceo ad aurium dolorem & tinnitum; ſimum ad abortum commendat *Avicenn.*

Pag. 599. poſt lin. 17. adde,

XXXVI. *De Buteone.*

A. Buteo, *Offic. Jonſ. Charlt. ex.* vulgaris, *R. Ornith.* ſive Triorchis, *Aldrov. Mer. pin.* The Buzzard. *Uſu.* Teſticuli. *Vires.* Ex aqua fontis cum melle decocto ad Venerem commendantur. *Jonſ.*

Pag.

Pag. 601. poſt lin. ult. adde,

XLI. *De Ulula.*

A Ulula, *Offic. Aldrov. Geſn. Jonſ. Geſn. Charlt. ex.* Strix cinerea, *R. Ornith.* The grap-Owl. *Uſu.* Fel, Adeps, Caro. *Vires.* Fel ejus prædicatur ad albugines, ſuffuſiones & caligines. *Adeps* ad clariratem. *Caro* cocta in oleo cui liquato admiſcetur butyrum ovillum, & mel ad ſananda ulcera valet. *Plin.* In Arthritide à quibuſdam æſtimatur.

D. *Salmon* in *Diſpenſatorio* ſuo, *Barnaclam, Corvum leguminalium Erythropedem, Fodeam, Jyngem, Oriolum, Pelicanum, Picum marinum, Pluvialem, Pſittacum, Puffinum, Querquedulam, Rallam, Sneppam, Turdum exoticum, & Urogallum* memorat, quorum cùm vires nullas medicas à quoquam Autore traditas invenio, omiſi, ut & *Arquatum Anatem fiſtularem, Colymbum, Coraciam, Embericam albam, Fingillam, Phœnicopterum & Paſſerem Canarienſem* Seplaſii ejus, cum varietatibus ejuſdem generis, aliiſque multis quæ ad Hiſtoriam Avium potiùs pertinent, quàm ad *Pharmacopœiam* aut *Pharmacologiam*.

SECTIO

SECTIO III.

De Serpentino Genere.

Pag. 603. lin. ult. ſubjunge,

III. *De Cæcilia.*

A Cæcilia, *Offic. Jonſ.* Cæcilia, Typhlops; *Aldrov. Geſn.* Cæcilia Typhlinus Græcis, *R. Synop. A.* Typhlops Cæcilia, *Mer. pin.* The Blind-Worm, or Sloe-Worm. *Vires.* In medicina adhibuit *Oſwaldus.* Theriaca namque ex Cæciliis & Aqua Theriacali paratum pro ſudorifero in Peſtilentia exhibebat *Geſn. Ep.*

IV. *De Serpente Indico.*

SErpens Indicus, *Offic.* Indicus Coronatus, Diademate ſeu conſpicillo inſignitus, *R. Synop. A.* Cobras de Capello Luſitanis dictus, *Garc. ab. Hort.* Vipera Indica vittata geſticularis, *Cat. Muſ. Ind.* Vipera pileata, *quibuſdam.* Indian-Serpent. *Uſu.* Lapis aut potiùs Os capitis, *Pedro del Cobra* dictus, figuræ ovalis, ex uno latere planus, ex altero gibboſus, coloris fuſci & ſplendentis, poris aliquot interſperſis. *Vires.* Omnis generis venena expellit, ſeu intùs ſumpta, ſeu exteriùs applica-

ta:

ta : putrefactioni reſiſtit ; tranſpirationem inſenſibilem promovet, ſpiritus vitales excitat ; Cor recreat, Sanguini fermentationem novam communicat, & Naturæ ſuccurrit in omnibus morbis malignis. *Marl. Ob.*

Quamvis Lapis hic à *Garcia*, *Redi* aliiſque deſcriptus fuerit ; Hujus tamen ſeculi Eruditi de eo differunt, duobus præcipuè in rebus. 1. An ſit res naturalis, an fictitia ? *Kircherus* in *China ſua illuſtrata*, & *Thevenot* in *Relationibus diverſorum inſigniorum itinerum & navigationum* in capite ſerpentis magni Chinenſis inventos fuiſſe affirmant. Clar. D. *Boyl.* in capite Serpentis Africani, è contrà. Alii affirmant Res artificiales eſſe, ut R. P. *Boccone* in *Muſeo di Fiſica*. D. *Mead*, M. D. eos oſſa calcinata, aliaque teſtacea fragmenta eſſe ſupponit. *Thevenotus jun.* cinerum radicum combuſtarum, & Terræ cujuſdam propè *Diu* in *India* inventa.

Altera controverſia eſt de eorum viribus. *P. Kircherus* varia experimenta tradit de earum effectu in extrahendo veneno à morſu viperæ, aliuſve Serpentis inſtillato. Idem confirmat clariſſimus *Boyleus* experimento in Fele juvene facto, *Tractatus de Medicinis ſpecificis*. Item D. *Clayton* in *Narratione de Virginia*, *Act. Philoſoph. n.* 210. ſcribit ſe præſentem fuiſſe cùm prædictus D. *Boyl.* idem experimentum tentavit in variis Pullis, qui omnes ſanati ſunt. D. *Havers*, M. D. ſalutarem ejus effectum in cane vidiſſe ait. Quinetiam D. *Tyſon*, M. D. in *Anatomica Anguis crotalophori* hiſtoriam narrat à celebri quodam *Medico Londinenſi* acceptam, qui quendam à Viperis commorſum ſanavit. Idem præſtitit D. *Baglivius* in quodam à Scorpione percuſſo. Quamvis tamen

apud

apud prædictos omnes, experimenta prædicta optimum ſucceſſum habuerunt, apud alios tamen D. *Redi* ſcil. & D. *Charas* quæ tentarunt non eundem effectum ſortita ſunt.

Cùm jam expediverim, & in epitomen contraxerim eruditorum utrinque opiniones; quid reſtat quàm ut eas conciliare adnitar, quod ut efficiam, tantummodò obſervabo, me duas hujus generis lapidum ſpecies vidiſſe, quorum prior oſſi ſimilis erat, poroſus, cum dentibus limæ in eo viſibilibus. Alter copore compactiore, polito, quam factitiam eſſe credo, & prioris ſimulatricem, undè conjicio experimenta quæ non ſucceſſerunt ab artificialibus hiſce lapidibus facta eſſe, non à veris.

Lapis Colubrinus quondam magni æſtimatus nunc & Manilæ vili divenditur pretio: Non ex Colubro ut vulgus ſibi perſuadet, ſed factitius ex Cornu Cervi in olla oblutata ad nigredinem uſto, efficius, & ut niteat politus. Hunc Mauritani adulteratum vocant, verùm ex neſcio quâ, terræ ſigillatæ ſimili argilla confici referunt. Verus Serpentum morſibus impoſitus medetur: in Febri Petechiali, ſi plures imponantur, auxilio ſunt: *Anno* 1681. Branæ triennem puerulum qui Arſenicum lacte dilutum hauſerat, hujuſcemodi lapidis iteratâ applicatione tantùm, à præſenti liberavi mortis periculo. An virtus hujus lapidis adſcribenda ſali in *C. C.* non probè uſto, remanenti? An poris quibus ſcatet, attrahat ut Cucurbitulæ? *Ex. MSS. Clar. Camelli.*

V. *De*

V. *De Sepe.*

SEps, *Offic. Jonſ. Charlt. ex.* ſive Lacerta Chalcidica Columnæ, *Aldrov. R. Synop. A.* The Serpent Seps. Liburni in litore maris arenoſo invenit D. *Raius. Vires.* In vino pota morſus ſuos ſanat. *Dioſc.*

VI. *De Crocodilo.*

CRocodilus, *Offic. Jonſ. Aldrov. Charlt. ex.* Lacertus omnium maximus. Crocodilus dictus, *R. Synop. A.* The Crocodile, or Allegator. In Nilo, Gange aliiſque fluviis majoribus invenitur. *Uſu.* Sanguis, Pinguedo. *Vires.* Sanguis viſui claritatem conciliat. Pinguedo vulneribus & carcinomati prodeſt. *Jonſ.*

Pag. 605. poſt lin. 7. adde,

IX. *De Chamæleonte.*

CHamæleon, *Offic. Jonſ. Charlt. ex.* Chamæleo *R. Synop. A.* The Chamelion. *Uſu.* Fel, Cor, Animal ipſe. *Vires.* Fel Hypochymata tollit, *Marcell.* Cor contra quartanum commendat *Plin.* Contra epilepſiam & podagram laudat *Trallianus.*

Pag.

Pag. ead. poſt lin. 15. adde,

XI. *De Salamandra aquatica.*

A Lacertus aquatilis, *Offic. Schrod.* aquaticus niger, *Mer. Pin.* Salamandra aquatica, *R. Synop. A. Fonſ. Charlt. ex.* Cordulus, *Bellon.* Scincus aquæ, *quibuſdam.* The Water Eft. In piſcinis & aquis ſtagnantibus. *Vires.* Pulvis ad facilem evulſionem dentium commendatur. *Schrod.*

SECTIO IV.

De Quadrupedibus.

Quadrupeda Biſculca.

VIII. *Caprinum genus.*

Pag. 620. poſt lin. 11. adde,

1. IBEX, *Offic. Aldrov. Jonſ. Charlt. ex.* The Stone Back. Summarum alpium incola eſt. *Uſu.* Sanguis, Fimus. *Vires.* Sanguinem in vino ſumptum ad calculum commendat *Geſn.* Fimus in Iſchiadicis & Arthriticis laudat *Marcel.* Coagulum eaſdem cum leporino vires habet. *Seraph.*

Pag. 621. poſt lin. 3. adde,

2. ANtilopus, *Offic.* Gazella Africana, *R. Synop. A.* Strepſiceros, *Plin.* Capra ſtrepſiceros, *Aldrov. Jonſ. Charlt. ex.* The Antelope. Africæ incola eſt. *Uſu.* Ungula, Cornua. *Vires.* Antepileptica & Antihyſterica æſtimatur.

IX.

IX. *De Cervino genere.*

Pag. 623. poſt lin. 5. adde,

2. RAngifer, *Offic. Jonſ. Charlt. ex.* Cervus Rangifer, *R. Synop. A.* Machils, *Plin.* Tarandus, *Agricol. Eliot.* The Rain Deer. In Lapponia invenitur. *Uſu.* Cornu, Ungula. *Vires.* In ſpaſmaticis proſunt. *Jonſ.*

Pag. 624. poſt lin. 7. adde,

A. 6. Dama, *Offic.* vulgaris, *Mer. Pin.* vulgò, *R. Synop. A.* vulgarie ſive Recentiorum, *Geſn.* Cervus Platyceros, vel Platyceros ſimpliciter dictus, *Plin.* The Fallow Deer. In vivariis. *Uſu.* Cornua. *Vires.* Cum cornubus Cervi viribus convenit.

Lapides Bezoartici Mexicani eximantur ex Cervis, prouti & *Campetzani*, ubi Contrayerba abbundat: *Peruviani* ex Vicunnis, Quanaco & Alce ubi pariter Contrayerva invenitur: *Perſici* ſeu *Indici Golgondani* ex Cercopithecis, & Capris. *Ex Capris*, leves ſunt, ſine nitore friabiles, coloris in viridem tendentis, ſaporis amari, formæ ovalis, magnitudinis variæ, conſtantes ex lamellis, minus læves, aut politi. His mihi impoſuerunt *Anno* 1697. eos pro Cercopithecorum divendentes. Emeram *No.* 144. pendentes omnes ſimul ſexaginta & unam unciam, Unciam 14 Regalibus argenteis Hiſpanis, erant autem omnes integri, & ex his 12 Ovo Gallinaceo aut pares, aut majores: 30 columbino Ovo majores:

40 ovo columbino pares : 50 ovo columbino minores : 12 Nuce Avellanâ majores. *Ex Cercopithecis*, nitidè perpoliti ſunt, magis compacti, lapidei, & ponderoſi quàm ſint Caprearum, conſtantes ex laminulis, ſubamari coloris, cinereè, vel viridiuſculè, vel fuſcè virentis, ex his dein emeram uncias 23. Unciam duobus Imperialibus, erant autem *No.* 33. Magnitudinis ovi Gallinacei 4 : Ovo columbino majores 6 : Ovo columbino pares 4 : Oliva ſuppares 5 : Oliva minores 11. Teretes pollicem craſſi, biunciam, & ſeſquiunciam longi 3 : Horum Unc.i. Macai venditur Imp. Goæ tribus Imper. & dimidio. Meliapori 7 & 8 Imper. quorum 6 vel 7 unam pendent unciam : Fragmentorum verò unica duobus Imp. De reliquo, pro magnitudine creſcit æſtimatio, & pretium.

Mexicani, & *Luponici* coloris ſunt dilutè terrei, & ſaporis nullius, vix alicujus in medicina effectus boni : hos Officinæ Occidentales vocant. *Peruviani*, coloris ſunt ex viridi nigricantis, & hos Orientales vocant.

Indi & *Mauritani* Lapides Bezoarticos generari narrant ex repletione, & pabuli indigeſtione : Et ſanè fact bile eſt, ut ex indigeſtione multùm tenacis ac viſcoſæ procreetur mucilaginis, & ſuperveniente ſanguinis efferveſcentia, prædicta mucago violenter decocta, non ſolùm magis ac magis glutinoſa evadat, incraſſetur, ac inſpiſſetur, ſed & accedente aliquo ſale petrificante, & inſolubilibus, ac indigeſtibilibus (ut ſunt Fructuum officula, lapilli, lignorum fragmenta, argillacea terra, fibrorſarum herbarum, radicum, corticum tormentum) implicata, impacta, ac ſuperinducta, in lapides uſq; indureſcendo abeat. Nec improbabile, tunc malè affecta animalia ex inſtinctu naturali, plantas depaſcere

paſcere amaras, & unà cum his Contrayervam, & ſimilia alexipharmaca, ità ut ex horum ſucco, tenaci illæ viſcoſitati commixto, lapidi Bezoartico color ſubviridis, ſapor amaricans, & virtus Alexipharmaca. Hinc Lapides ii qui in animalibus tabe conſumptis, aut ut ferunt repletione extinctis reperiuntur, plerunque majores, aut ſi parvi, numeroſi ſunt, necnon cæteris efficaciores cenſentur. Ita in Provincia *Sonora Mexici*, in Cervo emortuo *Lucas Valentinus* Lapidem invenit libras quinque pendentem; qui 500 Imp. æſtimatus fuit.

In Jucatan, Hiſpanus in Cervo tabe conſumpto invenit Sexaginta Lapides, fermè omnes æquales, magnitudinis Nucis Avellanæ. In Lapidibus confractis, Golgondanis, ex Capris, & Cercopithecis inveni: ex tomentoſis filamentis compactum globulum, odoris ſuavis. Subruffum fibroſo-tomentoſum glomum, ſaporis aciduli. Pulveri impactas radicum fibrillas. Oblonga Lignorum, corticum, & fructuum, aut foliorum pediculorum fruſtella. Lapides nigros ruffos, cinereos, duros, & friabiles. Terræ argillaceæ rubentis, & nativæ fragmina. Semen, ni fallor, Viticis. Semen trifore magnitudine Ciceris nucleo putrente, acidô. Nucleum oſſe Tamarindorum potiorem. Os fermè unciale, nucleo Dactylorum ſimile, unifore, oleo ſcatens, in aliis pulveres varios.

Veleſius ab Arziniega, Bezohar vocat legitimos in animalium ventriculis (Hiſp. Tripon, Quaxo, & Buche) inventos.

Quadrupeda quadrifulca.

Pag. 626. poſt lin. 15. adde,

XII. *De Hippopotamo.*

HIppopotamus, *Offic. Aldrov. Jonſ. Charlt. ex.* The Sea Horſe. *Uſu.* Teſtes, Dentes. *Vires.* Teſtes exſiccati ac triti contra ſerpentium morſus bibuntur, *Dioſc.* Dentes in annulos tornati, plurimum valere creduntur adverſus ſpaſmum flatulentum, *Charlt.*

Quadrupeda Unguiculata pedibus bifidis.

XV. *De Camelo.*

CAmelus, *Offic. Aldrov. Jonſ. Charlt. ex.* The Camel, or Dromedary. In Aſia & Africa invenitur. *Uſu.* Sanguis, Fel, Fimus, Urina. *Vires.* Sanguis Dyſenteriam juvat, conceptionem auxiliatur, Epilepſiam curat. Fel Ophthalmica eſt. Fimus in Apoplexia commendatur. Urina ad dentes dealbandos & purgandos vim habere creditur. *Plin.*

Quadru-

Quadrupeda unguiculata pedibus multifidis.

Anthropomorpha.

XVI. *De Simia.*

SImia, *Offic. R. Synop. Aldrov. Geſn. Jonſ. Charlt. ex.* The Ape. *Uſu.* Cor. *Vires.* Aſſum & cum melicrato coctum memoriam acuit. *Pota.*

Pag. 630. poſt lin. 3. adde,

XIX. *De Phoca.*

A Phoca, *Offic. Charlt. ex.* ſeu Vitulus marinus, *R. Synop. A.* Vitulus marinus, *Aldrov. Jonſ.* The Seale, or Sea-Calf. *Uſu.* Caro, Adeps. *Vires.* Carnem in Epilepſia & ſuffocatione Uteri commendat *Avicen.* Adipem ad morbos Mulierum laudat *Hippocrat.*

Quadrupeda vivipara pede multifido herbivora binis prælongis dentibus anterioribus in utraque maxilla.

Pag. 631. lin. ult. ſubjunge,

XXII. *De Hyſtrice.*

HIſtrix, *Offic. Charlt. ex. Aldrov. Geſn. Jonſ. R. Synop. A.* The Porcupine. *Uſu.* Animal ipſum. Lapis *Pedro del Porco* dictus, *Vires.* Animal iiſdem affectibus conducere videtur ut Erinaceus. *Jonſ.*

Hyſtrix, Indis *Balatnamatinic.* Reperitur in Provincia *Caraga* magnitudinis Porcelli octimeſtris. Ex hac eximitur Lapis Porcinus, ſeu Hyſtericus Malacenſis, Hiſp. *Piedra de Puerco* Ægagropilus potiùs, quàm Lapis dicendus; conſtat enim ex tomento, fibrillis, & materia friabili, ſubruffâ amaricante, & deforis quibuſdam in partibus, ceraceis, & ſubnigris quaſi unguibus eo-opertus, Nec laminulatus, aut tunicatus, neque ponderoſus, aut politus, ut Bezoar, ſed levis, & aſperiuſculus, ut Ægagropila.

Pietra di Porco in veſiculâ fellis Hiſtricis inventa æſtimatur ut maximum Alexipharmacum ex Obſ. D. *Tancred. Robinſon*, M. D.

Pag.

Pag. 634. poſt lin. 8. adde,

XXVI. *De Glire.*

GLis, *Offic. Bellon. Geſn. Jonſ. Aldrov. Charlt. ex Jonſ.* Glis Geſneri & aliorum, *R. Synop. A.* The Rell, or Rell-Mouſe. *Uſu.* Caro, Pinguedo, Excrementa, cinis. *Vires.* Carnis eſu Bulimo laborantes liberantur. Pinguedo ad conciliandum ſomnum plantis pedum injungitur. Excrementa in liquore aliquo pota calculos diſcutiunt: eadem cum aceto & rore marino Alopeciam ſanant. Cinis combuſti ad ad claritatem oculorum prodeſt. *Plin.*

Quadrupeda vivipara Unguiculata multifida, carnivora, capite breviore, ſeu,

Genus Felinum.

Pag. 634. lin. ult. ſubjunge,

XXVIII. *De Tigredine.*

TIgris, *Offic. Aldrov. Geſn. Jonſ. Charlt. ex. R. Synop. A.* The Tiger. *Uſu.* Adeps. *Vires.* Cum Adipe canino viribus convenire creditur.

Pag.

Pag. 640. lin. ult. ſubjunge,

Quadrupeda vivipara, pede unguiculato multifido, roſtro producticre, carnivora, minora, ſeu

Genus Muſtelinum, Vermineúmve.

HOC genus ab aliis Quadrupedum rapacium generibus differat, 1. *Parvitate ſua,* 2. *Corporis figura gracili, longa, capite parvo ſublongo, pedibus brevibus,* 3. *Inteſtinorum brevitate & ſimplicitate,* 4. *Dentium numero.* R. Rynop. A. 195.

XXXVIII. *De Muſtela.*

A. 1. Muſtela, *Offic. Charlt. ex. Mer. Pin.* vulgaris, *R. Synop. A. Matth. Aldrov. Geſn.* The Weaſel. *Uſu.* Animal ambuſtum exenteratur, & inveteratum ſale in umbra ſiccatum. Ventriculus. *Vires.* Animal ut ſuprà præparatum: Ea ʒii. cum vino pota, adverſus omnia ſerpentium venena præſentaneo eſt remedio: toxico ſimili modo ſumpta, reſiſtit. Ejus ventriculus Coriandro farctus, inveteratuſque, percuſſis à Serpente & Comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fictili podagricis confert: cinere ex aceto illito. Sanguine perunctæ ſtrumæ juvantur: Comitialibus etiam prodeſt. *Dioſc.*

A. 2. Viverra, *Offic. Geſn. Charlt. ex.* Muſtela ſylveſtris, *ejuſd. Jonſ. Aldrov.* ſylveſtris Viverra dicta, *R. Synop. A.* The Ferret. *Uſu.* Caro, Fel. *Vires.* Utraque in Epilepſia commendatur.

XXXIX. *De Ichneumone.*

ICHneumon, *Offic. Aldrov. Geſn. Jonſ. R. Synop. A. Charlt, ex.* Mus Pharaonis ſeu Ægypti, *Bellon.* Indicus, *Ælian.* The Egyptian-Rat. *Uſu.* Fimus. *Vires.* Cum ſeminibus, Sinapi & Aceto Podagram juvat & Alopeciam curat.

Quadrupeda vivipara roſtro productiore, dentibus pluribus, incerto numero,

Pag. 642. lin. ult. ſubjunge,

XLIII. *De Veſpertilione.*

A Veſpertilio, *Offic. Aldrov. Geſn. Jonſ. Charlt. ex. R. Synop. A.* The Bat, or Flitter-Mouſe. Veſperi apparet Æſtate; Hyeme verò latet in cryptis, rupibus, &c. *Uſu.* Caro, Sanguis. *Vires.* Caro præparata Scirrho & Podagræ adhibetur. Sanguis in Iopecia conducit. *Galen.*

Benè obſervat eruditiſſimus ille vir D. *J. Raius* hoc Animal malè à nonnullis inter Aves accenſeri, ob alas & volatum, cùm nec pennatum ſit, nec roſtratum, nec oviparum.

Hic

Hîc etiam omiſi Beſtias aliquas, à D. *Salmon* memoratas in duobus libris prædictis, *e. g. Bubalum, Martem* & *Putorium*; aliaſque nonnullas quibus nullus quod ſciam, Autor vires aliquas adſcripſit; alias ſuſpectas aut ſaltem controverſas, ut *Gulonem, Hyænam*, & *Satyrum*.

ADDENDA *ex N. MSS.* D. *Tancred. Robinſon*, M.D.

RAdix Pareira Brava dicta in Braſiliâ & Portugalliâ optimum diureticum in Hydropicis affectibus æſtimatur. v. Phil. Tranſact. Item Helvetium Traité des Maladies à p. 94. ad 97.

Herba caſſiana famem ſitimque repellens Aſteris ſpecies eſt.

Radix Rinzago dicta Bengalenſis cephalicum potentiſſimum invenitur.

Kermes Polonicus non ex Ilice, ſed eſt coccus Rad. Polygoni, ab inſectis vulnerati & ovis imprægnati.

Yquetaya Braſilienſis magni uſus in corrigenda Sennâ nil aliud eſt quàm noſtra Scrophularia ſeu Betonica Aquatica.

Semen Heliotropii (Turnſole) Specificum in Febribus aliiſque morbis ab impuritatibus. Emeticum, catharticum, diaphoreticum, diureticum eſt, ptyaliſmumque movet.

Herba Paraguai (ex cujus foliis ſiccatis nova Tea conficitur) mihi videtur eſſe ſpecies Alaterni vel Myrti. *ex N. MSS.* D. *Tancred. Robinſon*, M.D.

FINIS.

INDEX *omnium Simplicium Officinalium quæ tum in* Pharmacologia, *tum in hoc* Supplemento *continentur.*

N.B. Numerus absolutè positus, *Pharmacologiam*; Litera *S* hoc *Supplementum* notat.

A.

Abies fœmina 395
mas 396
Abrotanum fœmina 180
mas 183
Abrus S 193
Absinthium Pontic. S 90
Romanum 182
Santonicum S 91
Seriphium 182
Vulgare *ibid.*
Abutilon S 157
Acacallis S 323
Acacia altera S 326
Germanica 442
Vera 509
Acanthum S 81
Acanthus 384
sylveſtris S 266
Acanus S 81
Acarna *ib.*
Accipiter 600
Acer majus S 317
minus *ib.*
montanum *ib.*
Acetoſa arvenſis lanceolata 141

Rom. rotundifolia *ib.*
Vulgaris 140
Acetoſella 348
Acetum 470
Achates S 35
Achillea S 89
Achiotl 504
Acicula S 352
Acidulæ S 5
Acinos S 131
Acmella S 89
Acone S
Aconitum S 158
Acorus adulterinus 360
Aſiaticus S 255
Verus 374
Acte 468
Acus S 352
Adamas S 38
Adarces S 28
Adianthum Album 127
Aureum 120
Nigrum 129
Vulgare 127
Adrachne S 303
Ægilops Arbor S 278
Herba S 259
Æluropus 652
Ærugo 77
Æs 76
Æs viride 77
Æthiopis S 129
Ærites Cupis 89
Agallochum 518, S 329
Agaricum 115
Ageratum 181
Agnus 617
Agnus Caſtus 429
Scythicus S 51
Agreſta 470
Agrifolium 473
Agrimonia 191
Alabaſtrites lapis 87
Alabaſtrum *ib.*
Alana terra 48
Alaternus S 308
Alauda 587, S 377
Album Canis 637
Album Græcum *ib.*
Alcanna 466
Alcea 251
Alcedo 586
Alces 623
Alchimilla 147
Alcyonium durum S 44
Stuppoſum 45
Vermiculatum 44
Veſicarium S 347
Tubuloſum S 45
Alectorius lapis S 376
Alectorolophus S 167
Alga S 4
Aliſma S 72
Alkekengi 271
Alleluja 348
Alliaria S 172
Allium Hortenſe 354
Sylveſtre S 231
Alnus S 281
Alnus nigra 467

Barbadenſis S 240
Aloe Caballina ib.
Hepatica S 241
Succotrina ib.
Vulgaris 361
Alopecurus S 261
Alſine 337
Althæa 351
Alumen 61, S 20
Plumoſum 85
Rochi 61
Rupeum ib.
Saccharinum ib.
Sciſſile 85
Vulgare 61
Alypum S 287
Alyſſum Dioſc. S 179
Plinii S 114
Amaracus 238
Amaranthus 144
Ambra-griſea 56
liquida 406
nigra 56
Ambroſia S 55
Campeſtris S 181
Amethyſtus 97
Amiantus 85
Ammi verum 211
Vulgare ib.
Ammoniacum 201
Amomum 363
Plinii S. 148
Vulgare 207
Amoris Poma 270
Ampelitis terra 53
Ampelopraſſum S 232
Amurca, fæx Olei 447
Amygdalus amra 437
Dulcis ib.
Amylum 377
Anacardium Occid. 449
Orientale ib.
Anagallis aquatica 306
Terreſt. fœmina 337
mas ib.
Anagyris S 325
Anas 585
Anchuſa 223
Lutea S 108
Androſaces S 224
Androſæmum S 215
Anemone horten. S 143
Sylveſtris ib.
Anethum 198
Angelica 204
Angſana S 321
Anguilla 563
Anguis 603
Animal Bezoartic. Occi-
dentalis 623
Moſchifar 626
Zibethicum 639
Animi Gummi 506
Aniſum 210
Indicum S 156
Anonis 328
Anſer 584
Anthera 417
Antherophyllus 420

Anthora

Anthora 280
Anthos 232
Anthyllis leguminosa S 200
Prior ib.
Antilopus S 386
Antimonium 71
Antirrhinum S 165
Antithora 280
Aparine 218
Aper 625
Apes 533
Aphaca S 195
Apiastrum 243
Apios S 187
Apium 209
Apocynum S 225
Apos S 372
Aqua fluviatilis S 3
Fontana 41
Marina ib.
Mineralis 42, S 5, 6
Nivea S 5
Paluſtris S 3
Pluvialis S 5
Plutealis S 3
Thermalis 42
Aquila S 379
Aquilæ lapis 89
Aquilegia 279
Arabicum gummi 510
Aracus S 195
Araneus 532
Niger S 335
Arbor vitæ S 281
Saponaria S 29
Arbutus S 30
Arctium S 8
Ardea 58
Stellaris S 36
Areca 38
Arena maris 8
Arenoſus lapis S 2
Areſta bovis 32
Argemone S 18
Argetina 25
Argentum 7
Vivum 6
Argilla 4
Aries 61
Ariſarum S 24
Ariſtolochia Clemat. 28
Longa ib
Polyrrhizos 28
Rotunda 28
Armeniaca mala 43
Armenus lapis 8
Armoniac. Gummi 20
Armoracia S 17
Arnica S 6
Arnogloſſum 31
Aronia S 18
Arſenicum album 2
Citrinum ib
Rubrum ib
Arthanita 36
Artemiſia Chinenſis 18
Tenuifolia S 9
Vulgaris 18

Arum 369
Arundo 382
Donax S 262
Farcta atro-rub. S 263
Flava S 264
Indica ib.
Saccharina 382
Scriptoria S 262
Tabaxifera S 263
Asa dulcis 439
Fœtida 202, 458
Asarum 146
Virginianum ib.
Aschia 571
Asclepias 346
Ascyrum S 214
Asellus inſecta 532
Piſcis S 353
Asinus 613
Aſpalathus 515
Aſparagus 272
Petræa S 151
Sylveſtris ib.
Aſperula 219
Aſphaltus 54
Aſphodelus albus 360
Luteus ib.
Aſplenium 125
Aſtacus fluviatilis 558
Marinus S 348
After Atticus 175
Aſteria 100, S 366
Aſtragalus S 204
Sylvaticus S 196
Aſtrantia 205
Aſtroites S 34
Athanaſia 181
Atractylis 168
Atragene S 142
Atriplex 143
Olida S 60
Sylveſtris 59
Attagen S 377
Avellana 392
Avena 381
Aurantia 483
Auriculæ Judæ 114
Leporis S 112
Muris 155
Urſi S 224
Auricularia herba S 126
Auripigmentum 52
Aurum 53, 74
Axungia vitri 148

B.

BAccæ Bermudenſes S 298
Baccharis S 76
Balanus Myrepſica 503
Balauſtia 414
Balſamina 653
Balſamita fœmina 181
Mas 180
Balſamelæon 455
Balſamum Capivi 503
Gileadenſe 455
Judaicum ib.
è Mecha ib.

Peruvianum 504
Syriacum 455
Tolutanum 398
Bamia Moſchata 342
Banana S 276
Bangue 342
Barbarea S 176
Barbus 570
Bardana major 170
minor 135
Baſilicum 239
Batrachites 564
Battata Canadenſis S 86
Hiſpanica S 162
Virginiana S 149
Bdellium 521
Becabunga 306
Behen album 334
Rubrum 289
Belemnites 91
Bellis major 177
minor ib.
Ben nuces 503
Benzoin 439
Berberis 467
Berillus 98
Beta alba 144
Nigra 145
Rubra ib.
Betle 406
Betonica aquatica 290
Pauli 306
Vulgaris 240
Betula 400
Bezoar Occidentalis 623
Orientalis 621
Biſolium S 250
Biſſingua 267
Biſmabra 251
Biſmuthum 69
Biſtorta 142
Bitumen Judaicum 54
Blatta S 342
Byzantina 549
Blattaria S 26
Blitum 143
Boletus Cervi S 46
Bolus Armena 44
Bohemica ib.
Candida S 7
Toccavienſis ib.
Bombax 341
Bombyx 537
Bonduch S 320
Bonus Henricus 144
Borago 222
Borax 62
Bos 615
Botargum 572
Botrys 143
Branca Urſina 384
Braſſica capitata alba 297
rubra 163
Florida ib.
Marina 286
Sabauda S 172
Sativa 297
Sylveſtris S 180
Breſilium lignum 511
Briza S 267

Bromus S 260
Bruſcus 267
Bryonia alba 266
Nigra 267
Bubalus 617
Buccinum 553
Buſo 606
Bufonites lapis 564
Bugloſſum hortenſe 223
Sylveſtre ib.
Bugula 245
Bulbocaſtanum S 106
Bulbonac S 170
Bulbus vomitorius S 235
Bunias 298
Bunium S 99
Buphthalmum 175, S 79
Buplerum S 104
Bupreſtis S 339
Burſa paſtoris 304
Bureo S 379
Buxus 493

C.

CAcalia S 76
Cacao 486
Cactos S 78
Cadmia factit. Botr. 77
Oſtracitis ib.
Placitis ib.
Nativa metallica 69
S 25
Metalli expers 83
Cæcilia S 381
Calaminaris lapis 83
Calamus Aromatic. 374
Odoratus S 264
Calamintha paluſtr. 237
Montana 243
Sylveſtris S 135
Vulgaris 243
Calcarius lapis 88
Calcatrippa 279
Calcitrapa S 82
Calculus è Veſica humana 645
Calendula 175
Caltha ib.
Calx viva 48
Extincta ib.
Cambugium 383
Camelina S 177
Camelus S 390
Campanula S 163
Camphora 431
Camphorata 147, S 61
Cancamum 523
Cancer fluviatilis 559
Marinus 558
Canella alba 432
Canis 637
Carcharias S 363
Cannabis 133
Cantharides 539
Caphura 431
Capillus Veneris 127
Capo 593
Capparis 475

Capra alpina 620
Capro 619
Capreolus 623
Capri-cerva 121
Caprificus S 286
Caprifolium 418
Capſicum 271
Carabe 58
Caranna 467
Carbo foſſilis S 14
Carbunculus 96
Cardamine 301
Cardamom. majus 363
minus ib.
Cardiaca S 136
Carduelis S 374
Carduus albus S 74
Benedictus 168
Fullonum 186
Mariæ 186
Pinea S 79
Stellatus S 82
Tomentoſus S 81
Carlina 163
Carneolus lapis 92
Caroba 511
Carpinus S 285
Carpio 569
Carpobalſamum 455
Carthamus 167
Carum 208
Caryophyllata 252
Caryophyllus Aromatic. 420
Barbatus S 210
Hortenſis 333
Simplex S 209
Sylveſtris ib.
Caſia caryophyllata 421
Fiſtula 505
Lignea 429
Caſſina S 308
Caſſummuniar S 245
Caſtanea 392
Caſtor 632
Caſtoreum ib.
Catachu 386, S 327
Cataputia major 136
minor 309
Cate S 327
Catulus 637
Catus domeſticus 635
Sylveſtris ib.
Caucalis S 111
Cauda Equina maj. 123
minor S 49
Muris S 141
Caviarum 566
Caulis alba 279
Rubra S 172
Cedrus 398
Celaſtrus S 308
Centaurium majus 169
Minus 347
Centinodia 142
Cepa 354
Aſcalonica S 230
Cepea S 154
Cera alba 534
Citrina ib.

Ceraſus Avium S 308
Nigra 447
Rubra 446
Ceraunia S 34
Cercis S 323
Cerinthe S 120
Cerrus S 278
Cernua fluviatilis S 361
Ceruſſa veneta 75
Cervus 622
Volans 538
Ceterach 125
Cetus 577, S 364
Chalcanthum 63
Chalcedonius lapis S 36
Chalcidas 565
Chalcitis 70
Chalybs 72
Chama S 347
Chamæacte 468
Chamæbatos S 313
Chamæciſſus 242
Chamæciſtus S 214
Chamæcyparisſus 180
Chamædaphne 460
Chamædrys 233
Chamæiris S 239
Chamæleon Serp. S 384
Albus 163
Niger 168
Chamæleuce S 158
Chamæmalus 411
Chamæmelum 178
Chamæmorus S 146
Chamæpitys 244
Altera S 137
Tertia *ib.*
Chamæriphis S 274
Chamærubus S 146
Chamæſyce S 186
Chamælæa 460
Chærefolium 202
Cheiri 296
Chelidonium majus 308
Minus 249
Chenopodium S 60
Chermes 394
Chia terra S 10
China 265
China Chinæ 414
Chinenſis terra 45
Chocolata 487
Chondrilla altera S 64
Prima *ib.*
Chryſanthemum S 87
Chryſocolla 62
Chryſocome S 74
Chryſogonum S 266
Chryſolithus lapis 99
Chryſoplaſius *ib.*
Chryſopraſus 98
Cicada 536
Cicer album 323
Nigrum *ib.*
Rubrum *ib.*
Sylveſtre S 206
Cichoreum ſativum 156
Sylveſtre 157
Cicindela 541
Ciconia 582

Cicuta 210
Cimex 531
Cimolia alba 47
Purpurascens ib.
Cinara 167
Cineres clavellati 148
Cinnabaris factitia 68
Nativa 67
Cinnamomum 429
Album 432
Cionia S 345
Cirsium S 80
Ciftus fœmina S 213
Ledon 335
Mas S 213
Citria malus 482
Citrullus 259
Clematis S 142
Clinopodium S 133
Cneoron album S 162
Nigrum S 314
Cnicus 167
Cobaltum 69, S 24
Cocca Gnidia 460
Coccinella 539
Coccus S 268
de Maldiva S 269
Coccus baphica 393
Cochinella 539, S 340
Cochinellifera S 291
Cochlea 547
Cochlea marina 548
Cochlearia hortensis 302
maritima 303
Coculus Indus 463
Coffee 401
Colchicum S 236
Colocynthis 259
Colophonia 397
Colubrina Virginia. 289
Colubrinum lignum 485
Colubrinus lapis S 383
Columba 596
Colutea S 327
Concha 557
Consilago S 155
Consolida major 225
Media 245
Minima 177
Regalis 277
Saracenica 162
Contrayerva 257, S 144
Convolvulus S 161
Conyza major S 70
Media 161
Minor S 70
Copal 461
Coracinus S 359
Corallina 112
Corallium album 111
Nigrum 112
Rubrum 112, S 39
Coriandrum 214
Corinthiacæ Uvæ 471
Cornix 599
Cornus 446
Coris S 15
Corona Solis S 87
Coronopus 312, S 190
Corruda S 151

Cortex Peruvianus 414
S 290
Winteranus 422
Corvus 590
Corylus 392
Cos S 32
Coſtus amara 366
Dulcis *ib.*
Hortorum 180
Nigra S 79
Cotinus S 316
Coticula S 32
Cotonea 411
Cotula fœtida 178
Coturnix 596
Cotyledon 276
Conhage 318
Crabro S 338
Cranium humanum 649
Craſſula 275
Cratæagonon S 163
Crepitus Lupi S 45
Creta alba 48
Selenuſia S 13
Criſta Galli S 166
Crithmum 212
Crocodilion S 94
Crocodilus S 385
Crocus 356
Cruciata 217
Cryſtallus 87
Cubebæ 464
Cuculus 600
Cucumis aſinus 261
Hortenſis 260
Slyveſtris 261
Cucurbita 258
Cuminum 204
Siliquoſum S 268
Cuniculus 631
Cupreſſus 399
Cuprum 76
Curcuma 362
Cuſcuta 313
Cyanus major 169
Minor *ib.*
Cyclamen 362
Cydonia mala 411
Cygnus 584
Cyminum 204
Siliquoſum S 268
Sylveſtre S 100
Cynocrambe S 53
Cynogloſſum 221
Cynorrhodon 216
Cynosbatus *ib.*
Cynoſorchis S 248
Cyperus longus 372
Rotundus *ib.*
Cypreſſus 399
Cytini 413
Cytiſus S 325

D.

DActylus 385
Dama S 388
Datura 286
Daucus Creticus 214
Hortenſis 213
Montanus

Montanus S 102
Noſtras 213
Vulgaris ib.
Delphinum 279
Delphinus S 364
Dens caninus S 237
Leonis 155
Dentalium falſum 656,
S 352
Verum 546
Dentaria 296
Dentellaria ib.
Dictamus albus 278
Creticus 237
Digitalis 290
Dioſpyrus S 287
Diphryges 77
Dipſacus ſativus 186
Sylveſtris ib.
Doronicum germanicum
Romanum 262
Dorycnium S 162
Draba S 178
Draco arbor 463
Draco marinus S 358
Dracontium 368
Major S 246
Dracunculus S 27
Drakena 257
Dryopteris S 51
Dulcamara 270

E

EBenus Æthiopicus
S 27
Indicus 435
Verus S 306
Ebulus 46
Ebur 62
Echinopus S 9
Echinus marinus S 34
Terreſtris 64
Echium 22
Elaterium 51
Elatine 28
Elæagnus S 31
Elemi gummi 44
Eleoſelinum 20
Elephas 62
Elleborus albus 13
Niger 27
Empetrum S 30
Encraſicholus 56
Endivia 15
Entalium 54
Enula campana 16
Ephemerum S 23
Epimedium S 26
Epithymum 31
Equiſetum 12
Minus S
Equus 61
Marinus 62
Eretria terra S
Erica 49

Erigerum 164
Erinaceus 641
Eruca Herba 299
Sylveſtris S 176
Eruca Inſectum 538 S 339
Ervum 322
Eryngium campeſt. S 89
Trifolium ib.
Vulgare 186
Eryſimum 300
Eſculus 278
Eſcula major 308
minor 309
Euonymus 473
Eupatorium Avicen. 164
Cannabinum ib.
Græcorum 191
Meſuæ 181
Euphorbium 310
Euphragia 291
Euphraſia ib.

F.

FAba Ægyptia S 228
Bengalen. S 296
Hortenſis 320
Sti. Ignatii S 314
Suilla 282
Fabaria 275
Fagara S 307
Fagus S 277
Farfara 159
Farrago S 347
Faſel 386
Febrifuga 179
Fegopyrum S 58
Felis 635
Ferrum 72
Ferula S 103
Feſtuca galbanifera 100 S 102
Ficaria 289
Ficedula S 373
Ficus 404
Ægyptia S 286
Cypria S 287
Indica S 286
Sylveſtris ib.
Filipendula 254
Filix fœmina 128
Florida ib.
Mas 126
Flammula S 139
Jovis S 142
Flos Adonis S 140
Æris S 27
Amoris 149
Auriculæ 501
Solis S 86
Fœniculum com. 212
Dulce 213
Maritimum 212
Porcinum 199
Vulgare 212
Fœnugræcum 327
Folium Indum 430
Malabathrum ib.
Formica 535

Major S 338
Fragaria 252
Frangula 467
Fraxinella 278, S 156
Fraxinus 495
Fucus S 42
Fulcia S 369
Fumaria 190
Bulbosa 655
Fungus esculentus S 45
Cervinus S 46
Pulverulentus S 45
Sambucinus 114

G.

Agates 54
Galanga maj. 367
Minor 368
Galbanum 200
Galega 322
Galeopsis S 131
Galerita 587
Galgulus S 378
Gallæ S 278
Gallina 593
Aquatica S 369
Gallinago S 357
Gallium 218
Gallinula S 369
Gallus 593
Gambogia 483
Gannanaperide 414
Garum 565
Genista 509
Hispania S 32
Spinosa S 22
Gentiana 28
Gentinella autumnali S 16
Verna S 16
Geodes lapis S 3
Geranium batrachoide S 22
Columbinum 34
Moschatum 34
Robertianum 34
Sanguineum S 22
Tuberosum S ib
Gerardi Herba S 9
Gindidium S 10
Ginsseng 34
Gith 34
Gladiolus S 23
Luteus 36
Glandes Quercinæ 39
Glans Unguentaria 50
Glastum 30
Glaucium S 18
Glaux Dioscor. S 20
Vulgaris S ib
Glis S 39
Glossopetra S 36
Glottis S 36
Glyzyrrhiza 32
Gnaphalion 16
Gnidia grana 46
Gobius S 35
Gossypium 34
Graculus S 37

Gramen arundinaceum S 263
Caninum 380
Dactylon S 262
Leucanthem. S 215
Mannæ S 261
Parnaſſi S 218
Grana Paradiſi 365
Kermes 393
Tiglia 137
Granadilla ib.
Granata 413
Granatus lapis 97
Gratia Dei 332
Gratiola 290
Groſſularia 417
Grus 581
Gryllus 536
Guajacum 494
Gummi Ammoniac. 201
Animi 506
Arabicum 510
Caranna 476
Ceraſorum 447
Copal 481
Elemi 448
Guajaci 494
Hederæ 419
Juniperi 401
Lacca 445
Senica 510
Tragacantha 325
Gutta Gamba 483
Gypſum 87, S 31

H.

Hæmatitis lapis 66
Halcyon 586
Halcyonium 651
Halec 565
Halicacabum 271
Haliæetus 598
Halimus S 59
Handal 259
Harmel 311
Haſta Regia 360
Hedera arborea 419
Terreſtris 242
Helenium 161
Helianthemum S 314
Heliochryſon S 92
Heliotropium S 119
Tricoccum 136
Lapis 93
Helleboraſtrum S 155
Helleborine S 251
Helleborus albus 138
Niger 277
Helxine 145
Ciſſampelos S 161
Hemerocallis S 229
Hemionitis S 49
Hepatica nobilis 249
Vulgaris 128
Heptaphyllum 253
Herba Doria S 73
Gerardi S 105
Paralyſeos 346

Paris 269
Petri S 223
Hermodactylus 356
Herniaria 150
Hesperis S 171
Hibernicus lapis 23
Hieracium 154
Majus S 65
Hippocampus S 352
Hippoglossum 267
Hippolapathum 139
Hippolithus 613
Hippophaes S 187
Hippopotamus S 390
Hipposelinum 205
Hipparis 123
Hircus 619
Hirudo 529
Hirundo 587
Indica S 373
Maritima ib.
Hirundinaria 346
Hispidula 652
Hœdus 619
Holoschœnos S 264
Holostium S 130
Homo 645
Hordeum 378
Gallicum & Perlatum 379
Horminum Hortense 239
Sativum S 129
Sylvestre ib.
Hyacinthus 355
Lapis 97
Hydrargyrum 67
Hydrolapathum 140
Hydropiper 141
Hyoscyamus albus 282
Luteus S 159
Niger 282
Hypecoon S 267
Hypericum 336
Hypociſtis 370, S 213
Hyppogloſſum 267
Hyſſopus 232
Hyſtrix S 392

I.

Jacea S 83
Jacobæa S 75
Jalapium 285
Jaſminum 465
Jaſpis lapis 93
Japonica terra 386
Iberis 303
Ibex S 386
Ibiſcus 251
Ichneumon S 395
Ichthyocolla 566
Ilex 393
Illecebra 275
Imperatoria 209
Indico 323
Indicum
Indigo
Inguinalis 17
Intybus 45
Ipecacuannha S 14

Iris Florentina 359
Illyrica *ib.*
Lutea 360
Noſtras 359
Iſatis 305
Iſpida 586
Iva arthritica 244
Judaicus lapis 90
Juglans arbor 391
Jujuba 444
Julis S 362
Julus S 337
Juncus odoratus 374
Vulgaris 373
Juniperus major S 282
Vulgaris 401

K.

Kali 148, S 62
Keiri 296
Kermes 394

L.

Labdanum 335
Labrum Veneris 186
Laburnum S 225
Lac Lunæ S 11
Lacca Gummi 445
Lacertus aquatica S 385
Terreſtris 604
Lacryma Jobi S 259
Lactuca agnina S 99
Hortenſis 153
Sylveſtris S 58
Ladanum 335
Lagopus 326
Lamium album 242
Luteum S 125
Rubrum 242
Lampetra S 351
Lampſana S 64
Lapathum acutum 140
Rubrum S 57
Sanguineum *ib.*
Lapis Adamas S 38
Ætites 89
Alabaſtrites 87
Alectorius S 376
Amethyſtus 97
Amianthus 85
Arenoſus S 28
Armenus 84
Aſius S 26
Belemnites 91
Bezoar Occident. 623
Orient. 621
Bufonites 564
Calcarius 88
Calaminaris 83
Carneolus 92
Chelidonius 587
Chryſolithus 99
Coracinus S 359
Fulminaris S 34
Galactites S 11
Geodes S 34
Granatus 97

Hæmatitis 93
Heliotropium 83
Hibernicus 83
Hyacinthus 97
Judaicus 90
Lazuli 84
Lyncis 91
Manatea 629
Memphites S 36
Melitites S 12
Molaris S 32
Morochthus ib.
Nephriticus 93
Opites 88
Phrygius S 25
Porcinus S 392
Rubinus 96
Sapphirus 98
Sardus 92
Schistus S 24
Serpentinus 88, S 381
Smaragdus 98
Selenitis 86
Scularis ib.
Spongiæ 82
Stellaris S 34
Thracius S 14
Thyites S 12
Topasius 99
Umbranus S 358
Lappa 170
Larix 399
Larus S 370
Laserpitium S 104
Lathyris 309
Lathyrus S 194
Lavendula 231
Laureola 460
Daphnoides ib.
Lauro cerasus S 300
Laurus 450
Alexandrina 267
Tinus S 294
Lazuli lapis 84
Lemnia terra alba S 8
Sigillata 45
Vulgaris ib.
Lens 319
Palustris 117
Lenticula marina S 43
Lentiscus 457
Leo 634
Leontopetalon S 266
Leontopodium S 77
Leopardus
Lepidium 304
Lepus marinus S 343
Terrestris 630
Leucas montana S 134
Leuciscus S 354
Leucoium album S 169
Luteum 296
Levisticum 206
Libanotis S 104
altera S 103
Lichen arboreus 116
Marinus S 43
Terrestris S 47
Vulgaris 121
Lignum Aloes 311

Aſpalthi 515, 518
Colubrinum 485
Flavum 405
Guajacum 494
Juniperinum 401
Lentiſcinum 475
Moluccenſe 137
Nephriticum 512
Rhodium 515
Rubrum 512
Sanctum 494
Sapan 512
Ligufticum 206
Liguſtrum 466
Lilium album 253
Convallium 268
Limax ater S 336
Ruber S 335
Terreſtris 547
Limonia malus 483
Limonium 180
Linaria avis S 374
Herba 287
Lingua avis S 343
Cervina 123
Linum 344
Catharticum S 222
Liquidambar 406
Liquiritia 321
Lithanthrax S 14
Lithargyrus Argenti 75
Auri ib.
Lithocolla S 32
Lithoſpermon 224
Lixivium 148
Locuſta Inſecta 537
Lolium 381
Lonchitis S 50
Lotus arbor S 292
Urbana 327
Lucius 307
Ludus Paracelſi S 31
Lujula 348
Lumbricus terreſtris 530
Luna 74
Lunaria 122
Lupinus 320
Sylveſtris S 196
Lupulus ſalictarius 133
Lupus Beſtia 637
Piſcis 564
Luſcinia S 373
Lutra 640
Lychnis coron. S 210
Sylveſtris 210
Lycium S 311
Indicum S 327
Lycoperdon S 46
Lycopodium S 48
Lycopſis S 117
Lycopus S 127
Lyncis lapis 91
Lynx 635
Lyſimachia 336

M.

MAcaleb. S 300
Macer S 318
Macis 438

Macropiper 405
Magiſtrantia 205
Magnes 65
Majorana 238
Oleracea S 128
Malabathrum 430
Malactites S 37
Malicorium 413
Malva arborea 250
Verbenacea 251
Vulgaris 250
Mala Aurantia 483
Citra 482
Cydonea 411
Granata 413
Inſana S 149
Limonia 483
Malus hortenſis 410
Sylveſtris 411
Manata lapis 629
Manatea lapis ib.
Manati ib.
Mandragora 269
Manga S 301
Manna 495
Thuris 521
Marcaſita 69
Marga S 11
Candida ib.
Saxatilis cinerea 10
Incarnata 11
Margarita Orient. 556
Occident. ib
Scotica ib.
Marmor S 33
Marrubium album 241
Nigrum 244
Mars 73
Marum 233
Syriacum S 128
Maſtiche 457
Mater Perlarum 555
Matricaria 179
Matriſylva 418
Mecaxochitl 406
Mechoacanna alba 284
Nigra 285
Medica S 208
Medium S 163
Medulla ſaxorum S 11
Mel 534
Melanteria S 26
Melanthium S 222
Melanurus S 359
Meleagris S 377
Melia terra 49
Melilotus 327
Verus S 207
Meliſſa 213
Melitea terra 49
Melo 260
Melopepo 258
Memphites lapis S 36
Mena piſcis S 360
Mentha aquatica 236
Cataria 240
Criſpa S 127
Scortenſis 135
Saxifraga S 125
Mercurialis S 53
Vulgaris

Vulgaris 144
Mercurius crudus 67
Mergus S 370
Merops S 371
Merula Avis S 378
Piſcis 360
Meſpilus 412
Meum Athamantic. 203
Mezereon 460
Milium 381
Solis 224
Millefolium 176
Millepes 532
Milvus Avis 599
Piſcis S 357
Minium 76
Miſy 79
Molaris lapis S 32
Mollugo S 113
Moluccenſe lignum 137
Moly Dioſcoridis S 231
Theophraſti ib.
Molybdæna 75
Momordica S 145
Monedula S 375
Monoceros 574
Monophyllon S 147
Morus 404
Morſus Diaboli 185
Gallinæ 337
Ranæ S 227
Moſchata Nux 437
Moſchus 626
Motacilla 588
Moxa 184
Mugil 572
Mullus S 357
Mulus 614
Mumia 648
Mus Alpinus 633
Araneus 642
Domeſticus maj. 633
minor ib.
Indicus S 395
Muſa Arbor S 276
Muſca domeſtica 533
Hiſpanica 539
Muſcerda 633
Muſcipula S 211
Muſcus arboreus 116
Clavatus S 48
Cranii 120
Marinus S 43
Pulmonarius 116
Pyxidatus S 47
Terreſtris ib.
Muſtela Beſtia S 394
Piſcis 563
Muſtelus 573
Myagrum S 178
Myoſotis 155
Myoſurus S 141
Myriophyllon S 109
Myrobalanus Bellirica 444
Chebula 443
Citrina ib.
Emblica 443
Indica ib.
Nigra ib.

Myrrha 479
Myrrhis 203
Myrtilus S 293
Myrtus 419
Mytulus 557
Myxa 424
Myxaria *ib.*

N.

NApus dulcis 298
Sylveſtris S 174
Napellus S 158
Naphtha 54
Napha 483
Narciſſus S 233
Nardus Celtica 188
Indica 372
Montana S 99
Naſturtium aquaticum 301
Hibernicum S 176
Hortenſe 303
Indicum S 115
Sylveſtre 303
Nenuphar 350
Nepa S 224
Nepeta montana 243.
Vulgaris 340
Nephritic. lignum 512
Nerium S 322
Nicotiana 283
Nigella 343
Nigellaſtrum S 211
Nihil album 77
Gryſeum 78
Ninzin 340
Nitrum 50, S 18
Noctua 601
Nuces è Barbados 601
Nucula terreſtris S 106
Nummularia 349
Nux avellana 392
Ben 503
Indica S 270
Malabarica S 272
Moluccenſis S 321
Moſchata 437
Piſtachia 490
Virginiana S 295
Vomica 484
Nymphæa alba 350
Lutea 351

O.

OChra 45
Ocymum caryophyllatum 239
Citratum *ib.*
Oculi Cancrorum 558
Oculus Chriſti S 130
Ocymoides S 210
Oenophia S 297
Oeſipus 618
Olea 447
Oleaſter S 298
Germanicus S 306
Oleum terræ 55
Olybanum 520

Olyra S 267
Onager 614
Onagra S 183
Oniſcus Inſecta 532
Piſcis S 353
Onobrychis S 197
Ononis 328
Onoſma S 118
Onyx 92
Opalus 99
Ophiogloſſum 122
Ophioſcorodon S 231
Ophites 88
Opium 307
Opobalſamum 455
Opopanax 197
Opuntia S 291
Orchis S 249
Oreoſelinum 653
Origanum Cretic. 238
Heraclitorum S 128
Vulgare 238
Ornithogalon S 234
Ornithopodium S 202
Ornus S 287
Orobanche S 249
Orobus 322
Oryza 379
Oſmunda Regalis 128
Oſteocolla 82
Oſtracites S 345
Oſtreum 555
Oſtruthium 205
Oſtrys S 285
Oſyris S 293
Othonna S 88
Ovis 617
Oxalis 140
Oxyacantha 467
Oxycedrus S 282
Oxycoccos S 152
Oxylapathum 140
Oxyſchœnos S 254

P.

PAdus S 299
Pæonia albicans S 154
Fœmina 277
Mas 276
Paliurus S 319
Palma Chriſti 136
Dactylifera 386
Oleoſa S 269
Palumbus 597
Pampinus 469
Panax Aſclepium S 103
Herculeum 197
Chironium S 214
Coloni S 130
Panicum 380
Panis porcinus 362
Panthera 635
Papaver album 306
Corniculatum S 182
Erraticum 308
Nigrum 307
Rhœas 308
Rubrum ib.

Papyrus S 353
Paradisi Grana 365
Paralysis 346
Paradus 625
Parietaria 145
Paris Herba 269
Paronychia S 216
Rutacea S 217
Parthenium 179
Parus 588
Passer domesticus 589
Troglodytes 588
Pastinaca aquatica S 107
Hortensis 196
Piscis S 363
Sylvestris 196
Pavo 594
Pectunculus S 346
Pedicularis S 167
Pediculus 530
Pedro del Cobra S 381
Del Puerco S 392
Pentaphyllum 253
Peplis S 186
Peplus *ib.*
Pepo 258
Perca 571
Percipier S 61
Perdix 595
Perfoliata 215
Perforata 336
Periclymenum 418
Prygua S 309
Peria 556
Persea S 300
Persica malus 435
Persicaria maculata 141
Non-maculata *ib.*
Siliquosa S 267
Personata 170
Peruvianus cortex 414,
S 290
Pes anserinus S 60
Cati 652
Columbinus 342
Leporinus 326
Petasites 160
Petroleum 55
Petroselinum Macedonicum 214
Montanum S 101
Vulgare 209
Petum 283
Peucedanum 199
Phagus S 278
Phalangium S 240
Phalaris S 258
Phaseolus 318, S 192
Phellendrium S 108
Phellodrys S 279
Phoca S 391
Phœnix S 260
Phrygius lapis S 25
Phu major. 188.
minor *ib.*
Phylitis 123
Phyllyn S 54
Phyllyrea S 304
Phyteuma S 219
Pica 591

Picea 396
Pierre de Colique S 359
Piloſella 155
Pimenta 421
Pimpinella 190
Saxifraga 208
Pinguicula S 165
Pinus 397
maritima S 280
ſylveſtris 397
Piper album 493
Æthiopicum
Jamaicenſe 421
Indicum 271
Longum 405
Nigrum 492
Piperitis 304
Piſum 318
Piſſaſphaltus 648
Piſsleon Indicum 55
Piſtachia 490
Piſtolochia S 166
Virginiana 289
Pityuſa S 186
Pix Burgundica 396,
S 280
Græca 396
Plantago anguſtifol. 312
Aquatica 254
Latifolia 312
Terreſtris *ib.*
Vulgaris *ib.*
Platanus S 318
Plumbago herba S 100
Minera *ib.*
Plumbum crudum 75
Nigrum 650, S 13
Pneumonanthe S 160
Pnigites terra S 8
Poco Sempie S 51
Polemonium S 227
Polium alterum S 124
Creticum 234
Montanum *ib.*
Polygala Dioſcor. S 201
Vulgaris S 168
Polygonatum 268
Polygonum fœmina S 49
mas 142
Polypodium 124
Polytrichum 125
Poma amoris 270
Citria 482
Hortenſis 410
Sylveſtris 411
Pompholyx 77
Populus alba S 283
Nigra 402
Tremula S 283
Porcus 624
Porphyrites S 33
Porrum 355
Portulaca 338
maritima S 59
ſylveſtris S 216
Potamogeiton S 59
Potentilla 253
Poterium S 203
Praſſium 241

Praſſius Lapis S 37
Præcocia 435
Primula veris 345
Proſcarabeus 542
Propolis 534
Prunus Brignolenſis 441
Damaſcena *ib.*
Gallica *ib.*
Prunella 241
Prunellus 442
Prunus 441
Pſeudoacorus 360
Pſeudobunium S 174
Pſeudocaſſia S 328
Pſeudocytiſus S 326
Pſeudodictamnus S 132
Pſeudoſelinum S 111
Pſeudonarciſſus 233
Pſyllium 313
Ptarmica 176
Pulegium cervinum 236
Regale *ib.*
Pulicaria 161
Pulmo marinus S 161
Pulmonaria aurea S 66
Gallica *ib.*
Maculoſa 221
Vulgaris *ib.*
Pulſatilla S 143
Pumex lapis 82
Punica mala 413
Purpura 553
Pyracantha S 289
Pyrus 411
Pyrethrum 177
Verum S 110
Pyrites lapis
Pyrola 370

Q.

QUercus arbor 393
Marina S 42
Quinquefolium 253
Quinquenervia 312
Quinquina 414

R.

RAdicula 299
R adix dulcis S 204
Raia S 362
Raiola *ib.*
Rana viridis 606
Vulgaris *ib.*
Rangifer S 387
Ranunculus 250
Acris S 139
Flammeus *ib.*
Montanus *ib.*
Paluſtris S 138
Vulgaris 250
Rapa 297
Sylveſtris S 173
Raphanus aquaticus S 177
Hortenſis 269
Ruſticanus 301
Sylveſtris 653

Rapiſtrum 175
Rapum 297
Regina Prati 255
Regulus 588
Remora S 351
Reſeda S 219
Reſina Abietina 395
Laricea 399
Pinea 397
Terebinthina 456
Vulgaris 397
Rha 138
Rhabarbarum Monachorum 139
Verum 344, S 223
Rhamnus albus S 306
Niger S ib.
Solutivus 474
Rhapontic. verum 138
S 57
Vulgare 170
Rhinoceros 626
Rhodia radix 654 S 153
Rhodium lignum 515
Rhoïs obſoniorum 461
Rhus ib.
Ribes niger 418
Ruber ib.
Ribeſia ib.
Ricinus herba 136
Americanus ib.
Inſecta 531
Riſigallum 52
Ritro S 96
Robur S 278
Roſella 350
Ros 42
Solis 350
Roſa alba 417
Canina 416
Damaſcena ib.
Rubra 417
Roſmarinus 232
Rubia ſylveſtris S 113
Synanchica S 114
Tinctorum 217
Rubicella S 374
Rubicola S 373
Rubinus lapis 96
Rubrica terra 46
Rubus Idæus 477
Vulgaris ib.
Rumex 140
Ruſcus 267
Ruta 311
Capraria 322
Montana S 189.
Muraria 127
Sylveſtris 318
Rutilus S 354

S

SAbina baccif. S 283
Vulgaris 400
Saccharum album 383
Candum album ib.
Rubrum ib.
Cryſtallinum ib.
Rubrum ib.

Saga-

Sagapenum 201
Sagitta S 141
Sagittaria S 244
Sagou S 272
Sal Ammoniacum 646
Alkali 149
Commune album 58
nigrum 41
Foſſile S 18
Gemmæ 58
Lancaſtrenſe S 4
marinum 41
Novo-caſtrenſe S 4
Portocenſe ib.
Super Salem S 17
Petræ 59
Salamandra 605
Salix alba 402
Helice S 284
Nigra ib.
Rubens S 283
Salvia hortenſis major 230
minor ib.
Sylveſtris 245
Virtutis 239
Vitæ 127
Sambucus arbor 468
humilis ib.
montana S 310
Samia terra 47
Sampſuchum 238
Sanamunda S 305
Sanctum lignum 494
Sandaracha Arabum 401
Græcorum 52
Sandiver 148
Sandyx 75
Sanguis Draconis 463, S 264, 274, 321
Sanguiſorba 190
Sanguiſuga 529
Sanicula 215
Santalum album 478
Citrinum ib.
Rubrum 512
Santonicum ſemen 183
Virıde S 91
Sapan lignum 512
Sapo albus 149
Communis ib.
Caſtilienſis ib.
Hiſpanicus ib.
Niger ib.
Venetus ib.
Saponaria 334
Sapphirus lapis 92
Sarocolla 513
Sardius lapis 92
Sardus lapis ib.
Sardonyx S 35
Sarſaparilla 264
Saſſafras 426
Satureia 233
Spicata S 121
Satyrium fœmina 369
mas ib.
Saxifraga alba 339
Antiquorum S 211
Vera S 123

Vulgaris 211
Scabiola 185
Scammonium 284
Scandix S 105
Scarabæus 538, 539
Scariola 157
Schiſtus lapis S 24
Schœnanthus 374
Schœnopraſſum S 230
Scincus 604
Scilla 355
Sclaræa 239
Scolopendra S 337
Scolopendrium 125
Scolymus 167
Sylveſtris S 78
Theophraſti S 69
Scomber S 355
Scombrus *ib.*
Scordium 246
Scorodonia 245
Scorodopraſum S 332
Scorpio marinus S 361
Terreſtris 530
Scorpioides S 202
Scorpius S 324
Scorzonera 156
Scrophularia 289
minor 249
Sebeſten 424
Secacul S 106
Secale 378
Securidaca S 199
Sedum majus 275
minus 339
Selenites 86
Selinum S 107
montanum S 111
Sempervivum 275
Senecio 164
Senella 413
Senica gummi 510
Senna 502
Sepia 545
Seps S 384
Septinervia 312
Serapias S 249
Sericum crudum 537
Seriola 157
Seris 156
Serpentaria Virgin. 289
Serpens 603
Indicus S 381
marinus S 351
Serpent. lapis 88, S 381
Serpyllum 234
Verum S 123
Serratula S 84
Seſamoides S 68
Seſamum 384
Seſeli Æthiopic. S 112
Creticum 197
Maſſilienſe 198
Pratenſe 211
Peloponnenſe S 108
Vulgare 206
Sideritis S 134
Sigillum Solomonis 268

Siler montanum 206
Silesiaca terra 45
Silix S 31
Siligo 378
Siliqua dulcis 511
Silurus S 351
Simia S 391
Sinapi 298
Siser 207
Sisymbrium 236
Sisyrhinchium S 235
Sium S 107
Smaris S 360
Smaragdus lapis 98
Smerillus 66
Smilax arbor S 279
Aspera S 147.
Lævis S 161
Smyris 66
Smyrnium 205
Soda 148, S 62
Soia S 193
Solanum hortense 270
Lethale S 150
Lignosum 270
Somniferum S 151
Soldanella 286
Solidago 162
Sonchus asper 154
lævis ib.
Sophia Chirurgor. 300
Sorbus 412
Torminalis S 289
Sorex 633
Sorghum S 258
Sory 76
Sparganium S 264
Spartium S 323
Spatula fœtida 360
Specularis lapis 86
Spelta 378
Sperma Ceti 575
Spica Nardi 372
Vulgaris 231
Spina alba Arbor 413
Herba S 94
Arabica S 95
Cervina 474
Solutiva ib.
Spinachia 135
Spirea S 316
Spodium Græcorum 78
Officinarum 628
Sphondylium 196
Spongia 114
Spongitis lapis 82
Spuma maris 651
Squamaria S 250
Squatina S 363
Squilla herba 355
Piscis S 348
Stachys S 132
Stacte 479
Stannum 73
Staphisagria 278
Staphylodendron S 315
Stellaris lapis S 34
Stœbe S 83
Stœcha Arabica 231
Citrina 163

Stramonium 286
Stratoites S 265
Strigenſis terra S 9
Struthio 591
Struthium S 220
Sturio 566
Sturnus S 378
Styrax calamita 426
Liquida ib.
Suber 394
Succinum album 55
Citrinum ib.
Nigrum 54
Succiſa 185
Sulphur nativum 51
Caballinum 52
Commune ib.
Factitium 51
Vivum ib.
Sumach 461
Superba S 209
Sus 624
Sycomorus S 286
Symphytum 225
Minimum 177
Petræum S 191
Synanchica S 114

T.

TAbacum 283
Tacamahaca 436
Tagetes S 88
Talchum 85
Taipa 642
Tamarindus 507
Tamariſcus 497
Tanacetum 181
Tapſus barbatus 348
Tarachon S 93
Taragon ib.
Taraxacum 155
Tarſi S 252
Tartarum album 470
Rubrum ib.
Taurus 615
Taxus arbor S 283
Beſtia 640
Telephium 275
Tellina S 347
Terebinth. Argent. 395
Chienſis 456
Communis 397
Cypria 456
Veneta 399
Terebinthus 456
Teredo 539
Terra Ampelites 53
Argillacea 44
Chia S 9
Eretria S 8
Fabrilis 47
Goltburgenſis S 7
Japonica 386
Lemnia 45
Livonica S 9
Melitea 49
Pnigitis S 8
Rubrica 47
Samia ib.

Selenusia terra S 13
Sigillata 45
Silesiaca ib.
Strigensis S 8
Tripolitana 48
Turcica S 9
Testudo marina 605
Terrestris ib.
Teucrium S 117
Thalictrum S 93
Thapsia 199
Thea 472, S 310
Therma 42
Thermolithus S 30
Thora S 139
Thlaspi 304
Vulgaris S 179
Thunnus S 355
Thus masculum 520
Vulgaris 397
Thuris Cortex 517
Manna 521
Thuya S 281
Thymbra S 121
Vera ib.
Thymallus 571
Thymelæa 460
Thymus 234
Citrinus S 123
Sylvestris S 122
Verus 123
Vulgaris 234
Tigris S 393
Tilia 492
Tinca 569
Tincar 62
Tithymalus characias S 184
Cyparissias S 185
Dendroides ib.
Helioscopius 309
Myrtites S 185
Paralius ib
Plataphyllos ib.
Tormentilla 253
Torpedo S 363
Tota bona 144
Tragacantha 325
Tragium S 156
Alterum S 120
Tragopogon S 66
Tragorchis S 248
Tragoriganum S 124
Alterum ib.
Tragos S 313
Trachelium S 163
Tribulus aquaticus 384
Terrestris S 268
Trichomanes 125
Trifolium acetosum 348
Aquaticum 349
Aureum 249
Bituminosum S 206
Hemorrhoidale S 208
Odoratum 327
Purpureum S 207
Paludosum S 359
Vulgare 326

Triorchis S 248
Tripolis terra 48
Tripolitana terra ib.
Tripolium S 66
Triſſago 235
Triticum Indicum 380
Vaccinium S 167
Vulgare 377
Truta 571
Tubera S 46
Tulipa S 244
Tunica 333
Turbith 285
Turchois lapis S 37
Turdus S 378
marinus S 360
Turpethum 285
Turritis S 173
Turtur 597
Tuſſilago 159
Tutia 77
Typha S 264

O.

VAcca 615
Vaccaria S 211
Vaccinia S 152
Valeriana Græca S 227
major 188
minor ib.
ſylveſtris S 98
Vanellus S 368
Vaynillus 508
Veratrum album 138
Nigrum 277
Verbaſcum album S 226
Nigrum S 225
Vulgare 348
Verbena fœmina 300
mas 237
Vermis terreſtris 530
Vermicularis 275
Veronica fœmina 287
mas 306
Vervex 617
Veſicaria marina S 345
Veſpa S 338
Veſpertilio S 395
Vetonica 333
Viburnum S 305
Vicia 319
Sylveſtris S 195
Victoralis 655
Vinca pervinca 347
Vincetoxicum 346
Vinum 469
Viola 340
Lunaria S 170
Lutea 296
Mariana S 164
Martii 340
Tricolor 341
Vipera 603
Viperaria 156
Virga aurea 162
Paſtoris S 93
Viſcus 458
Aucupum ib.
Vitex 429

Vitis alba S 292
Idæa ib.
Vinifera 469
Vitriolum album 63
Hungaricum ib.
Romanum 62
Viride 63
Vitulus 615
Viverra S 395
Ulmaria 255
Ulmus 497
Montana S 318
Ulula S 380
Umbilicus marinus 549
Alter S 217
Veneris 276
Umbra S 358
Unguis odoratus 557
Unicornu 574
Unicornu fossile S 30
Uniones 556
Vomica Nux 484
Upupa 591
Uranoscopus S 358
Ursus 636
Urtica marina S 344
Mortua 242
Romana 134
Vulgaris ib.
Usnea 120
Uva crispa 417
Gruina S 152
Marina S 313
Passa major 471
Minor ib.
Quercina 393
Vulpanser S 371
Vulpes 638
Vultur 599

W.

Winteranus Cortex falsus 432
verus 422

X.

Xanthium 135
Xochinacaztly 507
Xyloaloes 518
Xylobalsamum 55
Xyris 360

Y.

Yucca S 244

Z.

Zanthoxylon 405
Zea 378
Zedoaria longa 365
Rotunda 366
Zeopyrum S 267
Zibethum 639
Zinziber 365
Zizypha S 302
Zurumbet 366

Index Anglo-Latinus, *in quo Nomina Anglica-Latinis præponuntur, ordine Alphabetico ; in gratiam Tyronum.*

A.

A Bele-Tree, Populus *alba.*
the Adder, Vipera.
Adders-Tongue, Ophioglossum.
Agarick, Agaricus.
Agate, Achates.
Agrimony, Agrimonia.
Alabaster, Alabastrum.
the Alder-Tree, Alnus.
the Black-Alder, Frangula.
Ale-Hoof, Hedera.
Alexanders, Hipposelinum.
Alkanat, Anchusa.
All-Good, Bonus Henricus.
All-Heal, Panax.
Allum, Alumen.
the Almond-Tree, Amygdalus.
Aloes, Aloe.
Wood of Aloes. Agallochum.
the Alp, Rubicilla.

Amber,

Amber, Succinum.
Amber-griſe, Ambra-griſea.
the Amethyſt, Amethyſtus.
the Anchovy, Encraſicholus.
Anemony, Anemone.
Angelica, Angelica.
Anniſe, Aniſum.
the Ant, Formica.
the Antelope, Antilopus.
Antimony, Antimonium.
the Ape, Simia.
Apple, Malus.
Apples of Love, Pomum Amoris.
Mad-Apple, Malum *inſanum*.
Thorn-Apple, Stramonium.
Apricock, Malus *Armeniaca*.
Archangel, Lamium.
Arec, Areca.
Armenian-Stone, Lapis *Armenus*.
Arrach, Atriplex.
Arrow-Head, Sagitta.
Arrow-Root, Sagittaria.
Arſmart, Perſicaria *acris*.
Arſnick, Arſenicum.
Artichoke, Cinara.
Aſarabacca, Aſarum.
the Aſh-Tree, Fraxinus.
the Aſian-Stone, Lapis Aſius.
Aſparagus, Aſparagus.
Aſpen-Tree, Populus *tremula*.

Aſphodil, Aſphodelus.
the Aſs, Aſinus.
the wild-Aſs, Onager.
Avens, Caryophyllata.
Azure-Stone, Lapis Lazuli.

B.

THE Badger, Taxus.
the Bald-Coot, Fulica.
Sea-Balls, Veſicaria marina.
Balſam, Balſamum.
Balſam-Apple, Balſamina.
Barbados Seeds, Ricinus.
Barbados Tar, Piſſelæon Indicum.
the Barbel, Barbus.
Barberry-Buſh, Berberis.
Barley, Hordeum.
Barren-wort, Epimedium.
Baſil, Ocymum.
Cow-Baſil, Vaccaria.
Wild-Baſil, Acinos.
Great Wild-Baſil, Clinopodium.
the Bat, Veſpertilio.
Balm, Meliſſa.
Balm-cricket, Cicada.
Bay-Tree, Laurus.
White Beam-Tree, Aria.
a Bean, Faba.
Bean Trefoil-Tree, Laburnum.
Kidney-Bean, Phaſeolus.

the Bear, Urſus.
Bears-breech, Acanthus.
Bears-ear, Auricula Urſi.
Bears-foot, Helleborus.
the Bee, Apis.
the Bee-eater, Merops.
Beech-tree, Fagus.
Beet, Beta.
Beetle, Scarabæus.
Slow-leg'd-beetle, Blatta.
Dyl-beetle, Proſcarabæus.
Benjamin, Benzoin.
the Bergander, Vulpanſer.
the Beryll, Beryllus.
Betle, Betle.
Betony, Betonica.
Water-betony, Betonica *aquatica*.
Bezoar-Deer, Capri-Cerva.
Bezoar-Stone, Lapis Bezoar.
Bindweed, Smilax *lævis*.
Rough-bindweed, Smilax *aſpera*.
Birch-Tree, Betula.
Birds-foot, Ornithopodium.
Birth-wort, Ariſtolochia.
Biſhops-weed, Ammeos.
Biſtort, Biſtorta.
Bittern, Ardea *ſtellaris*.
Bitterſweet, Amara-dulcis.
Black-cap, Ficedula.
Black-Lead, Plumbum *nigrum*.

Black-

Black-tail, Melanurus.
Black berry-bush, Rubus vulgaris.
Black-bird, Merula.
Black-thorn, Prunus *sylvestris*.
Bladder-Nut-tree, Staphylodendron.
Blite, Blitum.
Blood-Stone, Lapis Hæmatitis.
Blood-wort, Lapathum *sanguineum*.
Sea-blubber, Urtica *marina*.
Blue-bottle, Cyanus.
the boar, Aper.
Bole-Armoniack, Bolus *Armena*.
Bonano-tree, Banana.
Bone-binder, Osteocolla.
Bone-set, Consolida *major*.
Borace, Borax.
Borage, Borago.
the bor-tree, Buxus.
Brake, Filix *fœmina*.
Bramble-bush, Rubus *vulgaris*.
Stone-bramble, Chamærubus.
Brank, Fegopyron.
Brasil-wood, *Brasilia* Arbor.
Bread-Indian, Yucca.
Briar-bush, Cynosbatos.
Brimstone, Sulphur.
Brooklime, Becabunga.
Broom, Genista.
Broom-Rape, Orobanche.
Butchers-broom, Ruscus.

Spaniſh-broom,
White-bryony, Bryonia *alba*.
Black-bryony, Bryonia *nigra*.
Buck, Dama.
Buck-brans, Trifolium *paluſtre*.
Buck-thorn, Spina *Cervina*.
Buck-wheat, Fegopyron.
the Buffal, Bubalus.
the Bug, Cimex.
Bugule, Bugula.
Bugloſs, Bugloſſum.
Stone-bugloſs, Onoſma.
Vipers-bugloſs, Echium.
Bull, Taurus.
Bull-Finch, Rubicilla.
the Burbott, Muſtela.
Burdock, Bardana *major*.
the Burn-Tow, Bupreſtis.
Burnet, Pimpinella.
Bur-Reed, Sparganium.
Burrough-Duck, Vulpanſer.
Butter-Bur, Petaſites.
Butter-Wort, Pinguicula.

C.

Cabbage, Braſſica capitata.
the Cacao, Cacao.
the Cackerel, Mæna.
White Cackerel, Smaris.
Calaminoze, Lapis Calaminaris.

Cala-

Calamint, Calamintha.
the Calf, Vitulus.
the Sea-Calf, Phoca.
Water Caltrops, Tribulus *aquaticus.*
Calves-Snout, Antirrhinum.
the Camel, Camelus.
Camels-Hay, Schœnanthus.
Cammock, Anonis.
Camphire, Camphora.
Campions, Lychnis.
Capers, Capparis.
Caraway, Carum.
Cardamums, Cardamomum.
Carline-Thistle, Carlina.
the Carob-Tree, Caroba.
the Carp, Carpia.
Carrot, Daucus.
Deadly-Carrot, Thapsia.
Cassany,
Cassia, Cassia Fistula.
the Cassa Tree, Anacardium Occidentale.
the Cat, Catus.
Civet-Cat, Animal Zibethicum.
Cats-Tail, Typha.
Catchfly, Muscipula.
the Caterpillar, Eruca insecta.
Ceder-Tree, Cedrus.
Celandine, Chelidonium *majus.*
Centaury, Centaurium *minus.*
Great-Centaury, Centaurium *majus.*

Ceruſe, Ceruſa.
Chalcedony, Chalcedonius.
Chalk, Creta.
Chamois, Capra *Alpina*.
Charlock, Rapiſtrum.
the Chaſt-tree, Agnus *Caſtus*.
Cheeſe-Kennet, Gallium.
Cherry-tree, Ceraſus.
Winter-Cherry, Alkekengi.
Cherry-Bay, Lauro-Ceraſus.
Birds-Cherry,
Chervil, Chærifolium.
Cheſtnut, Caſtanea.
Chickweed, Alſine.
China-Root, Radix China.
Chiches, Cicer.
Chriſthorn, Paliurus.
the Chryſolite, Chryſolithus.
Sweet-Cicely, Myrrhus.
Cinnamon, Cinnamomum.
Cinquefoil, Pentaphyllum.
Citron, Mala Citria.
Citruls, Citrullus.
Cives, Schœnopraſſum.
Civet, Zibethum.
Clary, Horminum.
Ethiopian Clary, Æthiopis.
Clay, Argilla.
Clearer, Aparine.
Clearing-Stone, Lapis Schiſtus.

Cloud-berry, Chamæmorus.
Cloves, Caryophyllus *Aromaticus.*
Clove-July-Flower, Caryophyllus.
Coal, Lithanthrax.
Cobalt, Cobaltum.
Cochineal, Cochinilla.
Cock, Gallus.
Cockle, Pſeudomelanthium.
Cockle, Pectunculus.
Baſtard-Cockle, Chama.
Cocks-comb, Alectorolophus.
Cocks-head, Onobrychis.
Coco, Coccus.
Cod-Fiſh, Aſellus.
Coddy-Moddy, Larus.
Coffee, Coffee.
Cole-wort, Braſſica.
Colly-Flower, Braſſica florida.
Colts-Foot, Tuſſilago.
Strange-Colts foot, Cacalia.
Columbines, Aquilegia.
Comfrey, Conſolida major.
Saracens-Comfrey, Conſolida Saracenica.
Cony, Cuniculus.
Cook-Fiſh, Merula.
Coot, Fulica.
Copperas, Vitriolum.
Coral, Corallium.
Coraline, Coralina.
Coriander, Coriandrum.

Corn-Flag, Gladiolus.
Corn-Sallet, Lactuca.
the Cornel-tree, Cornus mas.
Cornelian, Sardus.
Costmary, Balsamita mas.
Cotton-tree, Gossipium.
Couhage, Phaseolus Zurratensis.
Cow, Vacca.
Sea-Cow, Manati.
Cowslips, Paralysis.
Cow-wheat, Triticum *Vaccinium.*
the Crab, Cancer.
the Crane, Grus.
Cranes-bill, Geranicum.
the Cramp-Fish, Torpedo.
Cray-Fish, Astacus *fluviatilis.*
Cresse, Nasturtium *hortense.*
Indian-Cresse, Nasturtium *Indicum.*
Meadow-Cresse, Cardamine.
Sciatica-Cresse, Iberis.
Swine-Cresse, Ambrosia *campestris.*
Water-Cresse, Nasturtium *aquaticum.*
Winter-Cresse, Barbarea.
the Cricket, Gryllus.
Crisal, Crystallus.
Cross-wort, Cruciata.
the Crow Cornix.
the Crow-fish, Coracinus.
Crow-foot, Ranunculus.
Cubebs, Cubebæ.

the Cuckow, Cuculus.
Cuckow-pint, Arum.
Cucumber, Cucumis.
Cudweed, Gnaphalium.
Cumfry, Symphitum.
Cumin, Cuminum.
the Currant-bush, Ribes.
Currants, Uvæ Corinthiacæ.
the Cuttle-fish, Sepia.
Cyperus, Cyperus.
Cypress, Cypressus.

D.

THE Dace, Leuciscus.
Daffodil, Narcissus.
Daisie, Bellis.
Dandelion, Dens leonis.
Dane-wort, Ebulus.
the Dare, Leuciscus.
Darnel, Lolium.
Dart-wort, Sagittaria.
Date, Palma.
the Deer, Dama.
Dentaglia, Entalium.
Devils-bit, Succisa.
Dew, Ros.
the Diamond, Adamas.
Diers-weed, Luteola.
Dill, Anethum.
Dittander, Piperites.
Dittany, Dictamnus.

Baſtard-Dittany, Fraxinella.
Dock, Lapathum.
Dodder, Cuſcuta.
Dog, Canis.
Dogs-bane, Apocynum.
Dog-like-tooth-ſhell, Dentalium.
Dog-ſtones, Cynoſorchis.
the Dolphin, Delphinus.
the Dove, Columbus.
Dragons, Dracontium.
the Dragon-tree, Draco Arbor.
Dragons-blood, Sanguis Draconis.
the Drake, Anas.
Drank, Bromus.
the Dromedary, Camelus.
Drop-wort, Filipendula.
the Dire-Drum, Aſterias.
the Duck, Anas.
Ducks-meat, Lens *paluſtris*.
the Dundiver, Mergus.
Dutroy, Datura.

E

THE Eagle, Aquila.
Eagle-ſtone, Ætites.
Earth, Terra.
Earth-flax, Amiantus.
Earth-nut, Bulbocaſtanum.
Earth-worm, Lumbricus *terreſtris*.
Ebony, Ebenus.
Eel, Anguilla.

Eel-pont, Muſtela.
the Eft, Lacertus.
the Elder-tree, Sambucus.
Elecampane, Enula *campana*.
the Elephant, Elephas.
the Elk, Alces.
Elm, Ulmus.
Emerald, Smaragdus.
Emery, Smyris.
Endive, Endivia.
Entaglia, Entalium.
the Erd-ſhrew, Mus *araneus*.
Eretrian-*Earth*, Terra Eretria.
Eringo, Eryngium.
Eſchalot, Cepa Aſcalonica.
Euphorbium, Euphorbium.
Eyebright, Euphraſia.

F.

THE Fallow-*Deer*, Dama.
Fel-wort, Gentiana.
Fennel, Fœniculum.
Fennel-*Flower*, Nigella.
Fennel-*Giant*, Ferula.
Hogs-Fennel, Peucedanum.
Fenugreek, Fœnum Græcum.
Fern, Filix.
the Ferret, Viverra.
Feverfew, Metricaria.
the Fierce-*Flaw*, Paſtinaca *marina*.
the Fig-*Tree*, Ficus.

Fig-*Wort*, Scrophularia.
the Filbert *Tree*, Nux *Avellana*.
the Bull-*Finch*, Rubicilla.
the Gold-*Finch*, Carduelis.
Fir-*Tree*, Abies.
the Fire-*Flaw*, Paſtinaca *marina*.
the Fiſtick-*Nut-Tree*, Piſtacia.
the *Sweet*-Flag, Acorus.
Corn-Flag, Gladiolus.
Flax, Linum.
Toad-Flax, Linaria.
Flea-*Bane*, Conyza.
Flea-*Wort*, Pſyllium.
the Flint, Silex.
Flitter-*Mouſe*, Veſpertilio.
Flix-*Weed*, Sophia Chirurgorum.
Flower-*de-Luce*, Iris.
Flower-*Gentle*, Amarantus.
Female-Fluellin, Elatine.
Male Fluellin, Veronica.
the Fly, Muſca.
Spaniſh-Fly, Cantharides.
Flying-*Fiſh*, Milvus.
the Fox, Vulpes.
Fox-*Glove*, Digitalis.
Fox-*Tail*, Alopecurus.
Frankincenſe, Thus, Olibanum.
Herb-Frankincenſe, Libanotis.
Friars-*Cowl*, Ariſarum.
the Frog, Rana.

Fumitory, Fumaria.
Furze, Scorpius.
Fustick-*Wood*, Lignum *flavum*.

G.

Gally *Worm*, Julus.
Garlick, Allium.
Vipers Garlick, Ophioscorodon.
Gaule, Elæagnus.
Gentian, Gentiana.
Herb-Gerard, Herba Gerardi.
Germander, Chamædrys.
Tree-Germander, Teucrium.
Water-Germander, Scordium.
Gladwyn, Xyris.
Glass-*Wort*, Kali.
the Glead, Milvus.
the Glow-*Worm*, Cicindela.
the Goat, Caper.
Goats-*Beard*, Tragopogon.
Goats-*Rue*, Galega.
Gold, Aurum.
Gold *of Pleasure*, Myagrum.
Golden-*Moss*, Poco Sempie.
Golden-*Rod*, Virga *Aurea*.
the Goose, Anser.
the Goosander, Mergus.
the Goosberry-*Bush*, Grossularia.
Goose-*Foot*, Pes *Anserinus*.
the Gor-*Cock*, Attagen.
Gourd, Cucurbita.
Oily-Purging Grain, Sesamum.

the Granate, Granatus.
Grass, Gramen.
the Grass-*Hopper*, Locusta.
the Grayling, Aschia.
the Green-*Stone*, Prasius.
Gromil, Lithospermon.
Ground-*Pine*, Chamæpitys.
Groundsel, Senecio.
the Grunter, Umbra.
Guajcum, Guajacum.
the *Sea*-Gudgeon, Gobius.
Gum, Gummi.
Gum-*Succory*, Chondrilla.

H.

HARE, Lepus.
the *Sea*-Hare, Lepus *marinus*.
Hare-*Bells*, Hyacinthus,
Hares-*Ear*, Bupleurum.
Hares-*Foot*, Lagopus.
the Hart, Cervus.
Harts-*Tongue*, Lingua *Cervina*.
Hart-*Wort*, Seseli.
the Hawk, Accipiter.
Hawk-*weed*, Hieracium.
the Haw-*Thorn*, Spina *alba*.
the Hazel, Avellana.
Heath, Erica.
the Hedge-*Hog*, Erinaceus.
the *Sea*-Hedge-*Hog*, Echinus.
Hedge-*Mustard*, Erysimum.

Helleboze, Helleborus.
the Heliotrope, Heliotropium.
Hemlock, Cicuta.
Water-Hemlock, Phellendrium.
Hemp, Cannabis.
the Hen, Gallina.
Henbane, Hyoſcyamus.
Herb-*Terrible*, Alypum.
the Heron, Ardea.
the Herring, Halec.
the Hog, Porcus.
Hollyhock, Malva *Arborea*.
Holly, Agrifolium.
Holly-*Roſe*, Ciſtus.
Hollow-*Root*, Fumaria *bulboſa*.
Honey, Mel.
Honey-*Stone*, Lapis Melitites.
Honey-*Suckle*, Caprifolium.
Honey-*Wort*, Cerinthe.
the Hoopo, Upupa.
Hop, Lupulus.
Hoze-*Hound*, Marrubium.
Baſe-Hoze-*Hound*, Stachys.
the Hozn-*Beam*, Oſtrys.
the Hoznet, Crabro.
the Hoze, Equus.
Sea-Hoze, Hippopotamus.
Sea Hoze, Hippocampus.
Hoze-*Tail*, Equiſetum.
Hoze-*Tongue*, Hippogloſſum.

the Hound-*Fish*, Mustelus *spinax*.
Hounds-*Tongue*, Cynoglossum.
House-*Leek*, Sedum.
Hyssop, Hyssopus.

I.

THE Jacinth, Hyacinthus.
Jack by the Hedge, Alliaria.
Jack-*Daw*, Monedula.
Jalap, Jalapium.
the Jasper, Iaspis.
Jerusalem-*Artichoke*, Battata *Canadensis*.
Jerusalem-*Sage*, Pulmonaria *maculosa*.
Jessamin, Jasminum.
the Jesuits-*Tree*, Arbor *Peruviana*.
Jews-*Ear*, Auricula Judæ.
Jews-*Pitch*, Asphaltos.
Jews *Stone*, Lapis *Judaicus*.
Indigo, Indigo.
Jobs-*Tears*, Lacryma Jobi.
St. Johns *Wort*, Hypericum.
Irish-*Slat*, Lapis *Hybernicus*.
Iron, Ferrum.
Iron-*Wort*, Sideritis.
Isinglass, Ichthyocolla.
Judas-*Tree*, Cercis.
Jujube, Jujuba.
July-*Flower*, Caryophyllus.
Juniper, Juniperus.
Ivie, Hedera *Arborea*.
Ground-Ivie, Hedera *terrestris*.

K.

KEeling, Aſellus.
Kidney-*Beans*, Phaſeolus.
the Kings-*Fiſher*, Iſpida.
the Kings-*Stone*, Squatina.
the Kite, Milvus.
Knop-*Weed*, Jacea.
Knot-*Graſs*, Polygonum.

L.

LAdies-*Bower*, Clematis.
Ladies-*Mantle*, Alchimilla.
Lambs-*Lettuce*, Lactuca *agnina*.
the Lamprey, Lampra.
the Lapwing, Vanellus.
the Larch-*Tree*, Larix.
the Lark, Galerita.
Larks-*Spur*, Delphinum.
Laſerwort, Laſerpitium.
Lavender, Lavendula.
Lavender-*Cotton*, Chamæcypariſſus.
Sea-Lavender, Limonium.
the Laurel-*Tree*, Lauro-ceraſus.
Lead, Plumbum.
Black-Lead, Plumbum *nigrum*.
Lead-*Wort*, Plumbago.
the Leech, Hirudo.
Leek, Porrum.
Vine Leek, Ampelopraſſum.
Wild-Leek, Scorodopraſſum.

the Lemon-*Tree*, Malus *Limonia*.
Lentils, Lens.
the Leopard, Pardus.
Leopards-*Bane*, Doronicum.
Lettuce, Lactuca.
the Lilly, Lilium.
the Lime-*Tree*, Tilia.
the Limpin, Tellina.
the Linnet, Linaria.
the Lion, Leo.
Liquorice, Glycyrrhiza.
Litharge, Lithargyrus.
Liver-*Wort*, Lichen.
the Lizard, Lacertus.
the Load-*Stone*, Magnes.
the Lobster, Astacus.
the Locust-*Tree*, Gummi Animi arbor.
Loose-*Strife*, Lysimachia.
Lovage, Levisticum.
the Louse, Pediculus.
Louse-*Wort*, Pedicularis.
Sea-Lungs, Pulmo *marinus*.
Lung-*Wort*, Pulmonaria.
Lupins, Lupinus.

M.

Macarel, or Mackrel, Scomber.
Spanish-Mackrel, Thunnus.
Mace, Macis.
Madder, Rubia-tinctorum.
Madwort, Alyssum.

the Magpy, Pica.
Maiden-*Hair*, Adianthum.
Maize, Frumentum *Indicum*.
Mallows, Malva.
Marſh-Mallows, Althæa.
Vervane-Mallows, Alcea.
Mandrake, Mandragora.
the Mango-*Tree*, Mangas.
the Many-feet, Scolopendra.
Maple-*Tree*, Acer.
Marble, Marmor.
Marygold, Calendula.
Marjoram, Marjorana.
the Marking-*Stone*, Lapis Morochthus.
Marle, Marga.
the *Black*-Martin, Apus.
Maſter-*Wort*, Imperatoria.
Maſtick, Maſtiche.
Maudlin, Ageratum.
Herb-Maſtick, Marum.
the Maſtick, Lentiſcus.
May-*Weed*, Cotula *fœtida*.
Meadow-*Saffron*, Colchicum.
Meadow-*Sweet*, Ulmaria.
Medick-*Fodder*, Medica.
the Medlar-*Tree*, Meſpilus.
Meliot, Melilotus.
Melon, Pepo.
Musk-Melon, Melo.

the

the Memphis-*Stone*, Lapis Memphitis.
Mercury, Mercurialis.
Childrens-Mercury, Phyllon.
Dogs-Mercury, Cynocrambe.
Milfoil, Millefolium.
Milk-*Stone*, Lapis Galactites.
Milk-*Wort*, Polygala.
Millet, Milium.
the Mill-*Stone*, Lapis *molaris*.
Mint, Mentha.
Horſe-Mint, Mentaſtrum.
the Mire-*Drum*, Aſterias.
Miſletoe, Viſcus.
the Mole, Talpa.
Moly, Moly.
Money-*Wort*, Nummularia.
the Monk-*Fiſh*, Squatinus.
Monks-*Hood*, Napellus.
Moon-*Wort*.
the Mood-*Cock*, Attagen.
the Mood-*Hen*, Gallina *aquatica*.
Moſs, Muſcus.
Mother-*of-Time*, Serpyllum.
Mother-*Wort*, Cardiaca.
Moth-*Mullein*, Blattaria.
the Mouſe, Mus.
Mouſe-*Ear*, Piloſella.
the *Field*-Mouſe, Mus *Araneus*.
the *Mountain*-Mouſe, Mus *Alpinus*.
the *Rere*-Mouſe, Glis.
Mouſe-*Tail*, Myoſuros.

Mug-*Wort*, Artemiſia.
the Mulberry-*Tree*, Morus.
the Mule, Mulus.
Mules-*Fern*, Hemionitis.
Mullein, Verbaſcum.
the Mullet, Mugil.
the *Leſſer*-Mullet, Mullus.
the Muſcle, Mytulus.
Muſcovy-*Glaſs*, Lapis *ſpecularis*.
Muſhroom, Fungus.
Musk, Moſchus.
the Musk-*Animal*, Animal *Moſchiferum*.
Muſtard, Sinapis.
Arabian-Muſtard, Draba.
Hedge-Muſtard, Eryſimum.
Tower-Muſtard, Turritis.
Myrobalans, Myrobalanus.
Myrrh, Myrrha.
the Myrtle-*Tree*, Myrtus.

N.

Navel-*Wort*, Umbilicus Veneris.
Navew, Napus.
the Nephritick-*Stone*, Lapis *Nephriticus*.
Nephretick-*Wood*, Lignum *Nephriticum*.
Nettle, Urtica.
Dead-Nettle, Lamium.
the Nettle-*Tree*, Lotus arbor.
the Nightingale Luſcinia.
Night-*Shade*, Solanum.
Tree-Night-*Shade*, Amomum.

Nipple-*Wort*, Lampſana.
the Nope, Rubicilla.
a Nut, Nux.
Nutmeg, Nux *Moſchata*.

O.

THE Oak-*Tree*, Quercus.
the *Scarlet*-Oak, Ilex *coccigera*.
Oats, Avena.
Oker, Ochra,
the Old-*Wife*, Turdus.
the Olive-*Tree*, Oliva.
the *Wild* Olive, Oleaſter.
One-Blade, Monophyllon.
the Onyx-*Stone*, Onyx.
the Opal, Opalus.
the *Baſtard*-Opal, Aſteria Gemma.
the Ophite, Ophites.
the Orange-*Tree*, Aurantia Malus.
Orchis, Orchis.
Orpiment, Auri pigmentum.
Orpine, Telephium.
the Oſprey, Haliætus.
the Oſtrich, Struthio.
the Otter, Lutra.
the Ounce, Lynx.
the Owl, Noctua.
Ox-Eye, *Daiſie*, Bellis major.
the Oyl-*Beetle*, Proſcarabeus.
the Oyſter, Oſtrea.
Ox-Eye, Buphthalmum.

P.

Palma *Chriſti*, Ricinus.
the Palm-*Tree*, Palma.
Panick, Panicum.
Paper-*Reed*, Papyrus.
Herb-Paris, Herba Paris.
Parmaceti, Sperma Ceti.
Parſley, Petroſelinum.
Baſtard-Parſley, Caucalis.
Hedge-Parſley, Pſeudoſelinum.
Stone-Parſley, Selinum *montanum*.
Wild-Parſley, Bunium.
Parſley *Piert*, Percepier.
Parſnip, Paſtinaca *hortenſis*.
Cow-Parſnip, Paſtinaca *ſylveſtris*.
Paſque-*Flower*, Pulſatilla.
the Partridge, Perdix.
the Peach-*Tree*, Perſica malus.
the Peacock, Pavo.
the Pear *Tree*, Pyrus.
Prickly-Pear-*Tree*, Opuntia.
Pearch, Perca.
Pearl, Margarita.
Peaſe, Piſum.
Pelony, Pæonia.
Pellitory *of Spain*, Pyrethrum.
Pellitory *of the Wall*, Parietaria.
Pennyroyal, Pulegium.
Pepper Piper.
Guinea-Pepper, Capſicum.
Jamaica-Pepper, Pimenta.

Periwinkle, Vinca Pervinca.
St. Peters-*Wort*, Aſcyrum.
Phrygian-*Stone*, Lapis *Phrygius*.
the Planet, Pica.
Spaniſh Pick-tooth, Gingidium.
the Pike, Lucius.
Pimpernel, Anagallis.
the Pine-*Tree*, Pinus.
the Pine-*Apple*, Anana.
Ground-Pine, Chamæpitys.
Pinks, Caryophyllus.
the Pipe-*Fiſh*, Acus.
the Pitch-*Tree*, Picea.
Plaiſter *of Paris*, Gypſum Lutetianum.
the Plane-*Tree*, Platanus.
Plantain, Plantago.
Plantain-*Tree*, Muſa.
the *Baſtard*-Plover, Vanellus.
the *Great*-Plover, Glottis.
the Plumb-*Tree*, Prunus.
Plumbage, Plumbago.
Poley *Mountain*, Polium.
Polypody, Polypodium.
the Pomgranate-*Tree*, Malus Granatus.
Pond-*Weed*, Potamogeiton.
the Poplar *Tree*, Populus.
Poppy, Papaver.
Baſtard-Poppy, Argemone.
the Porcupine, Hyſtrix.
Potatoes, Battatas.
Poyſon-*Fiſh*, Paſtinaca *marina*.

Prim-

Primrose, Primula Veris.
Privet, Liguſtrum.
Mock-Privet, Phillyrea.
Ever-green-Privet, Alaternus.
the Pumice-*Stone*, Pumex.
Pumpion, Pepo.
the Purple-*Fiſh*, Purpura.
Purſlane, Portulaca.
Sea-Purſlane, Halimus.
Putty, Nil Griſeum.

Q.

The Quail, Coturnix.
Quick-*Silver*, Argentum *vivum*.
the Quince-*Tree*, Malus *Cydonia*.

R.

The Rabbit, Cuniculus.
Radiſh Raphanus.
Horſe-Radiſh, Raphanus *ſylveſtris*.
Ragwort, Jacobæa.
Rainbow-*Fiſh*, Julus.
the Rain-*Deer*, Rangifer.
Rampions, Campanula.
Ramſons, Victorialis.
the Rasberry-*Buſh*, Rubus *Idæus*.
the Rat, Mus *major*.
Egyptian Rat, Ichneumon.
the Raven, Corvus.
the Red-game, Attagen.

Red-*Lead*. Minium.
Reed, Arundo.
the Rel, Glis.
Reſt-harrow, Anonis.
the Rhinocerote, Rhinoceros.
Rice, Oriza.
Rie, Secale.
the Ring-*Dove*, Palumbus.
the Robin-*Red-breaſt*, Rubicola.
the Roche, Rutilus.
Rocket, Eruca.
the Rock-*Fiſh*, Gobius.
the Roe-buck, Capreolus.
the Roller, Graculus.
Roſe, Roſa.
Dogs-Roſe, Cynosbatos.
the *Holy*-Roſe, Ciſtus.
Roſe-*Wort*, Rhodia radix.
Roſe-*Wood*, Rhodium.
Roſe-*Bay*, Oleander.
Roſemary, Roſmarinus.
Roſa-Solis, Ros Solis.
Rubarb, Rhabarbarum.
the Ruby, Rubinus,
the Ruddock, Rubicola.
Rue, Ruta.
Goats-Rue, Galega.
Meadow-Rue, Thalictrum.
the Ruff, Cernua.
Rupture-*Wort*, Herniaria.

the

the Rush, Juncus.

S.

Saffron, Crocus.
Sage, Salvia.
Jerusalem-Sage, Pulmonaria.
Saint-Foin, Onobrychis.
the Salamander, Salamandra.
Salt, Sal.
Salt-*Gem*, Sal Gemma.
Salt-peter, Nitrum.
Samphire, Crithmum.
Sand, Arena.
Sand-*Stone*, Lapis *Arenosus*.
Sanicle, Sanicula.
the Sapphire, Sapphirus.
the Sardonyx, Sardonyx.
Sarsaparilla, Salsaparilla.
the Sassafras-*Tree*, Sassafras.
Sattin, Bulbonach.
Satyrion, Satyrium.
Savine, Sabina.
Saunders, Santalum.
Savoury, Satureia.
Saw-*Wort*, Serratula.
Saxifrage, Saxifraga.
Scabious, Scabiosa.
Scammony, Scammonium.
the Scink, Scincus.
the Scorpion, Scorpio.

the Scorpion-*Fiſh*, Scorpius *marinus*.
Scurvey-*Graſs*, Cochlearia.
Sebeſten, Sebeſten.
the Selenite, Selenites.
Self-heal, Prunella.
Sena, Sena.
Baſtard-Sena, Colutea.
Sengreen, Sedum.
the *Sea*-Serpent, Serpens *marinus*.
Ser-mountain, Siler *montanum*.
the Service-*Tree*, Sorbus.
the Shadow-*Fiſh*, Umbra.
the Shark, Canis Charcarias.
the Sheep, Ovis.
the Sheldrake, Vulpanſer.
Shepherds-*Needle*, Burſa Paſtoris.
Shepherds-*Purſe*, Scandix.
the Shoat-*Fiſh*, Silurus.
the Shrimp, Squilla.
the Silk-*Worm*, Bombyx.
Silver, Argentum.
Silver-*Weed*, Argentina.
Skirret, Siſarum.
the Sloe-*Tree*, Prunus *ſylveſtris*.
the Sloe-*Worm*, Cæcilia.
Smallage, Apium.
the Smaragd, Smaragdus.
the Snail, Limax.
the Snake, Serpens.
Sneez-*Wort*, Ptarmica.

the Soil, Phoca.
Solomon's-ſeal, Polygonatum.
Sope, Sapo.
the Sope-*Tree*, Saponaria arbor.
Sope-*Wort*, Saponaria.
Sorrel, Acetoſa.
Wood-Sorrel, Lujuba.
Southern-*Wood*, Abrotanum mas.
the Sow, Sus.
Sow-*Bread*, Cyclamen.
Sow-*Bug*, Millepeda.
Sow-*Fennel*, Peucedanum.
Sow-*Thiſtle*, Sonchus.
Sparagus, Aſparagus.
Sparrow, Paſſer.
Sparrow-*Hawk*, Accipiter.
Spelt, Zea.
the Spider, Araneus.
Spider-*Wort*, Phalangium.
Spignel, Meum.
Spinache, Spinachia.
the Spindle-*Tree*, Euonymus.
Spleen-*Wort*, Ceterach.
Spunge, Spongia.
Spunge-*Stone*, Lapis Spongia.
Squills, Squilla.
the Stag-*Fly*, Cervus *volans*.
Star *of Bethlehem*, Ornithogalon.
the Star-*Gazer*, Uranoſcopus.
the Star-*Gem*, Aſteria Gemma.

the Star-*Stone*, Aſtroites.
Star-*Wort*, After Atticus.
Sea-Star-*Wort*, Tripolium.
Staves-acre, Staphis agria.
Steel, Chalibs.
Stock-*July*-*Flower*, Leucoium.
the Stone-back, Ibex.
Stonecrop, Illecebra.
the Storax-*Tree*, Styrax Arbor.
the Stork, Ciconia.
Strawberry, Fragaria.
the Strawberry-*Tree*, Arbutus.
the Sturgion, Sturio.
Succory, Cichoreum.
Gum-Succory, Chondrilla.
the Sucking-*Fiſh*, Remora.
Sugar-*Cane*, Arundo *Saccharifera*.
Sulphur, Sulphur.
Sumach, Rhus.
Sun-dew, Ros Solis.
Sun-*Flower*, Flos Solis.
the Swallow, Hirundo.
Swallow-*Wort*, Aſclepias.
the Swan, Cygnus.
the Sweet-*Hoof*, Unguis *odoratus*.
the Swift, Lacertus *aquaticus*.
the Swine, Porcus.
Sycamore-*Tree*, Sycamorus.

T. Talk,

T.

Talk, Talcum.
Tamarinds, Tamarindus.
the Tamarisk-*Tree*, Tamariſcus.
Tanſie, Tancetum.
Tares, Vicia.
Taragon, Dracunculus.
the Tea-*Plant*, Thea.
Teaſel, Dipſacus.
the Tench, Tinca.
Tent-*Wort*, Adianthum *album*.
the Thiſtle, Carduus.
Thorn-*Apple*, Stramonium.
the Thornback, Raia.
Thorow-wax, Perfoliata.
Thracian-*Stone*, Lapis *Thracius*.
Throat-*Wort*, Trachelium.
Thunder-bolts, Belemnites.
Thunder-ſtones, Ceraunia.
Thyme, Thymus.
the Tick, Ricinus.
the Tiger, Tigris.
Tin, Stannum.
Tin-glaſs, Biſmuthum.
the Tit-mouſe, Parus.
the Toad, Bufo.
Toad-flax, Linaria.
Tobacco, Nicotiana.
Tooth-*Wort*, Dentaria.

the Topaz, Topasius.
Tormentil, Tormentilla.
the Tortoise, Testudo.
Travellers-Joy, Atragene.
Tragacanth, Tragacantha.
Tree of Life, Arbor Vitæ.
Trefoil, Trifolium.
Shrub-Trefoil, Cytisus.
the Trout, Trutta.
Tulip, Tulipa.
the Tunney, Thynnus.
the Turkey, Gallo-Pavo.
Turmerick, Curcuma.
Turnep, Rapum.
Turnsole, Heliotropium.
the Turpentine-*Tree*, Terebinthus.
the Turquoise, Turchoisa.
the Turtle-*Dove*, Turtur.
Tutsan, Androsæmum.
Tutty, Tutia.
Tway-Blade, Bifolium.

V.

Valerian, Valeriana.
Vanillas, Banillas.
Venus-Comb, Pecten Veneris.
Verdigrise, Ærugo.
Vermilion, Cinnabaris.
Vervain, Verbena.
Vetch, Vicia.

Cocks-Head Vetch, Onobrychis.
Hatchet-Vetch, Securidaca.
Kidney-Vetch, Anthyllis.
Milk-Vetch, Aſtragalus.
the Vine, Vitis.
Violet, Viola.
the Viper, Vipera.
Vipers-*Graſs*, Scorzonera.
the Umber, Aſchia.
the Unicorn, Monoceros.
the Unicorn-*Stone*, Unicornu foſſile.
the Urchin, Erinaceus.
the Vultur, Vultur.

W.

Wag-tail, Motacilla.
Wake-Robin, Arum.
the Walnut-*Tree*, Nux Juglans.
Wall-*Flower*, Cheyri.
the Wall-*Louſe*, Cimex.
the Warming-*Stone*, Thermolithus.
Wart-*Wort*, Tithymalus Helioſcopius.
the Waſp, Veſpa.
Water, Aqua.
the Water-*Hen*, Gallina *aquatica*.
Wax, Cera.
Waxen-Vein, Ludus Paracelſi.
Wayfaring-*Tree*, Viburnum.
the Weaſel, Muſtela.
the Weaver, Draco *marinus*.

Diers-Weed, Struthium.
the whale, Balæna.
the *Parmaceti*-whale, Cetus.
wheat, Triticum.
Buck-wheat, Fegopyrum.
Cow-wheat, Melampyrum.
the whelp, Catulus.
the whelk, Buccinum.
the whet-*Stone*, Cos.
the white-*Beam Tree*, Aria.
the whiting, Oniſcus.
whitlow *Graſs*, Paronychia.
whortle-*Berry*, Vitis Idæa.
widow-wail, Chamælæa.
Sweet-williams, Caryophyllus *barbatus*.
the willow-*Tree*, Salix.
Spiked willow, Spiræa.
Winters-*Bark*, Cortex *Winteranus*.
Winter-*Green*, Pyrola.
Woad, *Glaſtum*.
the Wolf, Lupus.
Wolfs-bane, Aconitum.
Wolf-*Fiſh*, Lupus *marinus*.
Woodbine, Periclymenum.
the Wood-*Cock*, Scolopax.
the Wood-*Eater*, Teredo.
the Wood-*Louſe*, Millepeda.
Wood-*Roof*, Aſperula.
Wormwood, Abſinthium.
Wormſeed, Santonicum.

Wrack, Alga.
the Wraſs, Turdus.
the Wren, Paſſer troglodites.

Y.

Yarrow, Millefolium.
the Yew-*Tree*, Taxus.
Yucca, Yucca.

Z.

Zedoary, Zedoaria.

FINIS.

MVSEVM
BRITAN
NICVM

Catalogus Librorum profanorum apud Guil. & Joh. Innys.

HIppocratis de Morbis popularibus Liber primus & tertius, Gr. Lat. His accommodavit novem de Febribus Commentarios Johannes Freind, M. D. Coll. Med. Londin. & Societat. Reg. Soc. 4to. 1717.

Emmenologia: in qua Fluxus Mulieribus Menſtrui Phœnomena, Periodi, vitia, cum Medendi Methodo, ad rationes mechanicas exiguntur. Auctore Johanne Freind, M. D. Coll. Med. Lond. & S.R.S. Editio 2da. auctior & emendatior. 8vo. 1717.

Sanctorii Sanctorii de Staticâ Medicinâ Aphoriſmorum Sectiones ſeptem, cum Commentario Martini Lifter. 12mo. 1716.

Pharmacopœia Extemporanea, ſive Præſcriptorum Chilias; in quâ Remediorum elegantium & efficacium Paradigmata, ad omnes ferè medendi intentiones accommodata, candidè proponuntur: unà cum viribus, operandi ratione Doſibus & Indicibus annexis. Editio 5ta, longè auctior & emendatior: Per Tho. Fuller, M.D. 12mo. 1714.

Pharmacopœia Colleg. Reg. Lond. Remedia omnia ſuccinctè deſcripta. Editio 4ta, per J. Shipton. 12mo. 1711.

Proceſſus Integri in Morbis ferè omnibus curandis; necnon de Phthiſi Tractatulo. Editio 4ta, à Thomâ Sydenham, M.D. 12mo. 1712.

Johannis Raii Synopſis methodica Avium & Piſcium: Opus Poſthumum, quod vivus recenſuit & perfecit ipſe inſigniſſimus Author. In quo multas Species in ipſius Ornithologiâ & Ichthiologiâ deſideratas adjecit: Methodumque ſuam Piſcium naturæ magis convenientem reddidit. Cum Appendice & Iconibus. 8vo. 1713.

Praxis Medica Boerhaaveana: Being a Compleat Body of Preſcriptions, adopted to each Section of the Practical Aphoriſms of *Humanus Boerhaave*, Profeſſor of Phyſick at *Leyden*. Publiſh'd from the Author's Original Manuſcript. To which is annexed, *Methodus præſcribendi Formulas, ſecundum Archibaldum Pitcharnium*,